

Агиолакс гранули
Agiolax granules

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 9600348

Разрешение №

BG/MA/MB-42203

Одобрение №

16-10-2018

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Агиолакс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Агиолакс
3. Как да приемате Агиолакс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Агиолакс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Agiolax и за какво се използва

Агиолакс се използва за кратковременно лечение на запек

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

5 г от гранулите ($\cong$ 1 ч.л.) Агиолакс съдържат: 2,60 g Plantaginis ovatae semen (Семена от яйцевиден живовляк) 0,11 g Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Люспи от семена на яйцевиден живовляк (хуск)) и 0,34-0,66 g Sennae angustifoliae fructus (Плодове от майчин лист) съответстващи на 15 mg хидроксиантраценови гликозиди, изчислени като сенозид В

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Агиолакс

Не приемайте Агиолакс

- ако сте алергични към активното(ите) вещество(а) или към някоя от останалите съставки на това лекарство изброени в точка 6.
- Агиолакс не трябва да се употребява от пациенти с аномално стесняване (стеноза) на стомашно-чревния тракт, особено на хранопровода или кардията;
- възможна или съществуваща обструкция на червата (илеус),
- при пациенти с трудно поддаващ се на контрол захарен диабет;
- остри възпалителни заболявания на червата (болест на Crohn, улцерозен колит, възпаление на апендикса),
- остри възпаления на червата (болест на Crohn, улцерозен колит, апендицит)
- при коремни болки с неустановен произход;
- в случай на силно дехидратиране със загуба на вода и електролити;
- при деца под 12 години.



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Агиолакс.

- Този лекарствен продукт съдържа захароза. Пациенти с редки наследствени заболявания, като непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтазна недостатъчност, не трябва да приемат това лекарство.
- Агиолакс винаги трябва да се приемат с течност. Без достатъчно течност, продуктът може да набъбне и да запуши фаринкса или хранопровода, което създава риск от задушаване.
- Продължителната употреба на стимулиращи лаксативи може да засили ленивостта на червата и зависимост от лаксативи. Те трябва да се използват само ако не може да се постигне лечебен ефект чрез промяна в начина на хранене или с приемане на баластни вещества.
- За да се намали рискът от стомашно-чревна обструкция (илеус), Агиолакс гранули трябва да се използват с лекарствени продукти, инхибиращи перисталтиката (например опиоиди) само под лекарско наблюдение.
- Пациентите, приемащи сърдечни гликозиди, антиаритмични лекарствени продукти, лекарствени продукти, предизвикващи удължаване на QT интервала, диуретици, адреностероиди или корен от сладка папрат, трябва да се консултират с лекар, преди да приемат Агиолакс.
- Пациентите с бъбречни нарушения трябва да бъдат предупредени за възможен електролитен дисбаланс.
- Когато Агиолакс се взема от възрастни хора, които не могат да задържат, продължителен контакт на кожата с изпражненията трябва да се избягва чрез смяна на превръзките (памперсите).

Други лекарства и Агиолакс

Лекарствени взаимодействия:

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

При продължителна или прекомерна употреба може, вследствие загубата на калий, да се усили действието на лекарства за засилване на сърдечния мускул (сърдечни гликозиди) и да се повлияе на действието на антиаритмичните лекарствени продукти, които индуцират реверсия към синусов ритъм (например хинидин) и такива, предизвикващи удължаване на QT интервала.

Едновременната употреба с други лекарствени продукти, индуциращи хипокалиемия (например диуретици, адреностероиди и корен от сладник (сладък корен)) може да повиши дисбаланса на електролитите.

Агиолакс трябва да се приема поне ½ до 1 час преди или след приема на други лекарствени продукти, тъй като чревната абсорбция на съпътстващите лекарства може да се забави.

При диабетно болни, лекуващи се с инсулин, може да се наложи намаляване на дозата на инсулина.

Агиолакс с храна, напитки и алкохол


Агиолакс винаги трябва да се приемат с течност. Без достатъчно течност, продуктът може да набъбне и да запуши фаринкса или хранопровода, което създава риск от задушаване.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременост

По време на първата трета от бременността Агиолакс би трябвало да се използва с прекъсвания и само тогава, когато не може да бъде постигнат положителен ефект чрез промяна в начина на хранене или чрез приемане на баластни вещества. Поради това това трябва да се употребява само след консултация с лекар.



Кърмене

Продуктите от обмяната на сена (майчин лист), като напр. реин, имат слабително действие и преминават в малки количества в кърмата. Не е било наблюдавано разхлабително действие върху кърмачето.

Шофиране и работа с машини

Няма установени значими ефекти, които да намаляват способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Агиолакс

Винаги приемайте Агиолакс, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Максималният дневен прием не трябва да надвишава 30 мг хидроксиантраценови гликозиди. Това е еквивалентно на 10 г (2 чаени лъжички) Агиолакс гранули.

Ако не е предписано друго, възрастни и деца над 10 години трябва да го приемат вечер след храна.

Препоръчителната доза за всеки отделен пациент е най-малкото количество, което е необходимо за получаване на меки, но оформени изпражнения.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Гранулите трябва да се поглъщат несдъвкани с обилно количество течност (около 1/4 литър), за предпочитане, но не непосредствено преди лягане. При вземане и на други лекарствени средства да се спазва интервал от 1/2 до 1 час след приемането им.

Слабителните лекарства не трябва да се вземат дълго време (повече от 1-2 седмици) без лекарски съвет.

Ако сте приели повече от необходимата доза Агиолакс.

В случай на неумишлено или преднамерено предозиране могат да се получат болезнени чревни крампи и тежка диария с последваща загуба на течности и минерали. Ако сте приели свръхдоза, моля, консултирайте се с лекар незабавно. Той ще реши какви контрамерки (напр. предписване на течности и соли) ще са необходими.

Ако сте пропуснали да приемете Агиолакс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза Агиолакс.

4. Възможни нежелани реакции:

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В отделни случаи могат да се получат стомашно-чревни спазми. В такива случаи се препоръчва намаляване на дозата. По време на лечението може да настъпи оцветяване на урината, което е безвредно.


При продължителна или неправилна употреба може да се получи загуба на вода и електролити. Може да настъпи диария особено при загуба на калий. Неговата загуба може да доведе до нарушаване на сърдечната функция и мускулна слабост, особено при едновременно приемане на сърдечни гликозиди, диуретици или кортизон и кортикостероиди.

При продължителна употреба може да настъпи поява на белтък или кръв в урината (албуминурия или хематурия), пигментация на чревната лигавица (Pseudomelanosis coli), макар че това е безвредно и при прекратяване на приема на препарата изчезва.

В редки случаи може да се наблюдава свъхчувствителност към жиловлека (Plantago ovata).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако някоя от тези нежелани реакции стане сериозна, или ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и нежеланите реакции, които са описани в тази листовка. Можете също така да съобщите нежеланите реакции директно чрез националната система за докладване.



Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Агиолакс

Съхранявайте в оригиналната опаковка при температура под 30° С..

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето. Срокът на годност изтича в последния ден на посочения месец.

Срокът на годност се отнася за правилно съхраняван продукт в запазена опаковка. След употреба опаковката да се затваря плътно!

Лекарствените продукти не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Питайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Агиолакс

Активните вещества са хидроксиантраценови гликозиди, изчислени като сенозид В от семената и люспите на живовляк и плодовете на майчин лист.

Другите помощни вещества са:

Талк, арабска гума, железен оксид червен Е -172, течен парафин, железен оксид черен – Е 172, железен оксид жълт - Е 172, твърд парафин, ментово масло, масло от ким, масло от градински чай, захароза (около 0.105 g, съотв. на 0,09 ХЕ)

Как изглежда Агиолакс и какво съдържа опаковката

Агиолакс са гранули в картонена опаковка или в саше, съдържащо 1 доза от 5 g гранули. Опаковката съдържа 6 сашета.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Madaus GmbH
51101 Cologne
phone: (0221) 8998 0
Fax: (0221) 8998 711
e-mail: info@madaus.de

Дата на последно преразглеждане на листовката
Декември 2017

