

Листовка: информация за пациента

Алергодил® S 0,15% спрей за нос, разтвор
Азеластинов хидрохлорид

Allergodil® S 0,15% nasal spray, solution
Azelastine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 4 седмици не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Алергодил S и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Алергодил S
3. Как да използвате Алергодил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Алергодил S
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20170099
Разрешение №	BG/MK/MP-53766
Одобрение №	18-12-2018

1. Какво представлява Алергодил S и за какво се използва

Алергодил S съдържа азеластинов хидрохлорид, който принадлежи към групата на лекарствата, наречени антихистамини. Антихистамините действат като предотвратяват ефекта на хистамина, който се отделя от тялото, като част от алергичната реакция.

Алергодил S се прилага за лечение на алергичен ринит при възрастни, юноши и деца над 6 годишна възраст. Това са алергични реакции към вещества, като полени, домашен прах или домашни животни. Алергодил S облекчава симптомите на алергия като: течащ нос, кихане, сърбеж или запушен нос.

Трябва да информирате Вашия лекар, ако Вашите симптоми се влошат или не се подобряват след 4 седмици.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Алергодил S

Не използвайте Алергодил S

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към азеластинов хидрохлорид или някоя от останалите съставки на продукта (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете употребата на Алергодил S

Деца



Алергодил S не се препоръчва за употреба от деца под 6 годишна възраст.

Други лекарства и Алергодил S

Досега не са наблюдавани взаимодействия с други лекарствени продукти, въпреки това кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Алергодил S има пренебрежимо малък ефект върху способността за шофиране и работа с машини. В изолирани случаи при приложението на Алергодил S могат да се наблюдават умора, слабост, отпадналост, световъртеж, които могат да се дължат и на заболяването. В тези случаи не шофирайте и не работете с машини. Имайте предвид, че консумацията на алкохол може да засили тези ефекти.

3. Как да използвате Алергодил S

Винаги използвайте Алергодил S точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Алергодил S е за назално приложение.

Ако не сте сигурни за точната доза или как да използвате това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и юноши над 12 годишна възраст:

- Препоръчителната доза е две впръсквания във всяка ноздра веднъж дневно. В някои случаи две впръсквания във всяка ноздра 2 пъти дневно.
- Максималната дневна доза е две впръсквания във всяка ноздра 2 пъти.

Деца от 6 до 11 годишна възраст

- Препоръчителната доза е едно впръскване във всяка ноздра 2 пъти дневно.

Клинични изпитвания с продължителност 4 седмици показват добра ефикасност и безопасност при деца. Не са налични данни за по-продължително приложение при деца. Данните от клинични изпитвания с продължителност до една година и прилагане на двойно по-висока от препоръчителната дневна доза са с добър профил на безопасност при възрастни и юноши.

Алергодил S не се препоръчва за употреба от деца под 6 годишна възраст, тъй като за тази възрастова група безопасността и ефикасността не са установени.

Трябва да използвате Алергодил S редовно, до изчезване на симптомите, ако прекъснете употребата на Алергодил S вашите симптоми могат да се проявят отново.

Алергодил S спрей за нос е подходящ за продължителна употреба.

Употреба повече от 4 седмици не се препоръчва при деца на възраст между 6 -11 години, поради липса на клинични данни.

Указания за употреба

1. Издухайте носа си.



2. Отстранете защитната запушалка (схема 1).

3. Преди първата употреба, спрея за нос трябва да бъде подготвен чрез натискане и отпускане на помпичката 6 пъти. Ако алергодил S спрей за нос не се използва 3 или повече дни, той трябва да бъде подготвен чрез натискане и отпускане на помпичката, докато се получи равномерна струя. (схема 2)

4. Впръскайте по веднъж във всяка ноздра, като държите главата си изправена. Не накланяйте главата назад (схема 3).

5. Почистете и поставете защитната запушалка.

Впръскването се извършва при изправена глава (вижте инструкциите към фигурите по-долу).

Схема 1




Схема 2





Схема 3



Ако сте използвали повече от необходимата доза от Алергодил S

Малко вероятно е, впръскването на прекалено голямо количество от лекарството в носа да доведе до проблеми. Ако имате притеснения се свържете с Вашия лекар.

Въпреки това, ако някой, особено дете, погълне Алергодил S, незабавно се свържете с Вашия лекар или с най-близкия център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да използвате Алергодил S

Използвайте спрея за нос веднага след като си спомните, след което приемете следващата доза в обичайния час. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, Алергодил S може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции са изброени по-долу.

Чести (засягат до 1 на 10 души)

- горчив вкус (често дължащ се на неправилен начин на приложение на лекарството, главно при прекомерното накланяне на главата назад при впръскване).

Нечести (засягат до 1 на 100 души)

- дразнене в носа (парене, сърбеж), кихане, кървене на носа

Редки (засягат до 1 на 1 000 души)

- умора (изтощение), слабост, сънливост, които могат да се дължат и на заболяването.

Много редки (засягат до 1 на 10 000 души)

- алергична реакция, обрив, сърбеж по кожата (пруритус), обрив (уртикария)



Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Алергодил S

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, който е обозначен на картонената кутия и етикета на бутилката Алергодил S. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се употребява повече от 6 месеца след първото отваряне на бутилката.

Да не се съхранява в хладилник и да не се замразява.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Алергодил S

Активното вещество е азеластин хидрохлорид:

1 ml спрей за нос съдържа 1,5 mg азеластин хидрохлорид. Едно впръскване (еквивалентно на 0,14 ml разтвор) съдържа 0,21 mg азеластин хидрохлорид, еквивалентни на 0,19 mg азеластин.

Другите съставки са: Хипромелоза, сукралоза (E 955), сорбитол, течен (кристализиращ), динатриев едетат, натриев цитрат, пречистена вода.

Как изглежда Алергодил S и какво съдържа опаковката

Алергодил S спрей за нос е бистър, безцветен разтвор в бутилка от тъмно стъкло с дозираща спрей помпа.

Бутилка от 10 ml съдържа 5 ml или 10 ml разтвор.

Бутилка от 20 ml съдържа 17 ml, 20 ml или 22 ml разтвор.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежателя на разрешението за употреба

Майлан ЕООД

Офис сграда „Сердика офиси“

бул. Ситняково № 48, ет. 7

1505 София

България

Производител



MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg
Германия

или

MEDA Manufacturing GmbH
Neurather Ring 1
51063 Köln
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката
Ноември 2018 г.

