

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20230048
Разрешение №	66566 19-09-2024
BG/MA/MP	
Способен №	

Листовка: информация за пациента

Бозилос 14 mg филмирани таблетки
терифлуномид

Bozilos 14 mg film-coated tablets
teriflunomide

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Бозилос и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бозилос
3. Как да приемате Бозилос
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бозилос
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Бозилос и за какво се използва

Какво представлява Бозилос

Бозилос съдържа активното вещество терифлуномид, което е имуномодулиращо средство и регулира имунната система, за да ограничи нейната атака върху нервната система.

Какво представлява Бозилос и за какво се използва

Това лекарство се използва при възрастни и при деца и юноши (на 10 години и повече) за лечение на пристъпно-ремитентна множествена склероза (МС).

Какво представлява множествената склероза

МС е хронично заболяване, което засяга централната нервна система (ЦНС). ЦНС се състои от главния мозък и гръбначния мозък. При множествена склероза възпалението разрушава защитната обвивка (наречена миелин) около нервите в ЦНС. Тази загуба на миелин се нарича демиелинизация. Това спира правилното функциониране на нервите.

Хората с пристъпна форма на множествена склероза имат повтарящи се атаки (пристъпи) на физически симптоми, причинени от неправилното функциониране на нервите. Тези симптоми са различни при различните пациенти, но обикновено включват:

- затруднено ходене
- проблеми със зрението
- проблеми с равновесието.

Симптомите могат да изчезнат напълно след отзвучаване на пристъпа, но с течение на времето някои проблеми може да останат между пристъпите. Това може да причини физическа инвалидизация, която може да пречи на Вашите ежедневни дейности.



Как действа Бозилос

Това лекарство помага за предпазване на централната нервна система от атаки на имунната система, като ограничава нарастването на броя на някои бели кръвни клетки (лимфоцити). Това ограничава възпалението, което води до увреждане на нервите при МС.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бозилос

Не приемайте Бозилос, ако:

- сте алергични към терифлуномид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6),
- някога сте развивали тежък кожен обрив или лющене на кожата, мехури и/или рани в устата след прием на терифлуномид или лефлуномид,
- имате тежки чернодробни проблеми,
- сте бременна, смятате, че може да сте бременна, или кърмите,
- страдате от сериозен проблем, който засяга Вашата имунна система, напр. придобит имунодефицитен синдром (СПИН),
- имате сериозен проблем с костния мозък или ако имате нисък брой червени или бели кръвни клетки в кръвта, или намален брой тромбоцити,
- страдате от сериозна инфекция,
- имате тежки бъбречни проблеми, които налагат диализа,
- имате много ниски нива на белтъци в кръвта (хипопротеинемия).

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Бозилос, ако:

- имате чернодробни проблеми и/или ако приемате големи количества алкохол. Вашият лекар ще Ви направи кръвни изследвания преди и по време на лечението, за да провери колко добре работи черният Ви дроб. Ако резултатите от изследванията Ви покажат наличие на проблем с черния дроб, Вашият лекар може да спре лечението Ви с Бозилос. Вижте точка 4.
- имате високо кръвно налягане (хипертензия) и дали то се овладява с лекарства или не. Това лекарство може да причини повишаване на кръвното налягане. Вашият лекар ще проверява кръвното Ви налягане преди началото на лечението и редовно след това. Вижте точка 4.
- имате инфекция. Преди да приемете Бозилос, Вашият лекар ще се увери, че броят на белите кръвни клетки и тромбоцитите в кръвта Ви е достатъчен. Тъй като това лекарство намалява броя на белите кръвни клетки в кръвта, това може да засегне способността Ви да се борите с инфекцията. Вашият лекар може да Ви направи кръвни изследвания, за да провери белите кръвни клетки, ако мислите, че имате инфекция. Херпес вирусни инфекции, включително орален херпес или херпес зостер, могат да възникнат при лечение с терифлуномид. В някои случаи са настъпили сериозни усложнения. Трябва незабавно да уведомите Вашия лекар, ако подозирате, че имате някакви симптоми на херпес вирусни инфекции. Вижте точка 4.
- имате тежки кожни реакции,
- имате респираторни симптоми,
- имате слабост, скованост и болка в ръцете и краката,
- предстои да се ваксинирате,
- приемате лефлуномид с това лекарство,
- преминавате към или от лечение с Бозилос,
- трябва да Ви се направи определен вид изследване на кръвта (ниво на калций). Възможно е измерването да покаже фалшиво ниски нива на калций.

Реакции от страна на дихателната система

Кажете на Вашия лекар, ако имате необяснима кашлица и диспнея (задух). Вашият лекар може да извърши допълнителни изследвания



Деца и юноши

Терифлуномид не е предназначен за употреба при деца на възраст под 10-годишна възраст, тъй като не е изпитван при пациенти с множествена склероза в тази възрастова група.

Предупрежденията и предпазните мерки, изброени по-горе, важат също и за деца. Следната информация е важна за деца и за полагащите грижи за тях лица:

- наблюдавано е възпаление на панкреаса при пациенти, получаващи терифлуномид. Лекарят на Вашето дете може да направи кръвни изследвания, ако се подозира възпаление на панкреаса.

Други лекарства и Бозилос

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства. Това включва и лекарства, отпускани без рецепта.

По-конкретно, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните:


- лефлуномид, метотрексат и други лекарства, които влияят на имунната система (наричани често имуносупресори или имуномодулатори),
- рифампицин (лекарство, използвано за лечение на туберкулоза и други инфекции),
- карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин при епилепсия,
- жълт кантарион (билково лекарство при депресия),
- репаглинид, пиоглитазон, натеглинид или росиглитазон при диабет,
- даунорубицин, доксорубицин, паклитаксел или топотекан при рак,
- дулоксетин при депресия, незадържане на урината или при бъбречно заболяване при диабет,
- алосертон за овладяване на тежка диария,
- теофилин при астма,
- тизанидин – миорелаксант,
- варфарин – антикоагулант, използван за разреждане на кръвта (т.е. прави я по-течна), за да избегне образуване на кръвни съсиреци,
- перорални контрацептиви (съдържащи етинилестрадиол и левоноргестрел),
- цефаклор, бензилпеницилин (пеницилин G), ципрофлоксацин при инфекции,
- индометацин, кетопрофен при болка или възпаление,
- фуросемид при сърдечно заболяване,
- циметидин за намаляване на стомашните киселини,
- зидовудин при HIV-инфекция,
- розувастатин, симвастатин, аторвастатин, правастатин при хиперхолестеролемия (висок холестерол),
- сулфасалазин при възпалително заболяване на червата или ревматоиден артрит,
- холестирамин при висок холестерол или за облекчаване на сърбежа при чернодробно заболяване,
- активен въглен за намаляване на абсорбцията на лекарства и други вещества.

Бременност и кърмене

Не приемайте това лекарство, ако сте бременна или смятате, че може да сте **бременна**. Ако сте бременна или забременеете докато приемате Бозилос, рискът да имате дете с вродени дефекти е повишен. Жените с детероден потенциал не трябва да използват това лекарство без да прилагат надеждни контрацептивни мерки.

Ако Вашата дъщеря получи менструация, докато приема това лекарство, трябва да информирате лекаря, който ще предостави специализирана консултация относно контрацепцията и потенциалните рискове в случай на бременност.

Информирайте Вашия лекар, ако планирате да забременеете след преустановяване на лечението с Бозилос, тъй като трябва да е сигурно, че по-голямата част от това лекарство е изчистила от организма Ви преди да забременеете. По естествен път отделянето на активното вещество може да отнеме до 2 години. Времето може да се намали до няколко седмици през прием на определени лекарства, които ускоряват отстраняването на това лекарство от Вашия организъм. И в двата случая трябва да се потвърди чрез изследване на кръвта, че активното вещество е отстранено в достатъчна степен от организма Ви, и е необходимо потвърждение от



Вашия лекуващ лекар, че нивото на терифлуномид в кръвта Ви е достатъчно ниско, за да се допусне да забременеете.

За допълнителна информация относно лабораторните изследвания, моля, свържете се с Вашия лекар.

Ако подозирате, че сте бременна докато приемате това лекарство или за периода от две години след като сте спрели лечението, трябва да преустановите приема на Бозилос и да се свържете веднага с Вашия лекар за изследване за бременност. Ако изследването потвърди, че сте бременна, Вашият лекар може да Ви предложи лечение с определени лекарства за отстраняване на това лекарство от организма Ви бързо и в достатъчна степен, тъй като това може да намали риска за Вашето бебе.

Контрацепция

Трябва да използвате ефективен метод за контрацепция по време на лечението и след лечението с това лекарство. Терифлуномид остава в кръвта Ви дълго време, след като сте спрели да го приемате. Продължете да използвате ефективна контрацепция, след като спрете лечението си.

- Продължавайте, докато нивата на Бозилос в кръвта Ви станат достатъчно ниски – Вашият лекар ще провери това.
- Говорете с Вашия лекар относно най-добрия метод за контрацепция за Вас, както и при евентуална нужда от смяна на метода за контрацепция.

Не приемайте Бозилос докато кърмите, тъй като терифлуномид преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство може да Ви накара да се чувствате замаяни, което може да засегне способността Ви за концентрация и реакция. В такъв случай не трябва да шофирате или да работите с машини.

Бозилос съдържа лактоза и натрий

Това лекарство съдържа лактоза (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемате това лекарство.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетката, т.е. по същество не съдържа натрий.

3. Как да приемате Бозилос

Лечението с Бозилос ще се провежда под наблюдението на лекар, който има опит в лечението на множествена склероза.

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Възрастни

Препоръчителната доза е една таблетка от 14 mg дневно.

Деца и юноши (10 години и повече)

Дозата зависи от телесното тегло:

- Деца с телесно тегло над 40 kg: една таблетка от 14 mg дневно.
- Деца с телесно тегло, по-малко или равно на 40 kg: 7 mg терифлуномид дневно.

Бозилос се предлага само в концентрация от 14 mg. Ако Вашият лекар Ви е казал да приемате 7 mg терифлуномид дневно, трябва да разделяте Вашата Бозилос таблетка на две половини.



посредством делителната черта и да приемате едната половина от таблетката, която съответства на 7 mg. **Говорете с Вашия лекар, ако не сте сигурни.**

Деца и юноши, които достигнат стабилно телесно тегло над 40 kg, ще получат указания от своя лекар да преминат към една таблетка от 14 mg дневно.

Път/начин на приложение

Това лекарство е за перорално приложение. То се приема ежедневно като единична дневна доза по всяко време на деня.

Таблетката може да бъде разделена на две равни части.

Трябва да поглъщате таблетката с малко вода.

Може да приемате това лекарство с или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бозилос

Ако сте приели повече от необходимата доза Бозилос, обадете се веднага на Вашия лекар. Вие може да получите нежелани реакции, подобни на тези, които са описани в точка 4 по-долу.

Ако сте пропуснали да приемете Бозилос

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Вземете следващата доза в определеното време.

Ако сте спрели приема на Бозилос

Не спирайте приема на това лекарство и не променяйте Вашата доза преди да сте се посъветвали първо с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При това лекарство може да възникнат следните нежелани реакции.

Сериозни нежелани реакции

Някои нежелани реакции могат да бъдат или да станат сериозни. Ако получите някои от тях, незабавно уведомете Вашия лекар.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

- възпаление на панкреаса, което може да включва симптоми на болка в коремната област, гадене или повръщане (честотата е „чести“ при педиатрични пациенти и „нечести“ при възрастни пациенти).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

- алергични реакции, които може да включват симптоми на обрив, копривна треска, подуване на устните, езика или лицето, или внезапна затруднено дишане.
- тежки кожни инфекции, които може да включват симптоми на кожен обрив, мехури, повишена температура или язви в устата.
- тежки инфекции или сепсис (потенциално животозастрашаващ вид инфекция), който може да включва симптоми на висока температура, треперене, тръпки, намалено отделяне на урина или обърканост.
- възпаление на белите дробове, което може да включва симптоми на задух или упорита кашлица.



С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- сериозно чернодробно заболяване, което може да включва симптоми на пожълтяване на кожата или на бялата част на очите, по-тъмна от обичайната урина, необяснимо гадене и повръщане, или болка в корема.

Други нежелани реакции могат да възникнат със следните честота:

Много често (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

- главоболие.
- диария, гадене.
- повишаване на АЛАТ (повишени кръвни нива на определени чернодробни ензими), установява се чрез изследвания.
- изтъняване на косата.

Често (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- грип, инфекция на горните дихателни пътища, инфекция на пикочните пътища, бронхит, синусит, болки в гърлото и дискомфорт при преглъщане, цистит (възпаление на пикочния мехур), вирусен гастроентерит (стомашен грип), зъбна инфекция, ларингит, гъбична инфекция на ходилото.
- херпес вирусни инфекции, включително орален херпес и херпес зостер със симптоми като мехури, парене, сърбеж, изтръпване или болка на кожата, обикновено от едната страна на горната част на тялото или лицето, и други симптоми, като температура и слабост.
- лабораторни стойности: намаляване на броя на червените кръвни клетки (анемия), наблюдавани са промени в лабораторните изследвания на черния дроб и белите кръвни клетки (вж. точка 2), също така повишения на мускулен ензим (креатинфосфокиназа).
- леки алергични реакции.
- чувство на тревожност.
- мравучкане, чувство на слабост, изтръпване, боцкане или болка в долната част на гърба или в крака (ишиас); изтръпване, парене, боцкане или болка в пръстите (синдром на карпалния тунел)
- сърцебиене.
- повишено кръвно налягане.
- неразположение (повръщане), зъбобол, болка в горната част на корема.
- обрив, акне.
- болка в сухожилията, ставите, костите, мускулна болка (мускулно-скелетна болка).
- нужда от по-често от обичайното уриниране.
- обилна менструация.
- болка.
- липса на енергия или отпадналост (астения).
- понижаване на телесното тегло.

Нечесто (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- намаляване на броя на тромбоцитите в кръвта (лека тромбоцитопения).
- повишена чувствителност особено на кожата; пробождаща или пулсираща болка по хода на един или повече нерви, проблеми с нервите на ръцете или краката (периферна невропатия).
- нарушения на ноктите, тежки кожни реакции.
- посттравматична болка.
- псориазис (кожно заболяване).
- възпаление на устата/устните.
- отклонения от нормалните стойности на мазнините (липиди) в кръвта.
- възпаление на дебелото черво (колит).

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

- възпаление или увреждане на черния дроб.



С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

- респираторна хипертония (високо кръвно налягане, което засяга артериите в белите дробове).

Нежелани реакции при деца (10 години и повече) и юноши

Нежеланите реакции, изброени по-горе, се отнасят и за деца и юноши. Следващата допълнителна информация е важна за деца, юноши и полагащите грижи за тях лица:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

- възпаление на панкреаса.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Бозилос

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Бозилос

- Активното вещество е терифлуномид. Всяка таблетка съдържа 14 mg терифлуномид.
- Другите съставки са:
 - *Съцевина на таблетката:* лактоза монохидрат (вж. точка 2 Бозилос съдържа лактоза и натрий), царевично нишесте, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, натриев нишестен гликолат, талк, калциев стеарат.
 - *Покритие на таблетката:* хипромелоза, титанов диоксид (E 171), макрогол 8000, индигокармин алуминиев лак (E 132).

Как изглежда Бозилос и какво съдържа опаковката

Бозилос 14 mg филмирани таблетки са кръгли, светлосини филмирани таблетки, с делителна черта и диаметър приблизително 7 mm. Таблетката може да бъде разделена на две равни части.

Картонена кутия, съдържаща блистери от Alu/PVC/Alu/OPA с 14 таблетки всеки.
Опаковки от 28 или 84 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Egis Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38.



1106 Budapest,
Унгария

Производител(и)

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park
Paola PLA 3000
Малта

Adalvo Ltd.
Malta Life Sciences Park
Building 1, Level 4
Sir Temi Zammit Buildings
San Gwann SGN 3000
Малта

KeVaRo GROUP Ltd
9 Tzaritza Elenora Str.,
Office 23,
Sofia 1618,
България

Това лекарство е разрешено за употреба в държавите-членки на Европейското икономическо пространство <и в Обединеното кралство (Северна Ирландия)> под следните имена:

Исландия	Bozilos 14 mg filmhúðaðar töflur
България	Бозилос 14 mg филмирани таблетки Bozilos 14 mg film-coated tablets
Чешка република	Bozilos
Унгария	Bozilos 14 mg filmtabletta
Латвия	Bozilos 14 mg apvalkotās tabletes
Литва	Bozilos 14 mg plėvele dengtos tabletės
Полша	Bozilos
Румъния	Bozilos 14 mg comprimate filmate
Словакия	Bozilos 14 mg filmom obalené tablety

Дата на последно преразглеждане на листовката
Август, 2024 г.

