

Листовка: информация за пациента

Бифодрон 35 mg филмирани таблетки
Bifodron 35 mg film-coated tablets

ризедронат натрий (*risedronate sodium*)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. №

20160760

Разрешение №

25463

01-04-2014

Подобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Бифодрон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бифодрон
3. Как да приемате Бифодрон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бифодрон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Бифодрон и за какво се използва

Какво представлява Бифодрон

Бифодрон принадлежи към група нехормонални лекарства, наречени бисфосфонати, които се използват за лечение на заболявания на костите. Това лекарство действа директно върху костите, с което ги прави по-здрави и следователно по-малко податливи на чупене.

Костта е жива тъкан. Старата кост непрекъснато се извлича от скелета и се подменя с нова кост.

Постменопаузната остеопороза е състояние, проявяващо се при жени след настъпване на менопаузата, при което костите стават по-слаби, по-крежки и по-податливи на счупване при падане или физическо усилие. Остеопороза може да настъпи и при мъже по различни причини, като възраст и/или ниско ниво на мъжки хормон, тестостерон.

Най-податливите на счупване кости са гръбначният стълб, шийката на бедрената кост и китката, въпреки че това може да се случи с всяка кост на тялото. Свързаните с остеопороза фрактури могат също така да причинят болка в гърба, понижаване на ръста и изкривяване на гръбнака. Много от пациентите с остеопороза не проявяват симптоми и Вие може и да не знаете, че я имате.

За какво се използва Бифодрон

За лечение на остеопороза:

- при жени след настъпване на менопауза, дори и ако остеопорозата е тежка. Намалява риска от фрактури на гръбначния стълб и бедрената кост.
- при мъже



2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бифодрон

Не приемайте Бифодрон

- ако сте алергични към ризедронат натрий или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
- ако Вашият лекар Ви е съобщил, че имате състояние, наречено хипокалциемия (ниско ниво на калций в кръвта)
- ако мислите, че сте бременна, сте бременна или планирате да забременеете
- ако кърмите
- ако имате тежки бъбречни проблеми.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Бифодрон.

- ако не сте в състояние да седите или стоите изправени в продължение на най-малко 30 минути
- ако имате отклонения в метаболизма на костите или минералните вещества (например недостиг на витамин D, аномалии на паратироидния хормон, които може да доведат до ниско ниво на калций в кръвта).
- ако в миналото сте имали проблеми с хранопровода (тръбата, която свързва устата със стомаха). Може например да сте имали болки или затруднено поглъщане на храна или Вашият лекар Ви е казал, че имате Баретов хранопровод (състояние, свързано с промяна в клетките, които обграждат долната част на хранопровода).
- ако Вашият лекар Ви е съобщил, че имате непоносимост към някои захари (като например лактоза).
- ако сте имали или имате болки, подуване или скованост на челюстта или изпитвате тежест в челюстта или ако сте загубили зъб.
- ако се подлагате на зъболечение или трябва да претърпите зъболекарска хирургична намеса, съобщете на Вашия зъболекар, че се лекувате с Бифодрон.

Вашият лекар ще Ви посъветва какво да направите, ако приемате Бифодрон в случай, че някоя от гореспоменатите ситуации се отнася за вас.

Деца и юноши

Бифодрон не се препоръчва за употреба при деца под 18-годишна възраст поради недостатъчно данни относно безопасност и ефективност.

Други лекарства и Бифодрон

Лекарствени продукти, които съдържат едно от изброените по-долу вещества, намаляват ефекта на Бифодрон, ако се приемат едновременно с него:

- калций
- магнезий
- алуминий (например някои лекарства за стомашни разстройства)
- желязо.

Приемайте тези лекарства най-малко 30 минути след като сте приели таблетка Бифодрон.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бифодрон с храна и напитки

Изключително важно е да НЕ приемате таблетка Бифодрон с храна или напитки (различни от обикновена вода), така че да може да действа напълно. По-специално, това лекарство не трябва да се приема по едно и също време с млечни продукти (например мляко), тъй като те съдържат калций (вжл точка 2, „Други лекарства и Бифодрон“).

Приемайте храна и напитки (различни от обикновена вода) най-малко 30 минути след като сте приели таблетка Бифодрон.

Бременност и кърмене



Не приемайте Бифодрон , ако смятате, че може да сте бременна, сте бременна или планирате да забременеете (вж. точка 2, "Не приемайте Бифодрон"). Потенциалният риск, свързан с употребата на ризедронат натрий (активното вещество в Бифодрон) при бременни жени, не е известен. Не приемайте Бифодрон , ако кърмите (вж. точка 2, "Не приемайте Бифодрон"). Бифодрон трябва да се употребява само за лечение на остеопороза след менопауза при жени и мъже.

Шофиране и работа с машини

Бифодрон не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Бифодрон съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Бифодрон

Дозировка

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителна доза:

Приемайте ЕДНА таблетка Бифодрон (35 mg ризедронат натрий) веднъж седмично. Изберете един ден от седмицата, който Ви е най-удобен. Всяка седмица приемайте таблетка Бифодрон в избрания от Вас ден.

За Ваше удобство, така че да взимате таблетката на точния ден всяка седмица, върху картонената опаковка има отпечатани полета/ пространства. Моля, отбележете деня от седмицата, който сте избрали да взимате таблетка Бифодрон.

Кога да приемате таблетката Бифодрон

Приемайте таблетката най-малко 30 минути преди първото хранене, приема на напитка (различна от обикновена вода) или друго лекарство за деня.

Как да приемате таблетката Бифодрон

- Приемайте таблетката докато сте в изправено положение (може да седите или стоите), за да избегнете киселини в стомаха.
- Погълтайте таблетката с най-малко една чаша (120 ml) чиста вода.
- Погълтайте таблетката цяла. Не смучете и не дъвчете таблетката.
- Не лягайте поне 30 минути след приемане на таблетката.

Вашият лекар ще Ви посъветва дали трябва да приемате допълнителни количества калций и витамини, ако не ги получавате в достатъчно количество с храната.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бифодрон

Ако Вие или някой друг случайно приеме повече таблетки Бифодрон, отколкото е предписано, изпийте пълна чаша мляко и потърсете медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Бифодрон

Ако сте пропуснали да приемете таблетка Бифодрон в избрания ден, вземете я в деня, в който си спомните. Продължете да вземате следващите таблетки веднъж седмично в деня, в който нормално ги вземате.

Не вземайте две таблетки, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Бифодрон



Ако спрете лечението, можете да започнете да губите костна маса. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да обмислите спиране на лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете да приемате Бифодрон и незабавно уведомете лекар, ако почувствате някои от следните:

- Симптоми на тежки алергични реакции като:
 - Подуване на лицето, езика или гърлото
 - Затруднено преглъщане
 - Копривна треска и затруднено дишане
- Тежки кожни реакции, които могат да включват образуване на мехури по кожата.

Уведомете Вашия лекар веднага, ако почувствате следните странични реакции:

- Възпаление на очите, обикновено с болка, зачервяване и чувствителност към светлина.
- Костна некроза на челюстта (остеонекроза), свързано със забавяне на заздравяването и инфекция, често след екстракция на зъб (вж. точка 2 „Предупреждения и предпазни мерки”).
- Симптоми, свързани с хранопровода, като например болка при преглъщане, затруднено преглъщане, болка в гърдите или поява или влошаване на стомашни киселини.

Въпреки това, по време на клинични проучвания другите нежелани ефекти, които се наблюдават, обикновено са леки и не са причина пациентът да спре приема на таблетките.

Нежеланите ефекти са представени в зависимост от честотата, с която те се появяват. Използвано е следното условно означение:

Много чести:	засягат повече от 1 пациент на 10
Чести:	засягат 1 до 10 пациенти на 100
Нечести:	засягат 1 до 10 пациенти на 1 000
Редки:	засягат 1 до 10 пациенти на 10 000
Много редки:	засягат по-малко от 1 пациент на 10 000
С неизвестна честота:	честотата не може да бъде определена от наличните данни

Чести нежелани реакции

- Нарушено храносмилане, гадене, болки в стомаха, стомашни спазми или дискомфорт, запек, чувство за тежест, подуване на корема, диария
- Болка в костите, мускулите или ставите
- Главоболие

Нечести нежелани реакции

- Възпаление или язва на хранопровода (тръбата, която свързва устата със стомаха) причиняващо затруднение и болка при преглъщане (вж. също точка 2 „Предупреждения и предпазни мерки”), възпаление на стомаха и дванадесетопръстника (черво, което отвежда храната от стомаха)
- Възпаление на оцветената част на окото (ирис) (зачервени болезнени очи с възможно изменение в зрението)

Редки нежелани реакции

- Възпаление на езика (зачервен, подут, евентуално болезнен), стесняване на хранопровода (тръбата, която свързва устата със стомаха)



- Има съобщения за отклонения в изследванията на чернодробната функция. Те могат да бъдат диагностицирани единствено с изследване на кръвта

По време на пост-маркетинговия опит е съобщено следното (с неизвестна честота):

- Опадане на коса
- Чернодробни нарушения, в някои случаи тежки
- Възпаления на малките кръвоносни съдове повлияващо основно кожата (левкоцитокластичен васкулит).

Рядко, в началото на лечението, нивата в кръвта на калций и фосфати у пациентите могат да се понижат. Тези промени обикновено са незначителни и не водят до проява на симптоми.

Необичайна фрактура на бедрената кост, особено при пациенти на дългосрочно лечение за остеопороза, настъпва рядко. Свържете се с Вашия лекар, ако усетите болка, слабост или дискомфорт в бедрото, таза или слабините, тъй като това може да бъде ранна индикация за възможно счупване на бедрената кост.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Бифодрон

- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Бифодрон

- Активното вещество е 35 mg ризедронат натрий (аморфен), еквивалентен на 32,48 mg ризедронова киселина.
- Помощните вещества са: магнезиев стеарат, кросповидон, лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, хипромелоза (E464), силициев диоксид, колоиден, безводен, хидроксипропилцелулоза (E463), макрогол 400, макрогол 8000, титанов диоксид (E171), железен оксид жълт (E172), железен оксид червен (E172)

Как изглежда Бифодрон и какво съдържа опаковката

Филмирана таблетка.

Оранжева, 9,0 mm кръгла, филмирана таблетка.

Видове опаковки:

Блистери: 2, 4, 8 и 12 филмирани таблетки

Опаковки за таблетки: 40 и 50 филмирани таблетки

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.



Притежател на разрешението за употреба

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjörður
Исландия

Производител

Actavis hf.
Reykjavikurvegur 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
Исландия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:

България	Бифодрон
Германия	Risedronsäure-Actavis 35 mg Filmtabletten
Италия	Risedronato Actavis
Нидерландия	Risedronaat-natrium Actavis 35 mg
Швеция	Risedronat Actavis
Обединеното кралство	Risedronate sodium 35 mg film-coated tablets

Дата на последно преразглеждане на листовката: Септември 2013 г.

