

Un ej

Samuel Fernández Riquelme

October 2023

1 Introduction

Problema: Una sucesión $(a_n)_n$ es contractiva si $|a_{n+1} - a_n| \leq c|a_n - a_{n-1}|$, con $0 < c < 1$. Demostrar que si una sucesión es contractiva, entonces es convergente.

Demostración: Empezamos observando que si la sucesión es contractiva, entonces $|a_{n+1} - a_n| \leq c^n|a_1 - a_0|$ (asumiendo que empieza en $n = 0$). Esta propiedad se puede deducir de la definición trivialmente, por lo que se deja como ejercicio.

A partir de este punto, nuestro objetivo va a ser llegar a la conclusión de que toda sucesión contractiva es de Cauchy, y, por un resultado visto en clase, también convergente. Por definición, una sucesión es de Cauchy cuando

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n, m \geq n_0 \implies |a_m - a_n| < \varepsilon$$

Otra propiedad bastante lógica que se podría probar por inducción es, $a_m - a_n = \sum_{i=n}^{m-1} a_{i+1} - a_i$, para $m \geq n$. Por tanto, $|a_m - a_n| = |\sum_{i=n}^{m-1} a_{i+1} - a_i|$, además, aplicando la desigualdad triangular, $|\sum_{i=n}^{m-1} a_{i+1} - a_i| \leq \sum_{i=n}^{m-1} |a_{i+1} - a_i|$, asimismo, usando la primera observación, $\sum_{i=n}^{m-1} |a_{i+1} - a_i| \leq \sum_{i=n}^{m-1} c^i |a_1 - a_0| = |a_1 - a_0| \sum_{i=n}^{m-1} c^i = |a_1 - a_0| (\sum_{i=0}^{m-1} c^i - \sum_{i=0}^n c^i)$.

Otro resultado útil es que $\sum_{i=0}^n c^i = \frac{1-c^{n+1}}{1-c}$ y para $0 < c < 1$ también cumple $\frac{1-c^{n+1}}{1-c} < \frac{1}{1-c}$; por tanto, $|a_1 - a_0| (\sum_{i=0}^{m-1} c^i - \sum_{i=0}^n c^i) < |a_1 - a_0| (\frac{1}{1-c} - \frac{1-c^{n+1}}{1-c})$. Además, resulta que $(\frac{1-c^{n+1}}{1-c})_n \rightarrow \frac{1}{1-c}$, por lo que la diferencia $\frac{1}{1-c} - \frac{1-c^{n+1}}{1-c}$ siempre se va a poder hacer todo lo pequeña que uno quiera y, en concreto, más pequeña que un dado $|a_1 - a_0|\varepsilon$, con $\varepsilon > 0$.

Esto es equivalente a la definición de sucesión de Cauchy, permitiéndonos asegurar que, efectivamente, una sucesión contractiva es de Cauchy y, consecuentemente, convergente.

2 Ejercicio 7

Sean $b_i, 1 \leq i \leq n$, números reales positivos cuyo producto es 1.

a) Demuestre que si no todos los b_i son iguales y están ordenados de forma creciente, entonces $b_1 < 1 < b_n$.

Dem: Por reducción al absurdo, si asumimos que todos son menores

3 Ejercicio 22*

Sean A y B dos subconjuntos no vacíos de \mathbb{R} . Se definen

$$A + B = \{x = a + b : a \in A, b \in B\}, -A = \{x = -a : a \in A\}$$

a) Supongamos que A, B están acotados superiormente. Sabemos que existen $x, x' \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq x, \forall a \in A$ y $b \leq x', \forall b \in B$, definiendo $c = \max\{x, x'\}$ nos queda que $a \leq c$ para todo $a \in A \cup B$

por la transitividad; en consecuencia, $A \cup B$ está acotado. Por otra parte, para cada a en A se cumple $a \leq x$ y, recíprocamente, $b \leq x'$ para cada b en B . Operando un poco $\forall a \in A, \forall b \in B, a \leq x \wedge b \leq x' \implies a + b \leq x + b \wedge x + b \leq x + x' \implies a + b \leq x + x'$, por lo que $x + x'$ es una cota superior de $A + B$ (i.e. $A + B$ está acotado).

4 2.5 OCW

Si $a > 0$ tomamos $x_1 > \sqrt{a}$ y definimos la sucesión recurrente $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mediante la fórmula

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

a) Demuestre que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona decreciente y que $\lim_n x_n = \sqrt{a}$

Sol: Empezamos viendo que la sucesión está acotada por \sqrt{a} , ya que, partiendo de que $x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ y, claramente, $(x_n - \sqrt{a})^2 > 0$, nos queda $(x_n - \sqrt{a})^2 = x_n^2 - 2x_n\sqrt{a} + a > 0 \implies x_n^2 + a > 2x_n\sqrt{a} \implies x_n + \frac{a}{x_n} > 2\sqrt{a} \implies \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) > \sqrt{a}$. Además, por el enunciado, también sabemos que $x_1 > \sqrt{a}$, por lo que $x_n > \sqrt{a}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Continuamos observando que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona decreciente a partir de que $x_n > x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \iff 2x_n > x_n + \frac{a}{x_n} \iff x_n > \frac{a}{x_n} \iff x_n^2 > a \iff |x_n| = x_n > \sqrt{a}$, lo cual sabemos que es cierto por lo anteriormente demostrado.

Una vez llegados a la conclusión de que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona y acotada sabemos que es convergente a un límite, $L = \lim (x_n)_n$, que debe cumplir $L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{a}{L} \right) \iff 2L = L + \frac{a}{L} \iff L^2 = a \iff L = \pm\sqrt{a}$, pero como la sucesión es positiva siempre solo puede ser $L = \sqrt{a}$. \square .

b) Sea $\varepsilon_n := x_n - \sqrt{a}$. Demuestre que

$$\varepsilon_{n+1} = \frac{\varepsilon_n^2}{2x_n} < \frac{\varepsilon_n^2}{2\sqrt{a}}$$

y en consecuencia que

$$\varepsilon_{n+1} < \beta \left(\frac{\varepsilon_1}{\beta} \right)^{2^n}, \forall n \in \mathbb{N}$$

donde $\beta := 2\sqrt{a}$.

Sol: En la primera parte basta con aplicar la definición, $\varepsilon_{n+1} = x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) - \sqrt{a} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} - 2\sqrt{a} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{x_n^2 - 2x_n\sqrt{a} + a}{x_n} \right) = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n} = \frac{\varepsilon_n^2}{2x_n}$, y, por otra parte, $x_n > \sqrt{a} \implies \frac{1}{x_n} < \frac{1}{\sqrt{a}} \implies \frac{\varepsilon_n^2}{2x_n} < \frac{\varepsilon_n^2}{2\sqrt{a}}$.

La otra parte del apartado la demostraremos por inducción:

Caso base: $n = 1$.

$$\varepsilon_2 < \frac{\varepsilon_1^2}{\beta} = \beta \left(\frac{\varepsilon_1}{\beta} \right)^2$$

De esta manera sabemos que se cumple para $n = 1$.

Salto de inducción: asumimos que la desigualdad es cierta para n y la demostramos para $n + 1$.

$$\varepsilon_{n+1} < \beta \left(\frac{\varepsilon_1}{\beta} \right)^{2^n} \implies \frac{\varepsilon_{n+1}}{\beta} < \left(\frac{\varepsilon_1}{\beta} \right)^{2^n} \implies \frac{\varepsilon_{n+1}^2}{\beta^2} < \left(\frac{\varepsilon_1}{\beta} \right)^{2^{n+1}}$$

$$\implies \beta \left(\frac{\varepsilon_1}{\beta} \right)^{2^{n+1}} > \frac{\varepsilon_{n+1}^2}{\beta} > \frac{\varepsilon_{n+1}^2}{2x_{n+1}} = \varepsilon_{n+2}$$

□.

5 7 *

Sea $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(0) = f(1)$. Pruebe que existe algún $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = f(x + \frac{1}{2})$.

Dem: Sea $g : [0, \frac{1}{2}] \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{2})$, donde claramente g es continua debido a que es suma de funciones continuas. A continuación, nuestro objetivo es probar que $\exists x \in [0, \frac{1}{2}] : g(x) = 0$, ya que implicaría lo que buscamos.

Si $g(0) = 0$ ya habríamos terminado, por lo que a partir de aquí asumiremos que $g(0) \neq 0$. Supongámos, sin pérdida de generalidad, que $g(0) > 0$, por tanto,

$$f(0) - f(\frac{1}{2}) > 0 \implies f(0) > f(\frac{1}{2})$$

además, como $f(0) = f(1)$, sabemos que $f(1) > f(\frac{1}{2})$, y en consecuencia $f(\frac{1}{2}) - f(1) = g(\frac{1}{2}) < 0$. Al cumplirse $g(0) > 0$ y $g(\frac{1}{2}) < 0$, y aplicando el teorema de Bolzano-Weierstrass, sabemos que $\exists x \in [0, \frac{1}{2}] : g(x) = 0 \implies \exists x \in [0, \frac{1}{2}] : f(x) = f(x + \frac{1}{2})$. □

6 Ejercicio 76 *

Sea $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ una función continua tal que para $x, y \in [a, b]$ arbitrarios, verifica

$$|f(x) - f(y)| \geq |x - y|$$

a) Demuestre que $f(a) = a$ o $f(a) = b$.

Sol: Si $f(a) = a$ ya lo tenemos, por lo que asumiremos que $f(a) \neq a$ (i.e. $f(a) > a$) y tenemos que probar que necesariamente $f(a) = b$.

Por el ejercicio anterior sabemos que f debe ser monótona. No obstante, es fácil ver que en este caso no puede ser creciente, ya que quedaría $|f(b) - f(a)| = f(b) - f(a) \geq b - a = |b - a| \implies f(b) \geq b - a + f(a)$, pero como $f(a) > a$ implicaría $f(b) > b$, lo cual es absurdo. De esta manera sabemos que f es monótona decreciente.

Para terminar, observamos que $f(b) \geq a$ y como f es decreciente, $|f(a) - f(b)| = f(a) - f(b) \geq b - a = |b - a| \implies f(a) \geq b - a + f(b) \geq b$. En conclusión, $f(a) = b$. \square

b) Suponga que $f(a) = a$, considere la sucesión recurrente $x_n = f(x_{n-1})$, $x_0 \in [a, b]$ arbitrario. Demuestre que $(x_n)_n$ converge a un punto l tal que $f(l) = l$.

Sol: Por el ejercicio anterior (el 75) sabemos que f es estrictamente monótona. Además, como $f(a) = a$ por el enunciado, f tiene que ser estrictamente creciente.

A continuación, dividimos la demostración en dos casos, probando (por inducción) que $(x_n)_n$ es monótona en ambos:

- Cuando $f(x_0) > x_0$. El caso base es directo, ya que $x_1 = f(x_0) > x_0$ por hipótesis. Para el paso inductivo asumimos que $x_n > x_{n-1}$ y, por ser f creciente, nos queda que $x_n > x_{n-1} \implies f(x_n) > f(x_{n-1}) \implies x_{n+1} > x_n$. Por ende, la sucesión es creciente.
- En caso contrario, cuando $f(x_0) \leq x_0$. Al igual que antes, el caso base sale directo. Para el paso inductivo asumimos que $x_n \leq x_{n-1}$ y, análogamente a lo anterior, vemos que $x_n \leq x_{n-1} \implies f(x_n) \leq f(x_{n-1}) \implies x_{n+1} \leq x_n$. Por tanto, la sucesión es decreciente.

De esta manera concluimos que, sin importar el caso, la sucesión $(x_n)_n$ es monótona y claramente está acotada, de lo que se sigue el hecho de que también es convergente. Al ser convergente, tiende a un límite l que debe cumplir $f(l) = l$. \square

c) En el caso $f(a) = a$, deduzca que f es la identidad.

Sol: Nuestro objetivo va a ser demostrar que $f(x) \geq x \wedge f(x) \leq x, \forall x \in [a, b]$, para así concluir por la antisimetría que $f(x) = x, \forall x \in [a, b]$.

Por un lado, sabemos por el enunciado que $|f(x) - f(a)| = f(x) - a \geq x - a = |x - a|$, desarrollando nos queda que $f(x) - a \geq x - a \implies f(x) \geq x$. Además, de aquí sacamos que $f(b) \geq b$ por lo que se debe dar $f(b) = b$.

Por otro lado, de manera análoga y aplicando el hecho de que $f(b) = b$, sabemos que $|f(b) - f(x)| = b - f(x) \geq b - x = |b - x|$ y por tanto $f(x) \leq x$. \square

7 Ejercicio 7 cap 5

Sea $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ una aplicación inyectiva y $A = \{n \in \mathbb{N} : f(n) \geq n\}$. Demostrar que A es un conjunto infinito.

Sol: Por reducción al absurdo. Supongamos que A es finito, en consecuencia tendrá máximo, llamémoslo $M = \max A$

8 Problema 1 Mayo 2023

(a) \preceq es una relación de orden en B^A .

Dem: Probemos las distintas condiciones:

- Reflexividad: Directa, ya que para todo f en B^A se cumple (i).
- Antisimetría: Por reducción al absurdo. Supongamos que $f \preceq g, g \preceq f$ y $f \neq g$, de lo que sacamos que (ii) se tiene que cumplir en sendos casos (ya que por hipótesis (i) es falsa). Sin embargo, $m := m(f, g) = m(g, f)$ por lo que nos quedaría $f(m) <' g(m)$ y $g(m) <' f(m)$ que es absurdo. En conclusión, si $f \preceq g$ y $g \preceq f$, entonces $f = g$.
- Transitividad: Sean $f, g, h \in B^A$, supongamos que $f \preceq g$ y $g \preceq h$. Si $f = g$ o $g = h$ lo que buscamos se cumple trivialmente, por lo que asumiremos que $f \neq g$ y $g \neq h$ implicando que (ii) se cumple en ambos casos. Con esta información sabemos que $f(m_0) <' g(m_0)$ y $g(m_1) <' h(m_1)$, con $m_0 = m(f, g)$ y $m_1 = m(g, h)$. Además, $m = m(f, h) \geq \min\{m_0, m_1\}$ ya que, por definición, si $a \in A$ precede a m_0 o m_1 , entonces $f(a) = g(a) = h(a)$. Nuestro objetivo va a ser demostrar que es, de hecho, una igualdad.

Dividimos la demostración en tres casos:

- Cuando m_0 precede a m_1 .

9 Prolema 2 Mayo 2022.

Sea $\emptyset \neq A \subseteq X$ un subconjunto no-vacío de X y definimos en X una relación \sim_A dada por la regla:

$$x \sim_A y \iff [x = y \vee x, y \in A].$$

(a) Demostrar que \sim_A es una relación de equivalencia. Identificar las clases de equivalencia.

Dem: Probamos las tres propiedades por separado:

- Reflexividad: Directa, ya que $\forall x \in X, x = x$ (i.e. se satisface la primera condición).
- Simetría: Al igual que con la propiedad anterior es directa, debido a que, por un lado, la igualdad ya es una relación de equivalencia (en concreto cumple la simetría); y, por otro lado, es indiferente el orden al escribir la pertenencia simultánea ($x, y \in A \iff y, x \in A$) por definición. En resumen, para $x, y \in X, x \sim_A y \implies y \sim_A x$.
- Transitividad: Sean $x, y, z \in X : x \sim_A y \wedge y \sim_A z$. En el caso en el que $x = y \vee y = z$ el resultado se alcanza trivialmente, por lo que supondremos que $x \neq y \wedge y \neq z$ (i.e. en sendos casos se cumple la segunda condición). Una vez aquí, es fácil ver que $x, y, z \in A$, o en otras palabras, $x \sim_A z$.

De esta manera quedan probadas las tres propiedades, lo cual es idéntico a afirmar que \sim_A es una relación de equivalencia. \square

(b) En el caso particular en que $X = \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$ es el cilindro canónico de \mathbb{R}^3 y $A = \mathbb{S}^1 \times \{0\}$ es su base, demostrar que X/A está en biyección con el tronco de cono invertido

$$C = \{(x, y, z) \in [-1, 1]^2 \times [0, 1] : x^2 + y^2 = z^2\}.$$

Nota: \mathbb{S}^1 denota la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 1, es decir, los puntos (x, y) del plano tales que $x^2 + y^2 = 1$.

Dem: El primer paso es expresar X/A de manera más precisa. Quedaría

$$X/A = \{A\} \cup \{(x, y, z) : (x, y, z) \in X \setminus A\}.$$

Esto es debido a que todos los elementos de A pertenecen a la misma clase de equivalencia y el resto de elementos de X únicamente están relacionados con sí mismos.

A continuación, consideramos $B = \{(0, 0, 0)\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \in X \setminus A\}$ y construimos una biyección $\varphi : B \longrightarrow X/A$ tal que

$$\varphi(x, y, z) := \begin{cases} A & \text{si } (x, y, z) = (0, 0, 0) \\ \{(x, y, z)\} & \text{en caso contrario} \end{cases}.$$

Es fácil ver que la aplicación φ está bien definida y que asimismo es biyectiva (se deja como ejercicio probar la anterior afirmación). Nuestro objetivo a partir de aquí es definir una biyección $f : B \longrightarrow C$. La construimos de la siguiente manera:

$$f(x, y, z) := \begin{cases} (0, 0, 0) & \text{si } (x, y, z) = (0, 0, 0) \text{ [i.e. } z = 0] \\ (xz, yz, z) & \text{en caso contrario} \end{cases}.$$

Lo primero de lo que podemos percatarnos para facilitar la verificación de que f está bien definida y de que es, en efecto, biyectiva es que con $z = 0$ existe un único elemento, $(0, 0, 0)$, en el dominio. Además, este elemento manda imagen solamente a $(0, 0, 0)$ y también recibe exclusivamente de él mismo (fácil de comprobar). En consecuencia, de este momento en adelante asumiremos que $z \neq 0$.

Empezamos probando que f está bien definida, es decir, las imágenes de cada elemento del dominio pertenecen a C ; el codominio. De la información del enunciado sabemos que $\forall(x, y, z) \in B, x^2 + y^2 = 1$, lo cual implica que $(xz)^2 + (yz)^2 = x^2 z^2 + y^2 z^2 = z^2(x^2 + y^2) = z^2$, por lo que $f(x, y, z) = (xz, yz, z) \in C$ ya que satisface la condición de comprensión de C .

Una vez verificado que f está bien definida, pasamos a ver la inyectividad. Supongamos que $f(x, y, z) = f(x', y', z')$, entonces $(xz, yz, z) = (x'z', y'z', z')$, de lo que deducimos que $z = z'$. Continuando, nos queda que $xz = x'z \implies x = x'$ y que $yz = y'z \implies y = y'$. Con esto hemos refutado que f es inyectiva.

Por último, la sobreyectividad (muy similar la antepenúltima demostración). Sea $(x, y, z) \in C$, en consecuencia $x^2 + y^2 = z^2$ y a su vez, operando de forma recíproca a uno de los apartados anteriores, $\frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2} = \frac{1}{z^2}(x^2 + y^2) = 1$. Con esta información sacamos que $(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, z) \in B$ y, además, $f(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, z) = (x, y, z), \forall(x, y, z) \in C$. Por ende f es sobreyectiva.

En conclusión, hemos contrado una aplicación biyectiva φ entre B y X/A y otra f entre B y C . Por tanto, tomando $\phi = f \circ \varphi^{-1} : X/A \longrightarrow C$ estamos definiendo una biyección entre X/A y C . \square

10 Ejercicio para mi amigui alejandromeda

Calcular el resto de dividir 211^{3143} entre 12.

Sol: Primero vemos que $211 \equiv 7 \pmod{12}$, por lo que $211^2 \equiv 49 \equiv 1 \pmod{12}$. A continuación observamos que $3143 = 2 \cdot 1571 + 1$, en consecuencia $211^{3143} \equiv 7^{3143} \equiv 7^{2 \times 1571 + 1} \equiv (7^2)^{1571} 7 \equiv 7 \pmod{12}$. Dicho de otro modo, el resto de dividir 211^{3143} entre 12 es 7. \square

11 Otro problema más para mi vestíbulo :v

Demostrar que si a_1, a_2, \dots, a_n son n enteros consecutivos, entonces n divide a uno de ellos.

Sol: Empezamos reescribiendo $a_i = a_1 + i - 1$, para todo $1 < i \leq n$ (es fácil ver que es una expresión equivalente a la original). Si $n \mid a_1$ ya habríamos terminado, por ende asumiremos que $n \nmid a_1$. Por otra parte, aplicando el algoritmo de la división entera, sabemos que $a_1 = qn + r$ donde $0 < r < n$ (estricta también por la izquierda en consecuencia la asunción anterior). Dicho esto, podemos observar que $a_{n-r+1} \equiv a_1 + n - r + 1 - 1 \equiv a_1 - r \pmod{n}$; pero, además, $a_1 \equiv r \pmod{n}$, por tanto $a_{n-r+1} \equiv a_1 - r \equiv r - r \equiv 0 \pmod{n}$ (i.e. $n \mid a_{n-r+1}$).

Por último, nos queda probar que $n - r + 1 \in (1, n] \cap \mathbb{N}$ (desmesuradamente fácil). Por hipótesis $0 < r < n$, desarrollando

$$0 < r < n \implies -n < -r < 0 \implies 0 < n - r < n \implies 1 < n - r + 1 \leq n.$$

Juntando todo nos queda que $n \mid a_{n-r+1}$ y que dicho número forma parte de la secuencia original, por lo que queda demostrada la proposición. \square

12 Problema 2 Enero 2022 (para mi amigo yija)

Sean A y B conjuntos no vacíos y sea $\text{Apl}(A, B)$ el conjunto de las aplicaciones $f : A \rightarrow B$. Definimos la relación de equivalencia en $\text{Apl}(A, B)$ dada por:

$$f \sim g \iff \text{Im}(f) = \text{Im}(g).$$

(a) Demostrar que el conjunto cociente $\frac{\text{Apl}(A, B)}{\sim}$ es equipotente al subconjunto \mathcal{Y} de $\mathcal{P}(B)$ formado por los $Y \in \mathcal{P}(B)$ tales que $0 < |Y| \leq |A|$.

Dem: Construimos la aplicación $\varphi : \frac{\text{Apl}(A, B)}{\sim} \rightarrow \mathcal{Y}$ que satisface

$$\varphi([f]) = \text{Im}(f)$$

y probamos que está bien definida y que es, en efecto, biyectiva (i.e. $\frac{\text{Apl}(A, B)}{\sim}$ es equipotente a \mathcal{Y}).

Empezamos comprobando que está bien definida. Si para cada $f \in \frac{\text{Apl}(A, B)}{\sim}$ consideramos la restricción $\bar{f} : A \rightarrow \text{Im}(f) \subseteq B$ tal que $\bar{f}(a) = f(a)$ para todo $a \in A$, es directo notar que \bar{f} es sobreyectiva y que, por tanto, tiene inversa por la derecha. Llamemos $g : \text{Im}(f) \rightarrow A$ a una aplicación que cumpla $\bar{f} \circ g = \text{Id}_{\text{Im}(f)}$ (existe tal g por lo anterior mencionado). Por un resultado de clase, si la composición de dos aplicaciones es inyectiva, entonces la aplicación a la derecha también lo es; y como la identidad es claramente inyectiva, inequívocamente también lo será g . De esta manera hemos encontrado una inyección de $\text{Im}(f)$ a A o, dicho de otro modo, $|\text{Im}(f)| \leq |A| \implies \text{Im}(f) \in \mathcal{Y}$.

Continuamos probando la inyectividad. Supongamos que $\varphi([f]) = \varphi([g])$, en consecuencia $\text{Im}(f) = \text{Im}(g) \implies f \sim g \implies [f] = [g]$. (Demasiado corta para ser verdad xddd.)

Por último, vemos que verifica la sobreyectividad. Sea $Y \in \mathcal{Y}$ arbitrario. Por definición $|Y| \leq |A|$, lo cual implica que existe una aplicación inyectiva $f : Y \rightarrow A$ y, recíprocamente a uno de los apartados anteriores, tiene inversa por la izquierda; denotamos $g : A \rightarrow Y$ a dicha aplicación. Para cada $a \in A \setminus \text{Im}(f)$ asignamos $g(a) = y$, siendo y un elemento arbitrario de Y . Es trivial notar que $\text{Im}(g) = Y$ (i.e. $\exists [g] \in \frac{\text{Apl}(A, B)}{\sim} : \varphi([g]) = Y$).

En conclusión, hemos demostrado que φ es una aplicación biyectiva entre $\frac{\text{Apl}(A, B)}{\sim}$ y \mathcal{Y} , equivalente a atestiguar que $\frac{\text{Apl}(A, B)}{\sim}$ es equipotente a \mathcal{Y} . \square

13 OCW, ej. 1.4.2

Sean A y B subconjuntos acotados de números reales estrictamente positivos tales que $\inf B > 0$.

a) Sea $1/B := \{1/b : b \in B\}$. Pruebe que $\sup(1/B) = 1/(\inf B)$.

Dem: Sea $w = \inf B > 0$. Por definición, $0 < w \leq b, \forall b \in B$, de lo que sacamos que (resultado de clase) $0 < 1/b \leq 1/w, \forall b \in B$ o, dicho de otro modo, $1/w$ es cota superior de $1/B$.

Por otra parte, consideramos $u \in 1/B$ arbitrario tal que $0 < u < 1/w$. Operando de forma similar a lo anterior, $0 < w < 1/u$ y como w es el ínfimo de B sabemos que existe un $b \in B : 0 < b < 1/u$. Reinvirtiendo los cambios nos queda que, para dicho b , $0 < u < 1/b$; es decir, u no es cota superior de $1/B$, de lo que deducimos que $1/w = \sup(1/B)$. \square

14 Ejercicio 18 (3.2) del libro to chevere

Sea $A = (a_n)_n \subset \mathbb{R}$ una sucesión de números reales positivos tal que $\lim(a_{n+1}/a_n) = L > 1$. Pruebe que A no está acotada y que, por tanto, no es convergente.

Dem: Consideramos $r \in \mathbb{R}$ tal que $1 < r < L$ y tomamos $\varepsilon := L - r > 0$. Como $(\frac{a_{n+1}}{a_n})_n$ converge a L sabemos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|\frac{a_{n+1}}{a_n} - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$ natural. Cabe notar que para dichos n se cumple que $a_{n+1}a_n > 0$ (i.e. tienen el mismo signo), ya que en caso contrario su cociente sería negativo y resultaría en $L - \frac{a_{n+1}}{a_n} > L > \varepsilon$, lo cual es contradictorio. Sin pérdida de generalidad asumiremos que $a_{n_0} > 0$ y, por tanto, $a_n > 0, \forall n \geq n_0$. Desarrollando un poco la expresión $|\frac{a_{n+1}}{a_n} - L| < \varepsilon$ nos queda

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - L \right| < \varepsilon \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} - L > -\varepsilon \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} > L - \varepsilon = r \implies a_{n+1} > a_n r.$$

Realizando el mismo desarrollo repetidamente resulta en que $a_{n+1} > a_n r > a_{n-1} r^2 > \dots > a_{n_0} r^{n-n_0+1}$, para $n \geq n_0$. Al ser $r > 1$ deducimos que $(a_n)_n \rightarrow \infty$, por lo que no es acotada ni convergente. \square

15 Ejercicio 77 (con estrellita)

Una función se dice lipschitziana si existe una constante $k > 0$ tal que

$$|f(x) - f(y)| < k|x - y|$$

para cada par de puntos en el dominio de f . Si $0 < k < 1$ la función se denomina *contractiva*.

El objetivo es probar el siguiente teorema: si $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ es contractiva, entonces f tiene un único punto fijo.

DEMOSTRACIÓN: En primer lugar demostramos que f tiene al menos un punto fijo (i.e. $f(x_0) = x_0$ para algún $x_0 \in [a, b]$). Si se diese $f(a) = a$ o $f(b) = b$ ya habríamos terminado, por lo que asumiremos que $f(a) > a$ y $f(b) < b$. Dicho esto, consideramos $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$ tal que $g(x) := f(x) - x$, de donde observamos que g es continua al ser suma de funciones con dicha propiedad. Por hipótesis sabemos que $g(a) > 0$ y $g(b) < 0$; en consecuencia, aplicando el Teorema de Bolzano, existe $x_0 \in [a, b]$ tal que $g(x_0) = 0$ o, dicho de otro modo, $f(x_0) = x_0$.

A continuación suponemos que tiene más de un punto fijo para llegar a una contradicción. Denotemos $x_1 \in [a, b]$ a un punto tal que $x_1 \neq x_0 \wedge f(x_1) = x_1$. Sin embargo, esta afirmación conlleva que

$$\frac{|f(x_1) - f(x_0)|}{|x_1 - x_0|} = \frac{|x_1 - x_0|}{|x_1 - x_0|} = 1 > k,$$

lo cual contradice la condición del enunciado. De esta manera se infiere que hay un solo punto fijo en f . \square

a, b) Para cualquier $x_0 \in [a, b]$, defina la sucesión recurrente $x_n := f(x_{n-1})$. Demuestre que $(x_n)_n$ converge al punto fijo de f .

DEMOSTRACIÓN: En primer lugar, juntando la definición de función contractiva y de la sucesión presentada, obtenemos que

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| < k \cdot |x_n - x_{n-1}|, \text{ para todo } n \geq 2,$$

de donde se deduce sin mucha dificultad que

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k^{n-1} \cdot |x_2 - x_1| \leq k^{n-1} \cdot (b - a), \quad (1)$$

lo cual nos va a ser de especial ayuda para probar la convergencia de $(x_n)_n$. En concreto, veamos que se trata de una sucesión de Cauchy.

Para ello, acotamos la distancia $|x_m - x_n|$, donde $m > n$, de la siguiente forma:

$$|x_m - x_n| = |x_m - x_{m-1} + x_{m-1} + \cdots - x_{n+1} + x_{n+1} - x_n|,$$

para, a continuación, aplicar la desigualdad triangular

$$|(x_m - x_{m-1}) + \cdots (x_{n+1} - x_n)| \leq |x_m - x_{m-1}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n|,$$

donde, invocando (1), obtenemos que

$$|x_m - x_{m-1}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \leq (b - a) \cdot \frac{k^{n-1} - k^{m-1}}{1 - k} < (b - a) \cdot \frac{k^{n-1}}{1 - k},$$

obteniendo de esta manera que se trata de una sucesión de Cauchy, pues $(k^{n-1}/(1 - k))_n \rightarrow 0$ al ser $0 < k < 1$ ¹.

¹Los razonamiento más precisos se dejan al cuidado del lector, ya que pueden enriquecer sus destrezas.

Al ser $(x_n)_n$ de Cauchy, y por tanto convergente, sabemos que el límite $x := \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) \in [a, b]$ satisface que $f(x) = x$, con lo que concluimos definitivamente que dicho límite es el único punto fijo de f , apoyándonos de cierta manera en el apartado anterior. \square

16 Problema 1 OME Fase Local (pero en Murcia)

Hallar el menor entero positivo n tal que la suma de los n términos

$$A(n) = 1 + 11 + 111 + \dots + 11\dots 11$$

sea divisible por 45.

SOL: En primer lugar, notamos que $45 \mid A(n) \iff 5 \mid A(n) \wedge 9 \mid A(n)$, por lo que buscamos la carecterización de los n que cumplen cada una de las dos condiciones por separado, para luego encontrar el menor n que satisfaga ambas simultáneamente.

Por un lado, para ver cuando 5 divide a $A(n)$, observamos que $5 \mid A(n) \iff A(n) = \sum_{i=1}^n a_i \equiv 0 \pmod{5}$, donde a_i corresponde al número formado por i dígitos 1. Además, como para potencias 10^i con $i \geq 1$ se da $10^i \equiv 0 \pmod{5}$, deducimos que $a_i \equiv 1 \pmod{5}$ para todo i entero positivo. En cosecuencia, $A(n) \equiv n \equiv 0 \pmod{5} \iff 5 \mid n$.

Por otro lado, realizando la misma observación pero esta vez con 9, $9 \mid A(n) \iff A(n) = \sum_{i=1}^n a_i \equiv 0 \pmod{9}$. En este caso, $10^i \equiv 1 \pmod{9}$ para todo $i \in \mathbb{N}$, por lo que $a_i \equiv i \pmod{9}$ y, a su vez,

$$A(n) \equiv 1 + 2 + \dots + n \equiv \frac{n(n+1)}{2} \pmod{9}.$$

En definitiva, $9 \mid A(n) \iff 9 \mid \frac{n(n+1)}{2}$ y, furthermore, es trivial notar que $9 \mid \frac{n(n+1)}{2} \iff 9 \mid n \vee 9 \mid n+1$.

En conclusión, observamos que $45 \mid A(n) \iff 5 \mid n \wedge [9 \mid n \vee 9 \mid n+1]$ y el menor n que lo satisface es $n = 35$, por lo que esa es la solución. \square

17 Otro EjErCiCiO de la OME (parapapa)

Dado $p \in \mathbb{N}$ un número primo, se dice que “ p verifica la propiedad \star ” si se tiene que

$$A(n, p) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+p-1}$$

es un número decimal periódico para todo entero positivo n . Determinar el conjunto de todos los números primos p que verifican la propiedad \star .

SOL: La primera observación que hay que hacer es: dado un número racional $m = p/q \in \mathbb{Q}$ tal que $p, q \in \mathbb{Z}$ y $\text{mcd}(p, q) = 1$, m es un número decimal periódico si, y solo si, existe $k \in \mathbb{N}$ número primo tal que $k \neq 2, 5$ y $k \mid q$. Con esto dicho, veamos que todo primo $p \neq 2$ satisface \star .

Empezamos observando que $p = 2$ no la cumple, pues para $n = 4$ resulta en $A(n, p) = A(4, 2) = 1/4 + 1/5 = 9/20 = 0.45$, que no es decimal periódico.

En contraposición, supongamos $p \neq 2$. Como dato general sabemos que en el conjunto $S := \{n, n+1, \dots, n+p-1\}$ de p números consecutivos hay exactamente un múltiplo de p (trivial de ver). Además, para cada n nos queda

$$A(n, p) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+p-1} = \frac{\sum_{i=0}^{p-1} a_i}{q},$$

siendo $q = n(n+1) \dots (n+p-1)$ el producto de los denominadores y $a_i = q/(n+i)$. Asumamos, sin pérdida de generalidad, que $n+k$ ($0 \leq k < p$) es el múltiplo de p en S . Consecuentemente, sabemos que $p \nmid a_k$ (aquí se aplica el hecho de que p es primo), mientras que $p \mid a_i$ para todo $i \neq k$. Por consiguiente, $p \nmid \sum_{i=0}^{p-1} a_i$ y, al simplificar la fracción, el factor p del denominador no se irá, con lo que deducimos que el resultado será periódico debido a que $p \neq 2$. \square

18 Se echaba de menos

Sea $f : I = (a - \delta, a + \delta) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces derivable en a , con $f''(a) \neq 0$. Para cada h sea $\theta(h)$ el número de $(0, 1)$ dado por la fórmula del teorema del valor medio de Lagrange:

$$f(a + h) = f(a) + f'(a + \theta(h)h)h.$$

a) Demuestra que si f'' es continua en a , entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que si $h \in (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus 0$, entonces el $\theta(h)$ es único.

SOL: Al darse $f''(a) \neq 0$ y f ser continua sabemos que f'' conserva el signo para un entorno de a . Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $f''(a + h) > 0$ para todo $h \in (-\varepsilon_0, \varepsilon_0)$, siendo $\varepsilon_0 > 0$. En consecuencia, f' es estrictamente creciente en $(-\varepsilon_0, \varepsilon_0)$ y, por tanto, es inyectiva en dicho intervalo.

En última instancia, como f' es inyectiva deducimos que el valor $\theta(h)$ que satisface la ecuación del enunciado es único, para todo $h \in (-\varepsilon_0, \varepsilon_0)$. \square

b) En condiciones del apartado anterior demuestra que $\theta : (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus 0 \rightarrow (0, 1)$ satisface

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \frac{1}{2}$$

SOL:

19 Salió en PCra

Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestra que

$$f \text{ convexa en } [0, 1] \implies \varphi(t) = f(t) + f(1-t) \text{ decreciente en } [0, 1/2].$$

SOL: Queremos probar que, dados $t, t' \in [0, 1/2]$ tales que $t' > t$ arbitrarios, se cumple $\varphi(t) \geq \varphi(t')$. Empezamos transformando la anterior desigualdad en otras equivalentes (que nos facilitarán la demostración)

$$\varphi(t) \geq \varphi(t') \iff f(t) + f(1-t) \geq f(t') + f(1-t') \iff f(t) - f(t') \geq f(1-t') - f(1-t),$$

además, como $t - t' < 0$, tenemos que

$$f(t) - f(t') \geq f(1-t') - f(1-t) \iff \frac{f(t) - f(t')}{t - t'} \leq \frac{f(1-t') - f(1-t)}{t - t'}$$

y, apoyándonos en un resultado visto en clase, sabemos que las pendientes van en aumento, por lo que la última desigualdad es verdadera y, en consecuencia, lo que queríamos probar también. \square

20 Ejercicio 14 TOPEM (muy difícil dicen).

Sea $X := \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Para cada $x \in X$, denotaremos mediante $S_n := \{m \in X : m \mid n\}$ al conjunto de los divisores de n , excluyendo el 1. Demostrar que la familia

$$\mathcal{B} := \{S_n : n \in X\}$$

define una base de una topología \mathcal{T} sobre X .

Dem: Para demostrarlo, veamos que verifica las dos condiciones de la proposición de los apuntes:

- (i) Dado $n \in X$ cualquiera, es trivial notar que $n \in S_n$, pues $n \mid n$. ✓
- (ii) Sean $S_n, S_m \in \mathcal{B}$ arbitrarios. Al ser S_n y S_m los conjuntos de los divisores de n y m , respectivamente, deducimos fácilmente que $S_n \cap S_m$ es el conjunto de aquellos que dividen a ambos simultáneamente. En el caso de que $\text{mcd}(n, m) = 1$, nos daría $S_n \cap S_m = \emptyset$, por lo que asumiremos de ahora en adelante que $\text{mcd}(n, m) > 1$.

Llamemos $d := \text{mcd}(n, m) > 1$ al máximo común divisor de n y m . Veamos, mediante doble inclusión, que $S_d = S_n \cap S_m$. (\subseteq) Por definición, $d \mid n \wedge d \mid m$, por lo que es fácil ver que $S_d \subseteq S_n \cap S_m$. (\supseteq) Además, también por definición, todo número $a \in X$ tal que $a \mid n \wedge a \mid m$ cumple que $a \mid d$, con lo que deducimos que $S_d \supseteq S_n \cap S_m$.

En resumen, para todo $x \in S_n \cap S_m$ tenemos que $x \in S_d \subseteq S_n \cap S_m$. ✓

A través de todo este razonamiento, concluimos que \mathcal{B} define una base de una topología sobre X ; denotemos a dicha topología con \mathcal{T} . □

(a) ¿Es abierto en X el conjunto $A := \{5, 10, 15\}$? ¿Y cerrado?

Sol: A no es abierto, veamos por qué. Para $10 \in A$, todo abierto $S_n \in \mathcal{B}$ que contenga el 10 también va a contener al 2 consecuentemente, por lo que no se puede verificar la condición para que A sea abierto en X respecto a la base \mathcal{B} .

Por otro lado, A tampoco es cerrado, pues su complementario, $C := X \setminus A$, tampoco es abierto. Esto se debe a que, por un argumento análogo al anterior, para $20 \in C$, todo $S_n \in \mathcal{B}$ tal que $20 \in S_n$ también cumple que $10 \in S_n$, pero $10 \notin C$. Al no ser C abierto, nos queda que A no es cerrado. □

(b) ¿Es (X, \mathcal{T}) de Hausdorff? Justificar la respuesta.

Sol: (X, \mathcal{T}) no es de Hausdorff, véase mediante un contraejemplo. Tomando $(x, y) = (10, 20) \in X^2$ y $V \in \mathcal{E}(y)$ arbitrario, al ser V unión abiertos de \mathcal{B} , deducimos que existe $S_n \in \mathcal{B}$ tal que $y \in S_n$. No obstante, como $x \mid y$, también sabemos que $x \in S_n$, por lo que $\{x\} \subseteq U \cap V$ para todo $U \in \mathcal{E}(x)$, pues $x \in U$ siempre. Más llanamente, para todo $U \in \mathcal{E}(x)$ y $V \in \mathcal{E}(y)$ se da $U \cap V \neq \emptyset$, por lo que (X, \mathcal{T}) no es de Hausdorff. □

(c) Para cada $m \in X$, dar una base de entornos de m .

Sol: Para cada $m \in X$ tomamos $\mathcal{E}(m) = \{S_m\}$. La demostración de que, efectivamente, dichas familias son entornos de sus respectivos puntos se deja como ejercicio. □

21 Demostraciones de cosas aleatorias UwU.

21.1 Definición equivalente de interior.

Sea S un subconjunto de un espacio topológico (X, \mathcal{T}) . Dado un punto $x \in X$, diremos que $x \in \text{int}S$ si y solo si existe un entorno de x contenido en S .

Dem: (\implies) Supongamos que $x \in \text{int}S$. En consecuencia, al ser $\text{int}S$ uniones de abiertos, existe $A \in \mathcal{T}$ tal que $A \subset S$ y $x \in A$, conjunto el cual, en pocas palabras, es un entorno de x contenido en S .

(\impliedby) Recíprocamente, asumamos que existe un entorno $A \in \mathcal{T}$ de x tal que $A \subset S$. En concreto, A es un abierto abierto contenido en S y, por cómo está definido el interior de un conjunto, es directo notar que $A \subset \text{int}S$. Por último, como $x \in A$ nos queda que $x \in \text{int}S$. \square

21.2 Proposición siguiente a lo de antes (le podrían poner numeritos la vdd).

Sean (X, \mathcal{T}) un espacio topológico y S un subconjunto de X . Entonces:

- (i) Si $S \subset T$, entonces $\text{int}S \subset \text{int}T$.
- (ii) S es abierto en X si, y sólo si, $S = \text{int}S$.
- (iii) Si $S_1, S_2, \dots, S_n \subset X$, entonces $\bigcap_{i=1}^n \text{int}S_i = \text{int}(\bigcap_{i=1}^n S_i)$. La afirmación no es cierta para la unión.

Dem: Demostremos cada punto por separado:

- (i) Sea $T \subset X$ tal que $S \subset T$, probemos que $\text{int}S \subset \text{int}T$. Dado $x \in X$, si $x \in \text{int}S$ entonces, aplicando la definición equivalente, existe $A \in \mathcal{B}(x)$ tal que $A \subset S$ y, además, como $S \subset T$ por hipótesis, la transitividad nos asegura que $A \subset T$. Para terminar, aplicando nuevamente la definición equivalente, llegamos a que $x \in \text{int}T$.
- (ii) (\implies) Supongamos que S es abierto en X . La inclusión $\text{int}S \subset S$ se tiene siempre trivialmente, por lo que nos centraremos en demostrar la otra inclusión (muy fácil también). Al ser S abierto y claramente $S \subset S$, nos queda que $S \subset \text{int}S$.
(\impliedby) En el otro sentido, supongamos que $S = \text{int}S$. Consecuentemente, para todo punto $x \in S$ existe un abierto $A \in \mathcal{B}(x)$ que lo contiene (entorno) tal que $A \subset S$. Por un resultado del tema anterior, sabemos que esta propiedad es equivalente a afirmar que S se puede escribir como unión de abiertos y, por tanto, S es a su vez un abierto.
- (iii) Para el último apartado, procedemos por inducción. Empezamos por el caso base con $n = 2$, probando la igualdad mediante doble inclusión.
 - (\subset) Si $x \in \text{int}S_1 \cap \text{int}S_2$, entonces sabemos que existen $A_1 \in \mathcal{B}(x)$ y $A_2 \in \mathcal{B}(x)$ tales que $A_1 \subset S_1$ y $A_2 \subset S_2$. Al ser $A_1, A_2 \in \mathcal{T}$ conjuntos abiertos, su intersección $A := A_1 \cap A_2$ también es un abierto que además satisface $A \subset A_1 \subset S_1$ y $A \subset A_2 \subset S_2$, por lo que A es un entorno de x contenido en $S_1 \cap S_2$, lo cual implica que $x \in \text{int}(S_1 \cap S_2)$.
 - (\supset) Recíprocamente, supongamos que $x \in \text{int}(S_1 \cap S_2)$. Tomando $A \in \mathcal{B}(x)$ tal que $A \subset S_1 \cap S_2$ es trivial ver que $x \in \text{int}S_1$ y $x \in \text{int}S_2$, pues $A \subset S_1$ y $A \subset S_2$ por separado.Para el paso inductivo, vertiginosamente trivial, notamos lo siguiente

$$\text{int}S_1 \cap \dots \cap \text{int}S_n \cap \text{int}S_{n+1} = (\text{int}S_1 \cap \dots \cap \text{int}S_n) \cap \text{int}S_{n+1},$$

pudiendo aplicar la hipótesis de inducción sobre el paréntesis y el resultado visto en el caso base, quedando

$$(\text{int} S_1 \cap \dots \cap \text{int} S_n) \cap \text{int} S_{n+1} = \text{int}(S_1 \cap \dots \cap S_n) \cap \text{int} S_{n+1} = \text{int}(S_1 \cap \dots \cap S_n \cap S_{n+1}).$$

La demostración se sigue del principio de inducción.

□

22 Ej 85 precioso según Pedro F(z) (posiblemente ni sepa hacerlo)

Un vaso cilíndrico de 20 *cm.* de altura y 8 *cm.* de diámetro de la base, contiene cierto volumen de líquido V . Calcule V sabiendo que para conseguir que comience a derramarse el líquido se ha de inclinar el vaso hasta que el plano determinado por la superficie del agua corte a la base según un diámetro de la misma.

23 Más topología :))

Sean (X, \mathcal{T}) un espacio topológico y $A \in \mathcal{T}$ un abierto. Demostrar que para cualquier subconjunto $S \subset X$ se cumple que $A \cap \overline{S} \subset \overline{A \cap S}$.

Dem: Dado $x \in X$, supongamos que $x \in A \cap \overline{S}$. En consecuencia, considerando $U \in \mathcal{E}(x)$ un entorno arbitrario y $U' := U \cap A$, notamos que $U' \cap S \neq \emptyset$, pues U' es otro entorno de x y, además, $x \in \overline{S}$ por hipótesis. Esta última propiedad es lo mismo que decir que $U \cap (A \cap S) \neq \emptyset$ para todo $U \in \mathcal{E}(x)$, por lo que concluimos que $x \in \overline{A \cap S}$. \square

Proposición (resultó ser tan fácil que ni mereció la pena): Sean (X, \mathcal{T}) un espacio topológico y $S \subset X$:

(i) $\partial S = \overline{S} \cap \overline{X \setminus S}$.

(ii) ∂S es cerrado.

(iii) $\overline{S} = \overset{\circ}{S} \cup \partial S$.

(iv) $\overset{\circ}{S} = X \setminus (\overline{X \setminus S})$, es decir, $x \in \overset{\circ}{S}$ si, y sólo si, $x \notin \overline{X \setminus S}$.

Proposición (subconjunto denso): Un subconjunto $D \subset X$ de un espacio topológico (X, \mathcal{T}) es denso en X si, y sólo si, cualquier abierto no vacío corta a D , es decir, si, y sólo si, $A \cap D \neq \emptyset$ para cualquier abierto no vacío A .

Dem: (\implies) Supongamos que D es denso en X . Entonces, dado $\emptyset \neq A \in \mathcal{T}$ arbitrario y tomando $x \in A$ cualquiera, sabemos que (por ser D denso) $X = \overline{D}$ y, en consecuencia, para todo $U \in \mathcal{E}(x)$ se tiene $U \cap D \neq \emptyset$. En particular, $A \in \mathcal{E}(x)$ por lo que $A \cap D \neq \emptyset$. \checkmark

(\impliedby) En el otro sentido, supongamos $A \cap D \neq \emptyset, \forall A \in \mathcal{T}$, con $A \neq \emptyset$. Por consecuente, para todo $x \in X$ y $U \in \mathcal{E}(x)$ tenemos que $U \cap D \neq \emptyset$ por hipótesis, pues cada U es un abierto no vacío. Con este razonamiento hemos llegado a que $X \subset \overline{D}$, no obstante, la otra contención se da siempre de por sí, con lo que $X = \overline{D}$. \square

Ejercicio 9. Demostrar que:

(i) \mathbb{Q} no es denso en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_D)$.

Dem: \mathbb{Q} no es denso en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_D)$ porque en dicha topología todo subconjunto $A \subset \mathbb{R}$ es cerrado (en concreto $A = \mathbb{Q}$) y, por tanto, $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$. \square

(ii) En cualquier espacio topológico la intersección finita de subconjuntos abierto y densos es un subconjunto denso.

Dem: Queremos probar que, dados $S_1, S_2, \dots, S_n \subset X$ subconjuntos abiertos y densos, su intersección $S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n$ también es densa. Procedemos mediante inducción sobre $n \in \mathbb{N}$, el número de subconjuntos abiertos y densos intersecados.

Comenzamos con el caso base $n = 2$. Aparte de proporcionar el caso base, este resultado también nos va a asegurar que la intersección de dos subconjuntos abiertos y densos es, a su vez, densa.

Para probar el caso base vamos a hacer uso de la proposición de los apuntes, en ambos sentidos. Sea $A \in \mathcal{T}$ arbitrario. Considerando $A' = A \cap S_1$ sigue siendo abierto pues S_1 también lo es. Por ende, aplicando el hecho de que S_1, S_2 son densos nos queda

$$A \cap (S_1 \cap S_2) = (A \cap S_1) \cap S_2 = A' \cap S_2 \neq \emptyset$$

y con esto y un bizcocho concluimos que $S_1 \cap S_2$ es denso en X .

Para el paso inductivo, la parte fácil, suponemos que nuestra hipótesis de inducción es verdadera para n . Entonces, dados $S_1, S_2, \dots, S_{n+1} \subset X$ subconjuntos abiertos y densos, operamos de la siguiente manera

$$S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n \cap S_{n+1} = (S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n) \cap S_{n+1}$$

y, aplicando la H.I., sabemos que el conjunto dentro paréntesis es denso (y claramente abierto), por lo que hacemos uso nuevamente del resultado probado en el caso base, quedándose lo que buscamos, que $S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_{n+1}$ es denso.

El resto de la demostración se sigue del principio de inducción. \square

(iii) \mathbb{N} es denso en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$ y no es denso en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_D)$.

24 Seguimos (con topología)

Ejercicio 6.- Sea $f : (X, \mathcal{T}) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}')$ una aplicación entre espacios topológicos, siendo (X, \mathcal{T}) 1AN, y sea $x \in X$. Demostrar que si, para toda sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty \subset X$ que converge a x se tiene que $(f(x_n))_{n=1}^\infty \subset Y$ converge a $f(x)$, entonces f es continua en x .

Dem: Por contrarrecíproco, supongamos que f no es continua en x y construíamos una sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty \subset X$ que converja a x pero tal que $(f(x_n))_{n=1}^\infty \subset Y$ no converja a $f(x)$. Con este objetivo, nos será de utilidad expresar nuestra hipótesis de manera más explícita: existe $V \in \mathcal{E}(f(x))$ tal que, para todo $U \in \mathcal{E}(x)$, existe $x' \in U$ con $f(x') \notin V$.

Otro resultado, visto en clase, que facilitará la demostración es que, apartir de una base de entornos numerable $\mathcal{B}'(x) = \{B'_1, B'_2, B'_3, \dots\}$, se puede construir otra base $\mathcal{B}(x) = \{B_1, B_2, B_3, \dots\}$ (también numerable) tal que sus elementos formen un conjunto completamente ordenado con el orden de inclusión. En particular, dados $B_i, B_j \in \mathcal{B}(x)$, se satisface que $B_i \supset B_j$ si $i \leq j$.

Con estas dos anotaciones expuestas podemos empezar con la demostración propiamente dicha. Considerando $V \in \mathcal{E}(f(x))$ el entorno de $f(x)$ mencionado en el primer párrafo, nos centramos en la sucesión $(x_n)_n \subset X$, donde $x_n \in X$ es un elemento de X tal que $x_n \in B_n$ y, además, $f(x_n) \notin V$. La existencia de dicho x_n queda asegurada por la observación efectuada al comienzo de la demostración.

Lo único restante es corroborar que $(x_n)_n \subset X$ converge a x , mientras que $(f(x_n))_n \subset Y$ no converge a $f(x)$. Ambas tareas son triviales de realizar, por lo que se dejan como ejercicio. \square

25 Socorriendo a yija

Sea $\varepsilon > 0$. Como $(a_n)_n \rightarrow 0$ entonces $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| < \varepsilon/2$ si $n \geq n_1$. Por otro lado, al ser $(S_{2n})_n$ y $(S_{2n-1})_n$ convergentes también son de Cauchy, por lo que sabemos que existe $n_2 \in \mathbb{N}$ que satisface que $|S_{2m} - S_{2n}| < \varepsilon/2$ y $|S_{2m-1} - S_{2n-1}| < \varepsilon/2$ para todo $m \geq n \geq n_2$.

Ahora, tomando $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$ y considerando $m > n \geq n_0$, veamos que $|S_m - S_n| < \varepsilon$. Si n, m tienen la misma paridad llegamos directamente. En cambio, si no tienen la misma paridad, notamos fácilmente que

$$|S_m - S_n| = |a_m + (S_{m-1} - S_n)| \leq |a_m| + |S_{m-1} - S_n| < \varepsilon/2 + |S_{m-1} - S_n|,$$

y como $m-1$ y n ahora sí tienen la misma paridad concluimos que

$$\varepsilon/2 + |S_{m-1} - S_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

□

26 EXAMEN CONJUNTOS Y NÚMEROS MAYO 2024

1. Decir cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Cuando una afirmación sea verdadera hay que demostrarla y, cuando sea falsa, hay que dar un contraejemplo.

- (a) Si m y n son dos enteros positivos coprimos, entonces

$$m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}.$$

SOLUCIÓN: Verdadera. Esto ocurre porque, como n y m son coprimos, se tiene

$$m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{mn} \iff [m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \wedge m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{n}],$$

donde las dos expresiones a la derecha son fáciles de verificar aplicando el Teorema de Euler.

- (b) Si \preceq es una relación simétrica y transitiva sobre un conjunto A , entonces utilizando el siguiente argumento

$$a \preceq b \quad \Rightarrow \quad b \preceq a \quad (\text{por la simetría});$$

$$a \preceq b \wedge b \preceq a \quad \Rightarrow \quad a \preceq a \quad (\text{por la transitividad});$$

la relación \preceq es también reflexiva.

SOLUCIÓN: Falsa. Tomando $A \neq \emptyset$ y $\preceq = \emptyset$ se cumple que es simétrica y transitiva, pero claramente no es reflexiva.

- (c) En un conjunto parcialmente ordenado cualquier subconjunto finito está acotado superiormente.

SOLUCIÓN: Falsa, y fácil de ver incorporando el orden de divisibilidad y tomando como subconjunto el propio conjunto de partida.

- (d) El producto cartesiano $\mathbb{Z} \times \{a, b, c\}$ es un conjunto numerable.

SOLUCIÓN: Verdadera. El hecho de que \mathbb{Z} es numerable se da por supuesto (ya apareció como un ejercicio de examen). Con esto dicho, y tomando $A := \mathbb{Z} \times \{a, b, c\}$, consideramos la aplicación $f : \mathbb{Z} \rightarrow A$ tal que

$$f(x) := \begin{cases} (x/3, a) & \text{si } 3 \mid x \\ ((x-1)/3, b) & \text{si } 3 \mid (x-1) \\ ((x-2)/3, c) & \text{si } 3 \mid (x-2) \end{cases}$$

y probamos que es biyectiva.

En cuanto a **inyectividad**, sean $x, x' \in \mathbb{Z}$ enteros arbitrarios tales que $f(x) = f(x')$. Consecuentemente, sabemos que $x \equiv x' \pmod{3}$, pues tienen asociada la misma letra, y, por tanto, nos queda que

$$\frac{x-r}{3} = \frac{x'-r}{3}$$

donde $r \in \{0, 1, 2\}$ es el resto (común para los dos) de dividir x o x' entre 3. Desde aquí ya es directo notar que implica $x = x'$.

Pasamos a por la **sobreyectividad**. Sea $(y, d) \in A$ arbitrario con $y \in \mathbb{Z}$ y $d \in \{a, b, c\}$. Notamos trivialmente que $x = 3y + k$ satisface $f(x) = (y, d)$, donde k es un entero que toma los valores 0, 1 ó 2 en función de si d es a, b ó c , respectivamente.

- (e) Para cualesquiera números primos distintos p y q y cualquier entero $a \in \mathbb{Z}$ que no sea múltiplo de ninguno de ellos, se tiene que $a^{pq+1} \equiv a^p a^q \pmod{pq}$.

SOLUCIÓN: Verdadera. Aplicando la función ϕ de Euler nos queda que $\phi(pq) = \phi(p) \cdot \phi(q) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1$. Además, como $pq + 1 = pq - p - q + 1 + p + q$, observamos

$$a^{pq+1} \equiv a^{(pq-p-q+1)+p+q} \equiv a^{pq-p-q+1} a^p a^q \equiv a^p a^q \pmod{pq},$$

donde la última equivalencia nos la asegura el Teorema de Euler, pues a es coprimo con pq por hipótesis.

3. Sean k y n dos enteros positivos tales que $1 \leq k \leq n$.

- (a) Denotamos por $S(n, k)$ el número de particiones de un conjunto X de n elementos en k subconjuntos. Demostrar que $S(n, 1) = S(n, n) = 1$ y que $S(n, k) = S(n - 1, k - 1) + k \cdot S(n - 1, k)$, cuando $1 < k < n$.

DEMOSTRACIÓN: Demostrar la primera parte es trivial, pues si solo se divide en un subconjunto la única partición posible es que los n elementos estén en ese subconjunto. De manera similar, si se divide en n subconjuntos, la única manera de efectuar la partición es que cada elemento vaya en un subconjunto por separado.

Por otro lado, en cuanto a la segunda parte de la cuestión (con $1 < k < n$), podemos plantearlo de la siguiente manera: tenemos n elementos que queremos separar en k subconjuntos, para ello, aislamos uno de ellos y nos centramos en separar los $n - 1$ restantes. Una vez hemos hecho la separación de los elementos seleccionados, para que podamos llegar a nuestro objetivo de separar el conjunto en k partes hay dos posibilidades: haber repartido los $n - 1$ elementos en $k - 1$ partes, o que estén ya los k subconjuntos formados.

En el primero de los casos, al querer introducir el elemento dejado aparte al principio, solo hay una opción y es hacer un nuevo subconjunto conteniendo únicamente a dicho elemento. Para este caso, al tratarse de $n - 1$ repartidos en $k - 1$ subconjuntos, hay $S(n - 1, k - 1)$ particiones distintas.

En el otro caso, ya están formados los k grupos, por lo que lo que hay que decidir es en cuál de ellos vamos a introducir el nuevo elemento. Por tanto, para cada partición de $n - 1$ elementos en k subconjuntos, de las cuales existen $S(n - 1, k)$, hay k posibilidades para insertar el nuevo elemento en alguno de los grupos, por lo que son $k \cdot S(n - 1, k)$ maneras en total en este caso.

En definitiva, como son casos disjuntos (es decir, no va a haber redundancia a la hora de contar particiones), deducimos que $S(n, k) = S(n - 1, k - 1) + k \cdot S(n - 1, k)$, cuando $1 < k < n$.

27 OTRO EXAMÉN DE CONJUNTOS Y NÚMEROS

1. Decir cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Cuando una afirmación sea verdadera hay que demostrarla y, cuando sea falsa, hay que dar un contraejemplo.

- (a) Existen enteros coprimos m y n tales que $m + n$ y $m \cdot n$ no son coprimos.

SOLUCIÓN: Falsa. Primero de todo, observamos fácilmente que si m y n son coprimos, entonces m^2 y n^2 también (la demostración de dicho resultado se deja como ejercicio). Una vez dicho esto, sea $d := \text{mcd}(m + n, m \cdot n)$, en consecuencia

$$d \mid m + n \wedge d \mid m \cdot n$$

y más aún, aplicando un resultado de los apuntes, tenemos que

$$d \mid m(m + n) - m \cdot n = m^2 \wedge d \mid n(m + n) - m \cdot n = n^2.$$

Resumiendo, nos queda que $d \mid m^2$ y $d \mid n^2$, pero como m^2 y n^2 son coprimos por la primera observación expuesta concluimos que $d = \text{mcd}(m + n, m \cdot n) = 1$.

- (b) $\{-3, 34, 8, 12, -1, -11\}$ es el conjunto completo de representantes de \mathbb{Z}_6 .

SOLUCIÓN: Verdadera, y lo compruebas a mano tú que para algo te las dieron.

- (c) Si $f : A \longrightarrow B$ es sobreyectiva e $Y \subseteq B$ es un subconjunto, entonces $f(f^{-1}(Y)) = Y$.

SOLUCIÓN: Verdadera. La inclusión de izquierda a derecha se da simple y fue vista en clase como una proposición de los apuntes. Para la otra contención (\supseteq) tomamos $b \in Y$ arbitrario. Consecuentemente, al ser f sobreyectiva, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$ y, en concreto, $a \in f^{-1}(Y)$. Por último, como $a \in f^{-1}(Y)$ deducimos que $b = f(a) \in f(f^{-1}(Y))$, con lo que concluimos que $f(f^{-1}(Y)) \supseteq Y$, pues $b \in Y$ era arbitrario.

- (d) El conjunto de los números primos es infinito.

SOLUCIÓN: Verdadera. Supongamos por un momento que fuesen finitos y llamemos $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ al conjunto de todos los primos. Considerando $N \in \mathbb{Z}$ de la siguiente forma

$$N = p_1 p_2 \dots p_n + 1,$$

notamos que $N \notin P$, ya que $N > p_i$ para todo $1 \leq i \leq n$. Por subsiguiente, N ha de ser compuesto por lo que existe p primo tal que $p \mid N$. Además, como $p \in P$ sabemos que $p \mid p_1 p_2 \dots p_n$ y, juntando ambos resultados, llegamos a que

$$p \mid N \wedge p \mid p_1 p_2 \dots p_n \Rightarrow p \mid 1,$$

lo cual contradice el hecho de que p sea primo, contradicción procedente de suponer que existe un número finito de primos, por lo que concluimos que los primos son infinitos.

- (e) Sea $n > 1$ un entero positivo y $a \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\}$. Existe un entero $k > 0$ tal que $a^k \equiv 0 \pmod{n}$ si, y sólo si, o bien $a = 0$ o bien todos los divisores de n dividen a a .

SOLUCIÓN: Verdadera. Estudiamos ambas implicaciones.

(\implies) (Mucho texto honestamente)

2. Se considera en $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ la relación de equivalencia

$$(a, b) \sim (c, d) \iff \text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(c, d).$$

- (a) Dar un conjunto de representantes de las clases de equivalencia con respecto a \sim .

SOLUCIÓN: Tomamos $R := \{(n, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* : n \in \mathbb{N}^*\} \subseteq \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ como candidato y probamos que para cada clase de equivalencia existe exactamente un único elemento de R en ella.

Sea $[(a, b)] \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / \sim$ una clase de equivalencia arbitraria. A continuación, consideramos $d := \text{mcd}(a, b) \in \mathbb{N}^*$ y notamos trivialmente que $(d, d) \in R$ satisface que $(d, d) \in [(a, b)]$.

Por otro lado, sean $(n, n), (m, m) \in R$ tales que $n \neq m$. Veamos que $[(n, n)] \neq [(m, m)]$. Esto ocurre ya que

$$n \neq m \implies \text{mcd}(n, n) = n \neq m = \text{mcd}(m, m),$$

por lo que $(n, n) \not\sim (m, m)$ y, en consecuencia, $[(n, n)] \neq [(m, m)]$.

- (b) En el conjunto cociente $\frac{\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}{\sim}$, se considera la siguiente relación

$$[(a, b)] \preceq [(a', b')] \iff \text{mcd}(a, b) \text{ divide a } \text{mcd}(a', b') \text{ en } \mathbb{N}^*$$

Se pide:

- i) Demostrar que la \preceq está bien definida, y es una relación de orden en $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / \sim$. Probar, además, que la asignación $[(a, b)] \rightsquigarrow \text{mcd}(a, b)$ define un isomorfismo de conjuntos parcialmente ordenados $\left(\frac{\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}{\sim}, \preceq\right) \xrightarrow{\cong} (\mathbb{N}^*, \preceq')$, donde \preceq' es la relación de divisibilidad en \mathbb{N}^* .

DEMOSTRACIÓN: El hecho de que está bien definida se basa en que los elementos de una misma clase de equivalencia comparten máximo común divisor (la prueba formal se deja como reto para el valiente). Aclarado esto, pasamos a verificar que se trata de una relación de orden:

Reflexividad: Directa pues, para toda $[(a, b)] \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / \sim$, se tiene que $\text{mcd}(a, b) \mid \text{mcd}(a, b)$.

Antisimetría: Sean $[(a, b)], [(c, d)] \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / \sim$ tales que $[(a, b)] \preceq [(c, d)]$ y $[(c, d)] \preceq [(a, b)]$. En consecuencia, llamando $d := \text{mcd}(a, b)$, $d' := \text{mcd}(c, d)$, tenemos que $d \mid d'$ y que $d' \mid d$, lo cual implica que $d = d'$ (por el orden de divisibilidad). Con esto último concluimos que $[(a, b)] = [(c, d)]$, pues $(a, b) \sim (c, d)$.

Transitividad: Sean $[(a, b)], [(c, d)], [(e, f)] \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / \sim$ tales que $[(a, b)] \preceq [(c, d)]$ y $[(c, d)] \preceq [(e, f)]$. Consecuentemente, sabemos que $\text{mcd}(a, b) \mid \text{mcd}(c, d) \wedge \text{mcd}(c, d) \mid \text{mcd}(e, f)$ y, por la transitividad de la divisibilidad, inferimos que $\text{mcd}(a, b) \mid \text{mcd}(e, f)$, por lo que $[(a, b)] \preceq [(e, f)]$.

Para la otra parte del subapartado, sea $f : \left(\frac{\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}{\sim}, \preceq\right) \xrightarrow{\cong} (\mathbb{N}^*, \preceq')$ tal que

$$f([(a, b)]) = \text{mcd}(a, b).$$

Supongamos $[(a, b)], [(c, d)] \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / \sim$ con $[(a, b)] \preceq [(c, d)]$. Entonces, por definición, $\text{mcd}(a, b) \mid \text{mcd}(c, d)$, pero esto coincide justo con afirmar que $f([(a, b)]) \preceq' f([(c, d)])$, por lo que concluimos que f es un isomorfismo. \square

- ii) Determinar si existen supremo e ínfimo en $\left(\frac{\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}{\sim}, \preceq\right)$ del subconjunto

$$X = \{[(18, 42)], [(20, 30)], [(45, 75)], [(28, 42)]\}$$

y, en caso de existencia, calcularlos.

SOLUCIÓN: Ejercicio típico (y estrepitosamente aburrido). \square

28 Teorema (de Banach o del punto fijo)

Sean (X, d) un espacio métrico completo y $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$ una contracción. Entonces existe un único punto $x \in X$ que es fijo para f , es decir, tal que $f(x) = x$.

DEMOSTRACIÓN: Primero nos centramos en probar la existencia. Consideramos la sucesión $(x_n)_n \subset X$ tal que $x_{n+1} = f(x_n)$ para $n \geq 0$, siendo $x_0 \in X$ cualquiera. Invocando la definición de contracción llegamos a que

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq c \cdot d(x_n, x_{n-1}),$$

por lo que, aplicando la anterior observación recurrentemente, nos queda

$$d(x_n, x_{n-1}) \leq c^{n-1} \cdot d(x_1, x_0).$$

Con esto podemos acotar el valor de $d(x_n, x_m)$ con $n < m$ de la siguiente manera usando la desigualdad triangular

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{n+1}) + \dots + d(x_{m-1}, x_m) \leq c^n \cdot d(x_1, x_0) + \dots + c^{m-1} \cdot d(x_1, x_0)$$

y, además, utilizando la fórmula de la progresión geométrica

$$c^n \cdot d(x_1, x_0) + \dots + c^{m-1} \cdot d(x_1, x_0) = d(x_1, x_0) \cdot \frac{c^n - c^m}{1 - c} < d(x_1, x_0) \cdot \frac{c^n}{1 - c}$$

donde $(d(x_1, x_0) \cdot c^n / (1 - c))_n \rightarrow 0$ conforme $n \rightarrow \infty$ ya que $0 < c < 1$ y el resto de factores son constantes.

En consecuencia, recopilando resultados, como $d(x_n, x_m) < d(x_1, x_0) \cdot c^n / (1 - c)$ y esta segunda expresión converge a 0, es fácil argumentar (ejercicio) que, por ende, la sucesión $(x_n)_n$ es de Cauchy. Más aún, al tratarse de un espacio X completo, sabemos que $(x_n)_n$ es convergente a algún valor $x \in X$ que satisface $f(x) = x$; es decir, ya hemos encontrado un punto fijo de f .

A continuación, pasamos a verificar la unicidad. Supongamos que no es único y choquémonos contra la pared. Sea $x' \in X$ tal que $x' \neq x$ y, a su vez, $f(x') = x'$. No obstante, llegamos a una contradicción rápidamente, pues

$$\frac{d(f(x), f(x'))}{d(x, x')} = \frac{d(x, x')}{d(x, x')} = 1 > c,$$

lo cual es absurdo ya que choca con la definición de contracción. □

29 Los cirCulos

Se tienen dos semicircunferencias iguales que son tangentes entre sí y de modo que sus diámetros se encuentran en una misma recta. Trazamos a éstas una tangente común, paralela a la recta anterior, e inscribimos una circunferencia tangentes a las semicircunferencias y a la recta tangente. Luego inscribimos una segunda circunferencia tangente con las dos semicircunferencias y con la primera circunferencia, etc. Así sucesivamente vamos obteniendo circunferencias cada vez más pequeñas.

Determinar “alguna relación” entre los radios de éstas circunferencias y el radio de las semicircunferencias originales.

SOLUCIÓN: Considerando R el radio de las semicircunferencias originales y r_i el radio de la i -ésima circunferencia, calculamos manualmente² el radio para los primeros casos: $r_1 = R/4$, $r_2 = R/12$, $r_3 = R/24$, etc. Fijándonos en los denominadores, notamos que $4 = 4 \cdot 1$, $12 = 4 \cdot (1 + 2)$, $24 = 4 \cdot (1 + 2 + 3)$, por lo que podríamos conjeturar que, para la n -ésima circunferencia, su radio será

$$r_n = \frac{R}{4 \cdot (1 + 2 + \dots + n)} = \frac{R}{2n(n+1)}. \quad (2)$$

Para demostrar nuestra conjetura nos serviremos de la inducción completa donde, como no podía ser de otra manera, nuestra hipótesis de inducción será (2).

Tanto en el caso base como en el paso inductivo necesitaremos una observación geométrica clave para realizar el problema, aunque la prueba del caso base se deja como ejercicio, pues es un caso particular del paso inductivo. Para cada circunferencia introducida (la n -ésima), tomamos el triángulo rectángulo de vértices: el centro de una de las semicircunferencias, el punto de tangencia entre estas y el centro de la circunferencia en cuestión. A continuación, en este triángulo, aplicamos el popularmente conocido Teorema de Pitágoras, quedándonos que

$$(R + r_n)^2 = R^2 + (R - 2S_{n-1} - r_n)^2, \quad (3)$$

donde S_n es la suma de los n primeros radios (i.e. $S_n = r_1 + r_2 + \dots + r_n$).

Antes de seguir notamos que, aplicando la hipótesis de inducción para $1 \leq k < n$, tenemos que

$$S_{n-1} = r_1 + \dots + r_{n-1} = \frac{R}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} \right) = \frac{R}{2} \left(1 - \frac{1}{n} \right), \quad (4)$$

por lo que, sustituyendo en (3), nos queda

$$(R + r_n)^2 = R^2 + (R - 2S_{n-1} - r_n)^2 = R^2 + (R/n - r_n)^2,$$

y, despejando r_n

$$\begin{aligned} (R + r_n)^2 &= R^2 + (R/n - r_n)^2 \Rightarrow (R + r_n)^2 - (R/n - r_n)^2 = R^2 \Rightarrow \frac{n+1}{n} R \left(\frac{n-1}{n} R + 2r_n \right) = R^2 \\ \Rightarrow \frac{n-1}{n} R + 2r_n &= \frac{n}{n+1} R \Rightarrow 2r_n = R \left(\frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n} \right) = \frac{R}{n(n+1)} \Rightarrow r_n = \frac{R}{2n(n+1)}. \end{aligned}$$

□

²La observación mencionada durante el paso inductivo será, de igual manera, de especial ayuda para esta tarea.

30 Como se porta el Manolo

Sea (A, \leq) un conjunto parcialmente ordenado y definamos sendas aplicaciones $\varphi, \psi : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ como sigue: para todo $X \in \mathcal{P}(A)$

$$\varphi(X) = C_A^{sup} = \{\text{cotas superiores de } X \text{ en } A\},$$

$$\psi(X) = C_A^{inf} = \{\text{cotas inferiores de } X \text{ en } A\}.$$

- (a) Demostrar que dichas aplicaciones invierten el orden de inclusión en $\mathcal{P}(A)$ y que $X \in Im(\varphi)$ si, y sólo si, $(\varphi \circ \psi)(X) = X$.

SOLUCIÓN: Para la primera parte nos centraremos únicamente en φ , pues el procedimiento para la otra aplicación es análogo. Sean $X, Y \in \mathcal{P}(A)$ tales que $X \subseteq Y$; queremos ver que $\varphi(Y) \subseteq \varphi(X)$. Sea $s \in \varphi(Y)$. En consecuencia, $x \leq s$ para todo $x \in Y$ y, en particular, como $X \subseteq Y$, tenemos que $x \leq s$ para todo $x \in X$, por lo que $s \in \varphi(X)$.

Para la segunda parte, estudiamos cada implicación por separado:

(\implies) Supongamos que $X \in Im(\varphi)$. Consecuentemente, sabemos que existe $X' \in \mathcal{P}(A)$ tal que $\varphi(X') = X$. Además, es fácil notar que $X' \subseteq \psi(X)$ (se deja como ejercicio para el lector interesado), por lo que, aplicando el resultado de la primera parte, nos queda que

$$X' \subseteq \psi(X) \implies (\varphi \circ \psi)(X) = \varphi(\psi(X)) \subseteq \varphi(X') = X.$$

La contención restante, cuya prueba también es trivial, se deja de igual manera como reto para el receptor.

(\impliedby) Recíprocamente, supongamos que $(\varphi \circ \psi)(X) = X$. Esta implicación es directa, pues

$$(\varphi \circ \psi)(X) = X \implies \varphi(\psi(X)) = X \implies X \in Im(\varphi).$$

□

31 Problemas Miscelánea (lit los chupis)

Texto aleatorio porque me da toc que se junten titulos (con el nombre queda todo claro).

31.1 Esta Blero?

Las casillas de un tablero de ajedrez se enumeran ordenadamente desde 0 hasta 63. A cada número se le pone un signo $+$ o $-$, de manera que en cada fila y en cada columna hay 4 signos $+$ y 4 signos $-$. Calcula la suma de todos los números del tablero.

SOLUCIÓN: La primera observación que tenemos que hacer es que, para que la suma exista y no dependa de cada distribución, la solución debe ser 0. Esto es debido a que, entre otros posibles motivos, para la distribución facilitada en el enunciado se puede ver que su suma vale 0.

Una vez asentada esta aclaración, pasamos a algunas intuitivas definiciones. Dada una distribución de tablero T (donde $T_{i,j}$ vale 1 o -1 en función de si en la casilla (i, j) hay un $+$ o un $-$, respectivamente) denotamos mediante $S(T)$ a la suma de los números del tablero para dicho reparto. Matemáticamente se podría expresar de la siguiente forma:

$$S(T) = \sum_{0 \leq i, j < 8} T_{i,j} \cdot (8i + j)$$

Ahora si, empezamos con la demostración propiamente dicha. Sea T una distribución que cumple la condición del enunciado. Nuestro objetivo va a ser aplicarle transformaciones que mantengan la suma hasta llegar un reparto cuya suma valga 0.

(Nota: El resto mola más explicarlo en alto, así que algún afortunado conocerá el final de la demostración.) \square

32 Para relajar tensiones (Problemas para pollos/pollas)

I-2 *Suma de los términos de una progresión aritmética.*

La **progresión aritmética** de diferencia $d \in \mathbb{R}$ y primer término $a_0 \in \mathbb{R}$ es la sucesión de números reales a_0, a_1, a_2, \dots dada por la fórmula de recurrencia $a_{n+1} = a_n + d$ ($\forall n \in \mathbb{N}$).

a) Demuestra que para cada $n \in \mathbb{N}$ se verifica $a_n = a_0 + nd$.

DEMOSTRACIÓN: Se deja como ejercicio (es notablemente más trivial que el siguiente apartado). \square

b) Demuestra que para todo $n \in \mathbb{N}$ se verifica $\sum_{i=0}^n a_i = (n+1) \frac{a_0 + a_n}{2}$.

DEMOSTRACIÓN: Procedemos por inducción sobre n . Para el caso base, $n = 0$, notamos que se satisface la igualdad, pues

$$\sum_{i=0}^n a_i = a_0 = 1 \cdot \frac{2a_0}{2} = (n+1) \frac{a_0 + a_n}{2}.$$

Con este razonamiento ya estaría comprobado el caso base, por lo que continuamos con el paso inductivo.

Supongamos que $\sum_{i=0}^n a_i = (n+1) \frac{a_0 + a_n}{2}$ y demostremos que $\sum_{i=0}^{n+1} a_i = (n+2) \frac{a_0 + a_{n+1}}{2}$, es decir, se cumple para el siguiente. Con este fin, vamos a ir transformando el valor de $\sum_{i=0}^{n+1} a_i$, mediante igualdades, hasta llegar a nuestro objetivo. Esta es la parte en la que te las tienes que ingeniar para obtener lo que buscas (muy poético). Quedaría así (una de las posibles maneras):

$$\sum_{i=0}^{n+1} a_i = \left(\sum_{i=0}^n a_i \right) + a_{n+1} = (n+1) \frac{a_0 + a_n}{2} + a_{n+1}.$$

A partir de aquí solo queda probar que la última expresión es, en efecto, igual a lo que queremos (se deja como ejercicio porque da bastante pereza escribirlo aquí (quizás sea útil usar el primer apartado (no sé))). \square

33 Pero que le pasa

Demostrar que existen infinitos enteros positivos n tales que $4n^2 - 1$ es un múltiplo de 5 y 13 simultáneamente.

DEMOSTRACIÓN: Buscaremos condiciones suficientes sobre n para que dicha expresión sea múltiplo de 5 y 13 por separado. Por un lado, para 5, notamos lo siguiente gracias a la servicial aritmética modular:

$$4n^2 - 1 \equiv 0 \pmod{5} \iff 4n^2 \equiv 1 \pmod{5},$$

además, multiplicando por la inversa modular de 4 tenemos

$$4n^2 \equiv 1 \pmod{5} \iff n^2 \equiv 4 \pmod{5} \iff (n-2)(n+2) \equiv 0 \pmod{5},$$

y por último, como se trata de un dominio de integridad, deducimos que

$$(n-2)(n+2) \equiv 0 \pmod{5} \iff n \equiv 2 \vee n \equiv -2 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Con esta información sacamos que $5 \mid 4n^2 - 1$ si $n = 5k + 2, k \in \mathbb{Z}$ y, haciendo un argumento análogo para 13, obtenemos similarmente que $13 \mid 4n^2 - 1$ si $n = 13t + 6, t \in \mathbb{Z}$.

Por tanto, para asegurarnos que la expresión es múltiplo de 5 y de 13 a la vez, nos basta con ver qué n 's satisfacen las condiciones de arriba conjuntamente. Para ello, reescribimos la ecuación $n = 13t + 6$ en forma de congruencia y sustituimos $n = 5k + 2$ para despejar k . Qedaría así:

$$n = 13t + 6 \iff n \equiv 6 \pmod{13} \iff 5k \equiv 4 \pmod{13} \iff k \equiv 6 \pmod{13},$$

lo cual es equivalente a que $k = 13r + 6$. Con esto dicho se nos queda, en definitiva, que si $n = 5k + 2 = 5(13r + 6) + 2 = 65r + 32$, entonces 5 y 13 dividen a $4n^2 - 1$, donde notamos trivialmente que existen infinitos tales n . \square

34 Estrambótico

Sea $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Entonces f es integrable de Riemann si y sólo si f es integrable “por escalonadas”. En este caso, además, el valor de las integrales coincide.

DEMOSTRACIÓN: Estudiamos la bi-implicación por separado:

(\Rightarrow) Supongamos f integrable de Riemann y llamemos $I := \int_a^b f(x) dx$. En primer lugar, vamos a probar que

$$\int_a^b s(x) dx \leq I \leq \int_a^b t(x) dx,$$

para todas funciones $s, t : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ escalonadas tales que $s(x) \leq f(x) \leq t(x), \forall x \in [a, b]$.

Para ello, sean $s, t : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones arbitrarias que cumplen la condición anterior. En consecuencia, por ser escalonadas, sabemos que s y t inducen dos particiones P_s y P_t , respectivamente, donde

$$P_s = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \text{ con } a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

$$P_t = \{y_0, y_1, \dots, y_m\}, \text{ con } a = y_0 < y_1 < \dots < y_m = b.$$

Por conveniencia, denotaremos mediante c_i ($1 \leq i \leq n$) y d_i ($1 \leq i \leq m$) a las constantes de los subintervalos de s y t , respectivamente.

A continuación, comparando $L(f, P_s)$ y $\int_a^b s(x) dx$ notamos que, obviamente, $m_i \leq c_i$ para todo i válido, pues c_i es cota inferior de $f([x_{i-1}, x_i])$ y m_i es el máximo de dichas cotas inferiores. Consecuentemente, deducimos que

$$c_i \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq m_i \cdot (x_i - x_{i-1}), \text{ para todo } 1 \leq i \leq n$$

y, por tanto, que

$$\int_a^b s(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n m_i \cdot (x_i - x_{i-1}) = L(f, P_s).$$

Con esta información ya sacamos que $\int_a^b s(x) dx \leq I$. La realización de un argumento análogo para la comparación de $U(f, P_t)$ y $\int_a^b t(x) dx$ se deja como ejercicio para el intrépido alumno (es inmediato).

Mediante este razonamiento hemos probado que I cumple la condición mencionada al comienzo de la demostración, por lo que la única tarea restante sería probar que, en efecto, tal I es singular.

Con este objetivo, supongamos la existencia de un I' tal que, al igual que I , cumpla la misma condición. Es trivial notar que para toda partición $P = \{a = x_0 < \dots < x_n = b\}$ de $[a, b]$, las funciones $s(x) = m_i$ y $t(x) = M_i$ si $x \in (x_{i-1}, x_i)$ satisfacen la desigualdad³ $s(x) \leq f(x) \leq t(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Por subsiguiente, $L(f, P) = \int_a^b s(x) dx \leq I'$ para toda P partición y como $\sup\{L(f, P) : P \text{ es partición de } [a, b]\} = I$, no queda de otra que $I \leq I'$. Haciendo un razonamiento similar para el otro sentido de la desigualdad (con $U(f, P)$) llegamos a que $I \geq I'$ y, en conclusión, $I' = I$, por lo que el I es único.

³Hay quien podría señalar que en los extremos de los intervalos las funciones nos están definidas, lo cual es cierto, pero simplemente tomando $\inf(Im(f))$ en dichos puntos quedaría solucionado.

(\Leftarrow) Para este sentido nos valdremos del contrarrecíproco. Supongamos que f no es integrable de Riemann. En consecuencia, dada $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalonada cumpliendo los mismos requisitos que en la parte anterior, basándonos en los resultados alcanzados ahí, sabemos que $\int_a^b s(x) dx \leq L(f, P_s)$ siendo P_s la partición inducida por s . Por ende, es inmediato notar que

$$\int_a^b s(x) dx \leq \sup\{L(f, P) : P \text{ es partición de } [a, b]\} = \int_a^b f(x) dx.$$

Por otro lado, siguiendo un proceso deductivo análogo pero esta vez con $t : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y la integral superior, llegamos a que

$$\int_a^b t(x) dx \geq \inf\{U(f, P) : P \text{ es partición de } [a, b]\} = \overline{\int_a^b f(x) dx}.$$

En conclusión, debido a que $\int_a^b f(x) dx \neq \overline{\int_a^b f(x) dx}$, deducimos que existen una infinidad de $I \in \mathbb{R}$ tales que

$$\int_a^b s(x) dx \leq I \leq \int_a^b t(x) dx,$$

para todas funciones $s, t : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ escalonadas con $s(x) \leq f(x) \leq t(x), \forall x \in [a, b]$, por lo que f no es integrable “por escalonadas”. \square

35 Todo vuelve

Para cada conjunto parcialmente ordenado (Z, \leq) y cada subconjunto $X \subseteq Z$, denotaremos por $\mathcal{C}_Z(X)$ al conjunto de las cotas superiores de X en Z . Sean (A, \leq) y (B, \leq') conjuntos parcialmente ordenados y definimos en $A \times B$ la relación de orden dada por:

$$(a, b) \preceq (a', b') \text{ si, y sólo si, } a < a' \text{ o bien } a = a' \text{ y } b \leq' b'.$$

Sea $S \subseteq A \times B$ y consideramos $S_1 = \{a \in A : (a, b) \in S, \text{ para algún } b \in B\}$. Se pide:

- (a) Demostrar que si S_1 no tiene máximo, entonces $\mathcal{C}_{A \times B}(S) = \mathcal{C}_A(S_1) \times B$, mientras que si S_1 tiene máximo $m = \max(S_1)$, entonces $\mathcal{C}_{A \times B}(S) = (A_{>m} \times B) \cup (\{m\} \times \mathcal{C}_B(B'))$, donde $A_{>m} = \{a \in A : a > m\}$ y $B' = \{b \in B : (m, b) \in S\}$.

DEMOSTRACIÓN: Vamos por partes. En primer lugar, supongamos que S_1 **no** tiene máximo y veamos, por doble inclusión, que $\mathcal{C}_{A \times B}(S) = \mathcal{C}_A(S_1) \times B$:

- (\subseteq) Sea $(a, b) \in \mathcal{C}_{A \times B}(S)$ cualquiera y tomamos $a' \in S_1$ arbitrario. Dado que $a' \in S_1$, obtenemos por definición que existe $b' \in B$ para el cual $(a', b') \in S$. Consecuentemente, debido a que $(a, b) \in \mathcal{C}_{A \times B}(S)$, deducimos de manera inmediata que $a \leq a'$. A su vez, por ser $a' \in S_1$ arbitrario, llegamos a que $a \in \mathcal{C}_A(S_1)$ y, añadiendo el hecho trivial de que $b \in B$, concluimos que $(a, b) \in \mathcal{C}_A(S_1) \times B$.
- (\supseteq) Recíprocamente, sea $(a, b) \in \mathcal{C}_A(S_1) \times B$ arbitrario. Puesto que S_1 no tiene máximo, sabemos que $a \notin S_1$, por lo que, dado $(a', b') \in S$, deducimos que $a' < a$ (precedencia estricta) con lo que ya podemos afirmar que $(a', b') \preceq (a, b)$. Al estar trabajando con $(a', b') \in S$ cualquiera, finalizamos con que $(a, b) \in \mathcal{C}_{A \times B}(S)$.

Para la segunda parte, supongamos que S_1 **si** tiene máximo y denotemos $m = \max(S_1)$. Volvamos a proceder por doble inclusión para probar lo que se nos solicita:

(\subseteq)

36 Olimpiada Matemática Española, Fase Local - 2025

1. Sea $ABCD$ un paralelogramo y sea M un punto en la diagonal BD que cumple $MD = 2BM$ (el segmento MD es el doble de largo que BM). Las rectas AM y BC se cortan en un punto N . ¿Cuál es el cociente entre el área del triángulo MND y el área del paralelogramo $ABCD$?

SOLUCIÓN: Coming soon.

2. Sea $q(x)$ un polinomio de grado 2023 que cumple $p(n) = \frac{1}{n}$ para todo $n = 1, 2, \dots, 2024$. Halla el valor de $p(2025)$.

SOLUCIÓN: Bajo las condiciones del problema se tiene que $p(2025) = 0$. Veamos a qué se debe este hecho. Por ser p de grado 2023, el polinomio tendrá la siguiente forma:

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{2023}x^{2023},$$

donde $a_i \in \mathbb{R}$ son valores constantes que no conocemos a priori. Además, gracias a la información que se nos proporciona en el enunciado, sabemos que

$$p(n) = a_0 + a_1n + \dots + a_{2023}n^{2023} = \frac{1}{n}, \text{ para todo } n = 1, 2, \dots, 2024.$$

Nuestro propósito ahora va a ser escribir la expresión $p(2025) = a_0 + 2025a_1 + \dots + 2025^{2023}a_{2023}$ como combinación lineal de las expresiones para cada $p(n)$, con $n = 1, 2, \dots, 2024$. Más formalmente, queremos encontrar reales $\alpha_n \in \mathbb{R}$ ($1 \leq n \leq 2024$) tales que se satisface la siguiente igualdad:

$$p(2025) = \sum_{n=1}^{2024} \alpha_n p(n) = \alpha_1 p(1) + \alpha_2 p(2) + \dots + \alpha_{2024} p(2024).$$

Haciendo estudios para casos donde el grado del polinomio es menor, se puede llegar a la conjetura⁴ de que (al menos) una posibilidad para la elección de tales α_n son

$$\alpha_n := (-1)^n \binom{2024}{n-1}, \text{ para cada } 1 \leq n \leq 2024.$$

Una vez aceptado este hecho como tautología, obtener el resultado asegurado se vuelve una tarea bastante superflua y de poco interés cognitivo. Por ende, se deja como reto personal para el intrépido lector. \square

(i)

⁴Quién ponga este hecho en duda adelante, que lo intente probar y me contacte por LinkedIn. Por mi parte, prefiero creer.