

Chapitre XIII : Fractions rationnelles

Retranscrit par Samy Youssefine

26 février 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



 **Note importante**

Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Corps de fractions d'un anneau intègre	3
2	Corps des fractions de l'anneau $\mathbb{K}[X]$	7
2.1	Degré d'une fraction rationnelle	7
2.2	Fraction dérivée	9
2.3	Zéros et pôles d'une fraction rationnelle	11
3	Décomposition en éléments simples (DES) d'une fraction rationnelle	13
3.1	Généralités	13
3.2	Décomposition en éléments simples (cas général)	15

Ce chapitre est consacré aux fractions rationnelles. Nous allons introduire les fractions rationnelles, en construisant un corps de fractions à partir d'un anneau commutatif intègre. Nous allons ensuite étudier les propriétés de ces fractions rationnelles, notamment leur simplification et leurs applications.

1 Corps de fractions d'un anneau intègre

Soit A un anneau intègre commutatif. On souhaite construire le plus petit corps $\mathbb{K}$ contenant l'anneau A , qu'on appellera corps de fractions de A .

Exemple 1.1.0.1

Par exemple, si $A = \mathbb{Z}$, alors le corps de fractions de A est $\mathbb{Q}$, le corps des nombres rationnels.

$$Q = \left\{ \frac{N}{D} \mid N \in \mathbb{Z}, D \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

L'écriture $\frac{N}{D}$ n'est pas unique. En effet...

$$\frac{N}{D} = \frac{N'}{D'} \iff ND' = N'D$$

Nous allons donc construire une classe d'équivalence pour résoudre ce problème d'unicité d'écriture.

Propriété 1.1.0.1

Soit A un anneau intègre commutatif. On définit une relation d'équivalence sur $A \times A^*$ par :

$$(N, D) \sim (N', D') \iff ND' = N'D$$

Cette relation est bien une relation d'équivalence.

Attention

A^* désigne ici $A \setminus \{0_A\}$ et non pas $\mathbb{U}_A$ (l'ensemble des éléments inversibles de A).

Preuve

- ▶ Réflexivité : $ND = ND$ pour tout $(N, D) \in A \times A^*$.
- ▶ Symétrie : Si $ND' = N'D$, alors $N'D = ND'$, donc $(N', D') \sim (N, D)$ (la relation $\sim$ est symétrique).

► Transitivité :

- ▷ Si $(N, D) \sim (N', D')$ et $(N', D') \sim (N'', D'')$, alors $ND' = N'D$ et $N'D'' = N''D'$.
- ▷ En multipliant la première égalité par D'' et la seconde par D , on obtient $ND'D'' = N'DD''$ et $N'DD'' = N''DD'$.
- ▷ En combinant ces égalités, on trouve $ND'D'' = N''DD'$, ce qui implique que $ND'' = N''D$ (car A est intègre).
- ▷ Ainsi, $(N, D) \sim (N'', D'')$.

■

 Définition 1.1.0.1

Dans la suite, on pose :

$$\mathbb{K} = \{\mathcal{C}\ell(N, D) \text{ tel que } (N, D) \in A \times A^*\}$$

 Propriété 1.1.0.2

$$\begin{cases} \mathcal{C}\ell(N, D) = \mathcal{C}\ell(N', D') \\ \mathcal{C}\ell(A, B) = \mathcal{C}\ell(A', B') \end{cases} \implies \begin{cases} \mathcal{C}\ell(NB + AD, BD) = \mathcal{C}\ell(N'B' + A'D', B'D') \\ \mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D') \end{cases}$$

 Preuve

- Montrons que $\mathcal{C}\ell(NB + AD, BD) = \mathcal{C}\ell(N'B' + A'D', B'D')$.
 - ▷ En utilisant les égalités $\mathcal{C}\ell(N, D) = \mathcal{C}\ell(N', D')$ et $\mathcal{C}\ell(A, B) = \mathcal{C}\ell(A', B')$, on a $ND' = N'D$ et $AB' = A'B$.
 - ▷ En multipliant la première égalité par B et la seconde par D , on obtient $NDB = N'DB$ et $ABD = A'BD$.
 - ▷ En combinant ces égalités, on trouve $NB + AD = N'B' + A'D'$ et $BD = B'D'$.
- Montrons que $\mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D')$.
- En utilisant les mêmes égalités, on a $AN = A'N'$ et $BD = B'D'$, ce qui implique que $\mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D')$.

■

 Définition 1.1.0.2

On munit $\mathbb{K}$ des opérations suivantes :

- Addition $+$: $\mathcal{C}\ell(N, D) + \mathcal{C}\ell(N', D') = \mathcal{C}\ell(NB + AD, BD)$.

► Multiplication $\times : \mathcal{C}\ell(N, D) \cdot \mathcal{C}\ell(N', D') = \mathcal{C}\ell(NN', DD')$.

✓ Propriété 1.1.0.3

Avec les opérations $+$ et $\times$ définies ci-dessus, $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.

Dans la suite de ce cours, on notera $\frac{N}{D} = \mathcal{C}\ell(N, D)$

$$\mathbb{K} = \left\{ \frac{N}{D} \text{ tel que } (N, D) \in A \times A^* \right\}$$

💬 Remarque 1.1.0.1

- La définition des lois $+$ et $\times$ dans $\mathbb{K}$ provient des mêmes lois définies sur $\mathbb{Q}$ (le corps de fractions de $\mathbb{Z}$).
- Dans $\mathbb{K}$, on a $0_{\mathbb{K}} = \mathcal{C}\ell(0_A, 1_A) = \frac{0_A}{1_A}$ et $1_{\mathbb{K}} = \mathcal{C}\ell(1_A, 1_A) = \frac{1_A}{1_A}$.

🔍 Preuve

- On remarque que $\frac{N}{D} = \frac{ND'}{DD'}$ et $\frac{N'}{D'} = \frac{N'D}{DD'}$.
- On peut donc supposer que les “fractions” sont écrites avec un dénominateur commun.
- Les lois $+$ et $\times$ sont déjà définies d’après la remarque précédente.
- Il ne reste plus qu’à vérifier que $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.
 - ▷ L’addition est associative et commutative, avec $0_{\mathbb{K}}$ comme élément neutre. On utilise les propriétés de l’addition dans A (car A est un anneau commutatif) pour vérifier ces propriétés dans $\mathbb{K}$.
 - ▷ La multiplication est associative et commutative, avec $1_{\mathbb{K}}$ comme élément neutre. On utilise les propriétés de la multiplication dans A pour vérifier ces propriétés dans $\mathbb{K}$.
 - ▷ La multiplication est distributive par rapport à l’addition. On utilise les propriétés de l’addition et de la multiplication dans A pour vérifier cette propriété dans $\mathbb{K}$.
 - ▷ Tout élément nul de $\mathbb{K}$ est de la forme $\frac{0_A}{D}$, ce qui correspond à $0_{\mathbb{K}}$. Tout élément non nul de $\mathbb{K}$ est de la forme $\frac{N}{D}$ avec $N \neq 0_A$, et son inverse est $\frac{D}{N}$, qui est bien défini car A est intègre (et on démontre facilement que $\frac{D}{N} \cdot \frac{N}{D} = 1_{\mathbb{K}}$).

On conclut que $\mathbb{K}$ est un corps commutatif. ■

✓ **Propriété 1.1.0.4** (*Injection canonique de A dans $\mathbb{K}$*)

$$f : \begin{matrix} A \rightarrow \mathbb{K} \\ N \mapsto \frac{N}{1_A} \end{matrix}$$

f est un morphisme d'anneaux injectif.

Q **Preuve**

On peut procéder par deux méthodes, soit en montrant que le noyau $\ker(f) = \{0_A\}$ (par équivalences successives sans avoir à passer par une double inclusion), soit en montrant que f est injective directement (en étudiant l'égalité $f(N) = f(N')$ avec $N, N' \in A$). ■

💬 **Remarque 1.1.0.2**

Par conséquent, on peut identifier A à son image $f(A)$ dans $\mathbb{K}$. Et $f : A \rightarrow f(A)$ est un isomorphisme d'anneaux. A est donc isomorphe à $f(A)$, qui est un sous-anneau de $\mathbb{K}$. Ainsi, on peut considérer A comme un sous-anneau de $\mathbb{K}$, et on dit que $\mathbb{K}$ est un corps de fractions de A .

★ **Théorème 1.1.0.1**

$\mathbb{K}$ est le plus petit corps contenant A .
 $\mathbb{K}$ est appelé **le corps de fractions** de A .

Q **Preuve**

Soit L un corps contenant A . On souhaite montrer que $\mathbb{K} \subseteq L$.

- ▶ Soit $\frac{N}{D} \in \mathbb{K}$ avec $N \in A$ et $D \in A^*$. Comme L est un corps contenant A , on a $N \in L$ et $D \in L^*$ (car D est non nul dans A , il est aussi non nul dans L).
- ▶ Par conséquent, $\frac{N}{D} = N \cdot D^{-1} \in L$.
- ▶ Ainsi, tout élément de $\mathbb{K}$ est aussi un élément de L , ce qui implique que $\mathbb{K} \subseteq L$. ■

2 Corps des fractions de l'anneau $\mathbb{K}[X]$

Définition 2.2.0.3

Soit A un anneau intègre commutatif. On peut construire le corps de fractions de l'anneau $A[X]$, qui est noté $\mathbb{K}(X)$ et appelé **corps des fractions de l'anneau $A[X]$** .

$$\mathbb{K}(X) = \left\{ \frac{P}{Q} \text{ tel que } P, Q \in A[X], Q \neq 0 \right\}$$

$(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un corps commutatif, avec les lois d'addition et de multiplication définies de manière similaire à celles de $\mathbb{K}$ (en utilisant les opérations sur les polynômes).

2.1 Degré d'une fraction rationnelle

Propriété 2.2.1.5

Soient $(N, D), (N_1, D_1) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]^*$.

Si $\frac{N}{D} = \frac{N_1}{D_1}$, alors : $N \cdot D_1 = N_1 \cdot D$.

On a donc une égalité de deux polynômes, et on peut comparer leurs degrés. En particulier, on a $\deg(N) + \deg(D_1) = \deg(N_1) + \deg(D)$, ce qui implique que :

$$\deg(N) - \deg(D) = \deg(N_1) - \deg(D_1)$$

Cela veut dire que $\deg(N) - \deg(D)$ est une quantité qui ne dépend pas du représentant choisi pour cette fraction rationnelle.

Définition 2.2.1.4 (Degré d'une fraction rationnelle)

On définit le **degré d'une fraction rationnelle** $\frac{N}{D}$ par :

$$\deg\left(\frac{N}{D}\right) = \deg(N) - \deg(D)$$

On le note $\deg\left(\frac{N}{D}\right)$ ou $d^\circ\left(\frac{N}{D}\right)$.

● **Remarque 2.2.1.3 (Valeur du degré d'une fraction rationnelle)**

Pour toute fraction $F \in \mathbb{K}(X)$, on a $\deg(F) \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$.

avec $\deg(F) = \deg\left(\frac{N}{D}\right) = -\infty$ si et seulement si $F = 0_{\mathbb{K}}(X)$, donc si et seulement si $N = 0_{\mathbb{K}}[X]$ (en posant $F = \frac{N}{D}$ avec $N, D \in \mathbb{K}[X]$ et $D \neq 0_{\mathbb{K}}[X]$).

En effet, $\deg(F) = \underbrace{\deg(N)}_{\in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}} - \underbrace{\deg(D)}_{\in \mathbb{N}} \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$.

● **Remarque 2.2.1.4 (Degré d'un polynôme vu comme une fraction rationnelle)**

Si $P \in \mathbb{K}[X]^*$, alors $\deg(P) \in \mathbb{N}$.

La réciproque est fautive : On ne peut pas écrire ($F \in \mathbb{K}(X)$ et $\deg(F) \in \mathbb{N}$) $\implies F \in \mathbb{K}[X]$. On peut donner comme contre-exemple la fraction rationnelle $F = \frac{X^2}{X+1} \in \mathbb{K}(X)$, qui est une fraction rationnelle de degré 1 (car $\deg(X^2) - \deg(X+1) = 2 - 1 = 1$), mais qui n'est pas un polynôme (car il n'est pas de la forme $\frac{P}{1}$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$).

● **Remarque 2.2.1.5 (Division de polynômes et appartenance à $\mathbb{K}[X]$)**

Pour $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$, on a :

$$F \in \mathbb{K}[X] \iff B \mid A$$

✓ **Propriété 2.2.1.6**

Soient $F, G \in \mathbb{K}(X)$. Alors :

$$\deg(F \cdot G) = \deg(F) + \deg(G)$$

$$\deg(F + G) \leq \max(\deg(F), \deg(G)) \text{ avec égalité si } \deg(F) \neq \deg(G)$$

🔍 **Preuve**

1. La première égalité est vérifiée trivialement, en effet :

$$\begin{aligned}
\deg(F \cdot G) &= \deg\left(\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}\right) \\
&= \deg\left(\frac{AC}{BD}\right) \\
&= \deg(AC) - \deg(BD) \\
&= (\deg(A) + \deg(C)) - (\deg(B) + \deg(D)) \\
&= (\deg(A) - \deg(B)) + (\deg(C) - \deg(D)) \\
&= \deg(F) + \deg(G)
\end{aligned}$$

2. Pour démontrer la seconde inégalité, on pose $F = \frac{A}{D}$ et $G = \frac{B}{D}$ (on suppose que les fractions sont écrites avec un dénominateur commun, ce qui est toujours possible). Alors : $F + G = \frac{A+B}{D}$, et $\deg(F + G) = \deg(A + B) - \deg(D)$.

Or, $\deg(A + B) \leq \max(\deg(A), \deg(B))$ (propriété issue des polynômes!), ce qui implique que $\deg(F + G) \leq \max(\deg(A), \deg(B)) - \deg(D) = \max(\underbrace{\deg(A) - \deg(D)}_{\text{degré de fraction}}, \underbrace{\deg(B) - \deg(D)}_{\text{degré de fraction}}) = \max(\deg(F), \deg(G))$.

Ensuite, on démontre facilement l'égalité dans le cas où $\deg(F) \neq \deg(G)$. ■

2.2 Fraction dérivée

✓ Propriété 2.2.2.7

Soit $F = \frac{N}{D}$.

La fraction $\frac{N'D - ND'}{D^2}$ ne dépend pas du représentant choisi pour F .

📖 Définition 2.2.2.5 (Fraction dérivée)

On définit la **fraction dérivée** de F par :

$$F' = \frac{N'D - ND'}{D^2}$$

Par convention, $F^{(0)} = F$.

On peut aussi définir, par récurrence, les dérivées successives de F par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, F^{(k+1)} = (F^{(k)})'$$

Q Preuve

Soit $F = \frac{N}{D} = \frac{A}{B} \iff NB = AD$.

Nous voulons montrer que $\frac{N'D - ND'}{D^2} = \frac{A'B - AB'}{B^2} \iff D^2(A'B - AB') = B^2(N'D - ND')$.

► Dans le sens direct $\implies$:

▷ On a $N'B + N B' = A'D + A D'$ (en dérivant l'égalité $NB = AD$).

▷ Et on a aussi $D^2(A'B - AB') = A'D \cdot DB - AD^2 B$ et $B^2(N'D - ND') = N'B \cdot BD - NB^2 D$.

▷ En combinant ces égalités, on trouve que $D^2(A'B - AB') = B^2(N'D - ND')$.

► Dans le sens inverse $\impliedby$, la démonstration est plus simple, on peut directement utiliser les égalités $D^2(A'B - AB') = B^2(N'D - ND')$ et $NB = AD$ pour trouver que $N'B + NB' = A'D + AD'$.

■

Remarque 2.2.2.6 (Degré de la fraction dérivée)

Soit $F = \frac{A}{B}$ avec $\deg(A), \deg(B) \geq 1$.

$$\deg(F') \leq \deg(F) - 1$$

En effet, on a :

$$\begin{aligned} \deg(F') &= \deg\left(\frac{A'B - AB'}{B^2}\right) \\ &= \deg(A'B - AB') - \deg(B^2) \\ &\leq \max(\deg(A'B), \deg(AB')) - 2\deg(B) \\ &\leq \max(\deg(A') + \deg(B), \deg(A) + \deg(B')) - 2\deg(B) \\ &\leq \max((\deg(A) - 1) + \deg(B), \deg(A) + (\deg(B) - 1)) - 2\deg(B) \\ &\leq \max(\deg(A) + \deg(B) - 1, \deg(A) + \deg(B) - 1) - 2\deg(B) \\ &\leq \deg(A) + \deg(B) - 1 - 2\deg(B) \\ &\leq \deg(A) - \deg(B) - 1 \\ &\leq \deg(F) - 1 \end{aligned}$$

Exemple 2.2.2.2

$$F = \frac{X}{X+1} \implies \deg F = 0.$$

$$\text{et } F' = \frac{1}{(X+1)^2} \implies \deg F' = -2$$

✓ Propriété 2.2.2.8

Soient $F_1, F_2 \in \mathbb{K}(X)$. Alors :

$$1. \forall \lambda \in \mathbb{K}, (F_1 + \lambda F_2)' = F_1' + \lambda F_2'$$

$$2. (F_1 \cdot F_2)' = F_1' \cdot F_2 + F_1 \cdot F_2'$$

Q Preuve

1. Pour démontrer la première propriété, on peut utiliser le fait que $\mathbb{K}(X)$ est un corps (et techniquement, un sous-espace vectoriel), et considérer $\lambda \in \mathbb{K}$ comme un polynôme de degré 0.
2. La démonstration est triviale, on procède par calcul direct. ■

2.3 Zéros et pôles d'une fraction rationnelle

📖 Définition 2.2.3.6 (Zéros et pôles d'une fraction rationnelle)

Soit $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$, avec $A \wedge B = 1$ (c'est à dire que A et B sont premiers entre eux).

- On dit que α est **zéro** (ou racine) de F de multiplicité s lorsque α est une racine de A (le *numérateur*) de multiplicité s .
- On dit que β est **pôle** de F de multiplicité t lorsque β est une racine de B (le *dénominateur*) de multiplicité t .

⚠ Attention

Attention, les zéros et les pôles d'une fraction rationnelle sont définis si le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. En effet, si A et B ont un facteur commun, alors on peut simplifier la fraction rationnelle, ce qui peut faire disparaître certains zéros ou pôles. Par exemple, si $F = \frac{(X-1)(X-2)}{X^2-1} = \frac{(X-1)(X-2)}{(X-1)(X+1)}$, alors F peut être simplifié en $\frac{X-2}{X+1}$, ce qui fait “disparaître” le zéro/pôle 1.

✎ Exemple 2.2.3.3

Soit $F = \frac{X^2-3X+2}{(X^3-1)((X+1)^2)}$.

On peut simplifier F en $\frac{X-2}{(X^2+X+1)(X+1)^2}$.

- 2 est dit **zéro simple** de F (car 2 est une racine simple du numérateur),
- -1 est dit **pôle double** de F (car -1 est une racine double du dénominateur),
- les racines complexes de $X^2 + X + 1$ sont des **pôles simples** de F (car les racines de $X^2 + X + 1$ sont des racines simples du dénominateur).

☰ Définition 2.2.3.7 (Fonction rationnelle)

Soit $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$, avec $A \wedge B = 1$.

On définit la **fonction rationnelle** associée à F par :

$$\tilde{F} : \begin{array}{c} \mathbb{K} \setminus \{\text{ensemble des pôles de } F\} \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto \tilde{F}(x) = \frac{A(x)}{B(x)} \end{array}$$

On peut noter l'ensemble des pôles de F par $\mathcal{D}$. Alors, $\tilde{F}$ est une fonction définie sur $\mathbb{K} \setminus \mathcal{D}$.

3 Décomposition en éléments simples (DES) d'une fraction rationnelle

3.1 Généralités

★ Théorème 3.3.1.2 (Forme irréductible d'une fraction rationnelle)

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Alors, il existe un unique couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $A \wedge B = 1$, B est unitaire et $F = \frac{A}{B}$.

Q Preuve

Soit $F = \frac{N}{D} \in \mathbb{K}(X)$.

- **Existence** : On peut trouver un couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $A \wedge B = 1$, B est unitaire et $\frac{A}{B} = \frac{N}{D}$.
 - ▷ Montrons que F peut s'écrire sous la forme $\frac{A}{B}$ avec $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et B unitaire.
 - On sait que D admet un coefficient dominant non nul, disons d , car $D \neq 0_{\mathbb{K}}[X]$.
 - On pose $N_1 = d^{-1} \cdot N$ et $D_1 = d^{-1} \cdot D$. Alors, N_1 et D_1 sont des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec D_1 unitaire
 - ▷ On a alors : $\frac{N_1}{D_1} = \frac{N}{D}$.
 - On peut se permettre d'écrire $F = \frac{N_1}{D_1}$ car ils agissent comme d'autres représentants de cette classe d'équivalence.
- Montrons qu'on peut écrire F sous la forme $\frac{A}{B}$ avec $A, B \in \mathbb{K}[X]$, $A \wedge B = 1$, B unitaire et $\text{CD}(B) = 1$.
 - ▷ Soit $C = N_1 \wedge D_1$.
 - ▷ Alors il existe un couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $N_1 = CA$ et $D_1 = CB$.
 - ▷ Donc $F = \frac{A}{B}$ avec $A \wedge B = 1$ et $\text{CD}(B) = 1$, sachant que D_1 et C sont unitaires.
- **Unicité** : Supposons que F puisse s'écrire sous la forme $\frac{A}{B}$ et $\frac{A'}{B'}$ avec $A, B, A', B' \in \mathbb{K}[X]$, $A \wedge B = 1$, $A' \wedge B' = 1$, B unitaire et B' unitaire. Alors, on a :

- ▷ $A'B = AB'$ (en utilisant l'égalité $\frac{A}{B} = \frac{A'}{B'}$).
- ▷ Comme $B \mid A'B$, alors en utilisant le théorème de Gauss, on trouve que $B \mid B'$. De même,

■

📖 Définition 3.3.1.8 (Élément simple)

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$.

On dit que F est un **élément simple** lorsque F est un monôme, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous la forme $F = \alpha \cdot X^k$ avec $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}$.
ou bien lorsque :

- ▶ il existe...
 - ▷ $A \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.
 - ▷ $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible.
 - ▷ $n \in \mathbb{N}^*$
- ▶ tels que $F = \frac{A}{P^n}$, avec $\deg(A) < \deg(P)$ (!).

pls
help
me
finish
this

💬 Remarque 3.3.1.7

- ▶ Les éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ sont :
 - ▷ les monômes de la forme αX^k avec $\alpha \in \mathbb{C}$ et $k \in \mathbb{N}$,
 - ▷ ainsi que les fractions de la forme $\frac{\lambda}{(X-\alpha)^n}$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $\alpha \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, qu'on appelle des éléments simples de 1^{ère} espèce.
- ▶ Les éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ sont :
 - ▷ les monômes de la forme αX^k avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}$,
 - ▷ les éléments simples de 1^{ère} espèce de la forme $\frac{\lambda}{(X-\alpha)^n}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,
 - ▷ les éléments simples de 2^{ème} espèce de la forme $\frac{\lambda X + \mu}{(X^2 + aX + b)^n}$ avec $\lambda, \mu, a, b \in \mathbb{R}$, $(a, b) \neq (0, 0)$ et $b^2 - 4a < 0$, $n \in \mathbb{N}^*$.

✅ Propriété 3.3.1.9 (Partie entière et partie fractionnaire)

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Alors, il existe un unique couple $(E, G) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X)$ tel que :

$$\begin{cases} F = E + G \\ \deg(G) < 0 \end{cases}$$

E est appelé la partie entière de F , et G est appelé la partie fractionnaire de F .

Q Preuve

Remarque 3.3.1.8

Si $F \in \mathbb{K}(X)$ avec $\deg(F) < 0$, alors F est égal à sa partie fractionnaire $F = G$, et sa partie entière est nulle $E = 0$ (par unicité de ces deux parties...).

3.2 Décomposition en éléments simples (cas général)

On va préparer une généralisation du théorème de décomposition en éléments simples (DES) pour les fractions rationnelles à coefficients dans un corps quelconque $\mathbb{K}$ en se basant sur trois propriétés :

✓ Propriété 3.3.2.10

Soient A et $B_1, \dots, B_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que B_i et B_j sont deux à deux premiers entre eux.

On pose $F = \frac{A}{B_1 \cdots B_n}$ avec $\deg(F) < 0$.

Alors...

$$\exists!(A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{K}[X]^n \text{ tels que } F = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{B_i} \text{ et } \underbrace{\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \deg(A_i) < \deg(B_i)}_{\text{condition importante}}$$

Q Preuve

La démonstration de cette propriété se fait par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. Le cas de base $n = 1$ est trivial, mais le cas $n = 2$ est plus utile est plus intéressant à démontrer. Il faut y employer le théorème de Bézout et décomposer le numérateur A en $A \cdot 1$ puis en $A \cdot (B_1 u + B_2 v)$, ce qui permet de trouver les éléments A_1 et A_2 de la décomposition. ■

à
faire
25/02