

Chapitre XIV-D : Déterminants

Retranscrit par Samy Youssoufine

27 mai 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Groupes symétriques	3
1.1	Permutations	3
1.2	Permutations particulières	6
1.2.1	Transposition	6
1.2.2	Cycle	9
1.3	Signature	11
1.4	Inversion	13
2	Applications multilinéaires	18
3	Déterminant d'un système de vecteurs	33
4	Déterminant d'un endomorphisme	40
5	Déterminant d'une matrice	48
5.1	Notions de base	48
5.2	Mineur, cofacteur et comatrice	53

Les déterminants sont des outils algébriques qui permettent de caractériser certaines propriétés des matrices, telles que l'inversibilité, le rang, ou encore les valeurs propres.

1 Groupes symétriques

1.1 Permutations

Définition 1 (Permutation et ensemble de permutations)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **permutation** de $\{1, 2, \dots, n\}$ est une bijection de cet ensemble dans lui-même.

On écrit :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour représenter la permutation σ .

On note S_n l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Exemple 1 (Permutation)

Par exemple, la permutation σ suivante :

$$\begin{array}{c|ccccc} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \sigma(i) & 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{array}$$

σ est bel et bien une bijection de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même.

Exemple 2 (Ensemble de permutations)

S_2 contient les permutations suivantes :

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

S_3 contient les permutations suivantes :

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Définition 2 (Composée de permutations)

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . La **composée** de σ_1 et σ_2 , notée $\sigma_1 \circ \sigma_2$, est définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Exemple 3 (Composée de deux permutations)

Soient σ_1 et σ_2 les permutations définies par :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

La composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est définie par :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

i	1	2	3	4	5
$\sigma_2(i)$	4	3	5	1	2
$\sigma_1(\sigma_2(i))$	$\sigma_1(4)$ 1	$\sigma_1(3)$ 3	$\sigma_1(5)$ 4	$\sigma_1(1)$ 5	$\sigma_1(2)$ 2

Ainsi, la composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est donnée par :

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Notons aussi que la composée $\sigma_2 \circ \sigma_1$ est donnée par :

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux composées sont différentes, ce qui montre que la composition de permutations n'est pas commutative.

Définition 3 (Inverse d'une permutation)

Soit σ une permutation de S_n . L'**inverse** de σ , notée σ^{-1} , est la permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma^{-1}(\sigma(i)) = i$$

 Exemple 4 (Inverse d'une permutation)

Réutilisons la permutation σ_1 définie par :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

L'inverse de σ_1 , noté σ_1^{-1} , est défini par :

$$\sigma_1^{-1}(\sigma_1(i)) = i$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

$$\sigma_1^{-1}(i) \left| \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{array} \right.$$

Ainsi, l'inverse de σ_1 est donné par :

$$\sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

 Propriété 1

Il y a $n!$ permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Le cardinal de S_n est donc $n!$.

$$\text{card}(S_n) = n!$$

 Preuve

Chaque élément de $\{1, 2, \dots, n\}$ doit être envoyé vers un élément distinct de l'ensemble d'arrivée. Pour le premier élément, il y a n choix possibles, pour le deuxième élément, il y a $n - 1$ choix possibles (car on ne peut pas réutiliser l'élément déjà choisi pour le premier), pour le troisième élément, il y a $n - 2$ choix possibles, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément qui n'a plus qu'un seul choix possible. ■

 Propriété 2

1. Associativité : Pour toutes permutations σ_1 , σ_2 et σ_3 de S_n , on a :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3 = \sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3)$$

On hérite ces propriétés de l'associativité de la composition de fonctions.

2. Existence d'un élément neutre : Il existe une permutation id dans S_n telle que pour toute permutation σ de S_n , on a :

$$\text{id} \circ \sigma = \sigma \circ \text{id} = \sigma$$

L'élément neutre est la permutation identité, notée id , définie par :

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

3. Existence d'inverses : Pour toute permutation σ de S_n , il existe une permutation σ^{-1} de S_n telle que :

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$$

→ Conséquence 1

Ces trois propriétés font de S_n un groupe (non-commutatif si $n \geq 3$), appelé le **groupe symétrique** d'ordre n .

On rappelle qu'un groupe est un ensemble muni d'une opération de composition qui satisfait les propriétés d'associativité, d'existence d'un élément neutre et d'existence d'inverses (CH-10).

Comme $(S_n, \circ)$ est un groupe, plusieurs résultats et propriétés en découlent naturellement, comme :

- ▶ L'unicité de l'élément neutre : Il n'existe qu'une seule permutation identité dans S_n .
- ▶ L'unicité des inverses : Pour chaque permutation σ de S_n , il existe une unique permutation σ^{-1} qui est son inverse.
- ▶ La loi de composition est fermée : La composition de deux permutations de S_n est toujours une permutation de S_n .

1.2 Permutations particulières

1.2.1 Transposition

Définition 4 (*Transposition*)

Une **transposition** est une permutation qui échange exactement deux éléments et laisse les autres inchangés.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\tau \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } \tau(i) = j \text{ et } \tau(j) = i \\ \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \tau(k) = k \end{cases}$$

On note $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange les éléments i et j .

$$\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$$

On écrit aussi :

$$\tau_{i,j} = (i \ j)$$

Exemple 5

Par exemple, la permutation τ suivante est une transposition :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Propriété 3

Le produit de transpositions est commutatif *uniquement* si les transpositions sont à supports disjoints (c'est-à-dire qu'elles n'échangent pas les mêmes éléments).

Exemple 6 (*Produit de transpositions à supports disjoints*)

Considérons les transpositions suivantes dans S_5 :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} = (1 \ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} = (3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Le produit de ces deux transpositions est donné par :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ainsi, $\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2}$, ce qui montre que ces deux transpositions commutent.

Remarque 1

Dans S_n , pour $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$(i \ j)(j \ i) = \text{id}$$

$$(j \ i)(i \ j) = \text{id}$$

Donc $(i j)^{-1} = (j i)$ et $(j i)^{-1} = (i j)$.

$$\tau_{i,j}^{-1} = \tau_{j,i}$$

Et on a aussi :

$$\tau_{i,j}^2 = \text{id}$$

L'ordre d'une transposition est 2.

On rappelle que, dans un groupe $(G, *)$ où G est de cardinal fini, pour $x \in G$, l'ordre de x est défini par $o(x) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } x^k = e\}$, où e est l'élément neutre de G .

✓ Propriété 4

Toute permutation de S_n peut être exprimée comme un produit de transpositions. Les transpositions engendrent S_n : $S_n = \langle \tau_{i,j} \text{ tel que } i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \rangle$. Ainsi, $\forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r$ transpositions de S_n telles que :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Q Preuve

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 1$ et $n = 2$, la démonstration est triviale, car S_1 ne contient que la permutation identité, et S_2 contient deux permutations, dont une est une transposition.

Supposons que la propriété soit vraie pour n et montrons qu'elle est vraie pour $n + 1$. Soit $\sigma \in S_{n+1}$. Si $\sigma(n + 1) = n + 1$, alors on peut considérer la restriction de σ à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, qui est une permutation de S_n . Par hypothèse de récurrence, cette restriction peut être exprimée comme un produit de transpositions.

$$\sigma|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on peut étendre chaque transposition τ_i à une transposition $\tau_{i'}$ de S_{n+1} en laissant $n + 1$ inchangé. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\begin{cases} \tau_{i'}|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_i \\ \tau_{i'}(n + 1) = n + 1 \end{cases}$$

$$\sigma = \tau_{1'} \circ \tau_{2'} \circ \dots \circ \tau_{r'}$$

Sinon, si $\sigma(n + 1) \neq n + 1$, alors on peut échanger $\sigma(n + 1)$ et $n + 1$ à l'aide de la transposition $\tau_{\sigma(n+1), n+1}$. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\sigma = \tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ (\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma)$$

(sachant que $\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma$ peut être exprimé comme un produit de transpositions de S_{n+1} par le cas précédent).

On peut aussi former une nouvelle permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} \sigma'(i) = \sigma(i) \\ \sigma'(n+1) = \tau_{\sigma(n+1), n+1}(\sigma(n+1)) = n+1 \end{cases}$$

Ainsi, $\sigma' \in S_{n+1}$ et $\sigma'(n+1) = n+1$. Par le cas précédent, σ' peut être exprimée comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

Par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r \text{ transpositions de } S_n : \sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

■

1.2.2 Cycle

Définition 5 (Cycle)

Un **cycle** de longueur k est une permutation qui envoie un élément vers un autre, qui envoie ce deuxième élément vers un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le k -ième élément soit envoyé vers le premier élément.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists k \in \mathbb{N}^*, \exists i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ distincts tels que } \sigma(i_1) = i_2, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1 \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}, \sigma(j) = j \end{cases}$$

Un cycle de longueur k est noté $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$.

Remarque 2

Une transposition est un cycle de longueur 2. Un cycle de longueur 1 est la permutation identité.

Exemple 7

Calculons le produit de deux cycles dans S_5 :

$$(1 \ 3 \ 4)(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Sachant que :

$$(1 \ 3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 3\ 4)((1\ 2\ 5)(i))$	$(1\ 3\ 4)(2)$	$(1\ 3\ 4)(5)$	$(1\ 3\ 4)(3)$	$(1\ 3\ 4)(4)$	$(1\ 3\ 4)(1)$
	2	5	4	1	3

On peut aussi le réécrire en tant que cycle de longueur 5 :

$$(1\ 3\ 4)(1\ 2\ 5) = (1\ 2\ 5\ 3\ 4)$$

On remarque que le produit de deux cycles n'est pas commutatif :

$$(1\ 2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4\ 2\ 5)$$

Par contre, il est parfois commutatif, comme pour :

$$(1\ 3\ 4)(2\ 5) = (2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Il n'y a pas de propriétés évidentes sur le carré d'un cycle, comme le montre l'exemple suivant :

$$(1\ 2\ 5)^2 = (1\ 5\ 2)$$

En effet, $(1\ 2\ 5)^2$ est défini par :

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 2\ 5)^2(i)$	$(1\ 2\ 5)(2)$	$(1\ 2\ 5)(5)$	$(1\ 2\ 5)(3)$	$(1\ 2\ 5)(4)$	$(1\ 2\ 5)(1)$
	5	1	3	4	2

Par contre, la puissance k d'un cycle de longueur k est la permutation identité :

$$(1\ 2\ 5)^3 = \text{id}$$

Remarque 3

L'ordre d'un cycle de longueur k est égal à k . En effet, pour un cycle de longueur k , la permutation revient à la position initiale après k applications du cycle.

En effet, pour un cycle σ de longueur k , on a :

$$\sigma^{k-1}(a_1) = a_k \implies \sigma^{k-1} \neq \text{id}$$

On rappelle que les a_k sont différents deux à deux.

On a aussi $\sigma^k = \text{id}$, car pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\sigma^k(a_i) = a_i$.

★ Théorème 1

Les cycles engendrent S_n .

$$S_n = \langle (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k) \text{ tel que } k \in \llbracket 1, n \rrbracket, i_1, i_2, \dots, i_k \text{ distincts} \rangle$$

🔍 Preuve

Par récurrence sur n , similaire à la preuve précédente pour les transpositions. ■

★ Théorème 2

Toute permutation de S_n peut être exprimée de manière unique (à l'ordre près) comme un produit *commutatif* de cycles à supports disjoints.

Ce dernier théorème est admis (sans preuve).

1.3 Signature

📖 Définition 6 (Signature d'une permutation)

La **signature** d'une permutation $\sigma \in S_n$, notée $\varepsilon(\sigma)$, est un réel défini par :

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

La signature ne peut être égale qu'à 1 ou à -1.

✏️ Exemple 8

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculons la signature de σ :

$$\begin{aligned}
 \epsilon(\sigma) &= \frac{\sigma(2) - \sigma(1)}{2 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(1)}{3 - 1} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(1)}{4 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(2)}{3 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(2)}{4 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(3)}{4 - 3} \\
 &= \frac{2 - 4}{2 - 1} \cdot \frac{1 - 4}{3 - 1} \cdot \frac{3 - 4}{4 - 1} \cdot \frac{1 - 2}{3 - 2} \cdot \frac{3 - 2}{4 - 2} \cdot \frac{3 - 1}{4 - 3} \\
 &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} \\
 &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{-1}{1} \\
 &= -1 \times \frac{1}{2} \times 2 \times (-1) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

✓ Propriété 5

$$\begin{aligned}
 \varepsilon : (S_n, \circ) &\rightarrow (\{-1, 1\}, \times) \\
 \sigma &\mapsto \varepsilon(\sigma)
 \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

Q Preuve

Pour montrer que ε est un morphisme de groupes, il suffit de montrer que pour toutes permutations σ_1 et σ_2 de S_n , on a :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

On sait que $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$ pour toute permutation σ de S_n . Donc ε est une application de S_n dans $\{-1, 1\}$.

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . Calculons $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2)$:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma_1 \circ \sigma_2)(j) - (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i)}{j - i} \\
 &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{j - i}
 \end{aligned}$$

On peut réécrire le produit ci-dessus en regroupant les termes de la manière suivante :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \cdot \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

Comme σ_1 est une permutation, elle est bijective, donc on peut effectuer un changement de variable (muette) dans le premier produit. En posant $k = \sigma_2(i)$ et $l = \sigma_2(j)$, on obtient :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq k \neq l \leq n} \frac{\sigma_1(l) - \sigma_1(k)}{l - k} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

On reconnaît dans le premier produit la signature de σ_1 et dans le second produit la signature de σ_2 :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

Ainsi, ε est un morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$. ■

1.4 Inversion

Définition 7 (Inversion d'une permutation)

On dit qu'une transposition (i, j) (avec $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $i \neq j$) est une **inversion** de la permutation $\sigma \in S_n$ si :

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

i.e. :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(i) & \dots & \sigma(j) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \text{ avec } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ .

Exemple 9

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$, car $1 < 2$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(2) = 2$.
- ▶ $(1, 3)$, car $1 < 3$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(3) = 1$.
- ▶ $(2, 3)$, car $2 < 3$ et $\sigma(2) = 2 > \sigma(3) = 1$.
- ▶ $(1, 4)$, car $1 < 4$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(4) = 3$.

$(3, 4)$ n'est pas une inversion de σ , car $3 < 4$ mais $\sigma(3) = 1 < \sigma(4) = 3$.

Propriété 6

La signature d'une permutation $\sigma \in S_n$ est égale à $(-1)^{I(\sigma)}$.

Exemple 10

Reprenons l'exemple précédent avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ (1, 2)
- ▶ (1, 3)
- ▶ (2, 3)
- ▶ (1, 4)

Ainsi, $I(\sigma) = 4$. Par conséquent, la signature de σ est donnée par :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^4 = 1$$

Remarque 4

1. Les inversions d'une transposition $\tau_{i,j} \in S_n$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$, $i < j \in \llbracket 1, n \rrbracket$) sont au nombre de $2(j - i) - 1$. La signature de toute transposition est donc égale à -1 .

$$I(\tau_{i,j}) = 2(j - i) - 1 \text{ et } \varepsilon(\tau_{i,j}) = -1$$

2. Pour une permutation $\sigma \in S_n$ exprimée comme un produit de transpositions, le nombre d'inversions de σ est égal au nombre de transpositions utilisées dans ce produit.

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r \implies \varepsilon(\sigma) = (-1)^r$$

3. Pour un cycle $\sigma = (a_1, \dots, a_p)$ de longueur p , le nombre d'inversions est égal à $p - 1$.

$$I(\sigma) = p - 1 \text{ et } \varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

Preuve

- ▶ Pour la première remarque, on étudie le nombre d'inversions de la transposition en considérant les inversions :

- ▷ (i, j) , qui est bel et bien une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < j$ et $\tau_{i,j}(i) = j > \tau_{i,j}(j) = i$.
- ▷ (k, i) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < k$ et $\tau_{i,j}(k) = k < \tau_{i,j}(i) = j$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type.
- ▷ (j, k) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $k < j$ et $\tau_{i,j}(k) = k > \tau_{i,j}(j) = i$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type.
- ▷ **Au total**, il y a $1 + (j - i - 1) + (j - i - 1) = 2(j - i) - 1$ inversions de $\tau_{i,j}$.

- ▶ Pour la deuxième remarque, on utilise le fait que la signature ε est un morphisme

de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$.

- ▷ Soit $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r$ un produit de r transpositions. Par récurrence immédiate sur le morphisme :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r) = \varepsilon(\tau_1) \cdot \varepsilon(\tau_2) \cdots \varepsilon(\tau_r)$$

- ▷ D'après la remarque précédente, la signature de toute transposition vaut -1 . On a donc :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot (-1) \cdots (-1) = (-1)^r$$

- Pour la troisième remarque, on décompose le p -cycle en un produit de transpositions.

- ▷ Un cycle $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ de longueur p peut s'écrire explicitement sous la forme d'un produit de $p - 1$ transpositions :

$$\sigma = (a_1, a_p) \circ (a_1, a_{p-1}) \circ \cdots \circ (a_1, a_3) \circ (a_1, a_2)$$

- ▷ En appliquant le résultat de la remarque 2 avec $r = p - 1$, on obtient directement :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

■

Définition 8 (Permutation paire et impaire)

Une permutation $\sigma \in S_n$ est dite **paire** si $\varepsilon(\sigma) = 1$, et **impaire** si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Exemple 11

Reprenons l'exemple précédent avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que la signature de σ est égale à 1. Par conséquent, σ est une permutation paire.

Pour un autre exemple, prenons la permutation σ' suivante dans S_5 :

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

On déduit facilement, à partir des inversions de σ' , que la signature de σ' est égale à -1 . Par conséquent, σ' est une permutation impaire.

✓ Propriété 7

L'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , appelé le **groupe alterné** d'ordre n et noté $\mathcal{A}_n$.

Son cardinal est égal à la moitié du cardinal de S_n :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{n!}{2}$$

On notera $\mathcal{E}_n$ l'ensemble des permutations impaires de S_n . On a aussi :

$$\text{card}(\mathcal{E}_n) = \frac{n!}{2}$$

$$\begin{cases} S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \\ \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset \end{cases}$$

Q Preuve

Pour démontrer que l'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , on peut vérifier les trois propriétés classiques (stabilité, existence d'un élément neutre, existence d'inverses) pour cet ensemble.

Mais une méthode plus rapide consiste à considérer $\mathcal{A}_n$ comme le noyau de l'application signature ε . En effet, l'élément neutre du groupe d'arrivée de ε est 1, et les éléments de S_n qui sont envoyés sur 1 par ε sont précisément les permutations paires. Ainsi, $\mathcal{A}_n = \ker(\varepsilon)$.

D'après les propriétés générales des morphismes de groupes, le noyau $\mathcal{A}_n$ est donc un sous-groupe de S_n .

Pour démontrer que le cardinal de $\mathcal{A}_n$ est égal à la moitié du cardinal de S_n , on utilise le fait que S_n est la réunion disjointe de l'ensemble des permutations paires $\mathcal{A}_n$ et de l'ensemble des permutations impaires $\mathcal{E}_n$:

$$S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \text{ et } \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset$$

Par conséquent, on a :

$$\text{card}(S_n) = \text{card}(\mathcal{A}_n) + \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

Montrons que $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal en construisant une bijection entre ces deux ensembles. Soit τ une transposition fixée de S_n (par exemple, $\tau = (1\ 2)$). On définit l'application suivante :

$$\varphi : \begin{array}{l} \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{E}_n \\ \sigma \mapsto \tau \circ \sigma \end{array}$$

Vérifions d'abord que φ est bien définie, c'est-à-dire que pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$, $\varphi(\sigma)$ appartient bien à $\mathcal{E}_n$. Par morphisme de la signature :

$$\varepsilon(\varphi(\sigma)) = \varepsilon(\tau \circ \sigma) = \varepsilon(\tau) \cdot \varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot 1 = -1$$

L'image de toute permutation paire par φ est donc bien une permutation impaire.

Montrons maintenant que φ est une bijection. Pour cela, on exhibe son application réciproque. Considérons l'application suivante :

$$\psi : \begin{array}{l} \mathcal{E}_n \rightarrow \mathcal{A}_n \\ \delta \mapsto \tau \circ \delta \end{array}$$

Par un raisonnement identique sur les signatures ($\varepsilon(\tau \circ \delta) = (-1) \cdot (-1) = 1$), ψ est bien définie de $\mathcal{E}_n$ vers $\mathcal{A}_n$.

Calculons les compositions de ces deux applications :

► Pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$:

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \psi(\tau \circ \sigma) = \tau \circ (\tau \circ \sigma) = (\tau \circ \tau) \circ \sigma$$

Comme τ est une transposition, elle est involutive ($\tau \circ \tau = \text{id}$). On a donc :

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \text{id} \circ \sigma = \sigma$$

Ainsi, $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{A}_n}$.

► Pour tout $\delta \in \mathcal{E}_n$:

$$(\varphi \circ \psi)(\delta) = \varphi(\tau \circ \delta) = \tau \circ (\tau \circ \delta) = (\tau \circ \tau) \circ \delta = \text{id} \circ \delta = \delta$$

Ainsi, $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{E}_n}$.

L'application φ admet une application réciproque (qui est ψ), elle est donc bijective. Par conséquent, les ensembles $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

En injectant ce résultat dans l'équation des cardinaux de la partition, on obtient :

$$\text{card}(S_n) = 2\text{card}(\mathcal{A}_n) \implies \text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{\text{card}(S_n)}{2} = \frac{n!}{2}$$

■

2 Applications multilinéaires

Définition 9

Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Une application $f : E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p \rightarrow F$ est dite **multilinéaire** si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables, C'est-à-dire que pour tout $(a_1, \dots, a_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$, pour tout $x \in E_k$ avec $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a :

$$f(a_1, \dots, a_{k-1}, x, a_{k+1}, \dots, a_p) \text{ est linéaire.}$$

On note $\mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$ l'ensemble des applications multilinéaires de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ dans F .

Remarque 5

1. Si $f \in \mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$, alors $\forall (x_1, x_2, \dots, x_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p) = 0_F$. La démonstration se fait simplement en soustrayant $f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p)$ à lui-même en utilisant la linéarité par rapport à la k -ième variable.
2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une application $f \in \mathcal{L}(\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \in \mathbb{N}^* \text{ fois}}, \mathbb{K}) = \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est dite une forme p -linéaire de E .

Exemple 12

Considérons l'application suivante :

$$f : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ (A, B) \mapsto A \cdot B$$

Pour montrer qu'elle est multilinéaire, nous allons prouver que :

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(\lambda A + A', B) = \lambda f(A, B) + f(A', B)$.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(A, B + \lambda B') = f(A, B) + \lambda f(A, B')$.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda A + A', B) &= (\lambda A + A') \cdot B \\ &= \lambda(A \cdot B) + A' \cdot B \\ &= \lambda f(A, B) + f(A', B) \end{aligned}$$

Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(A, B + \lambda B') &= A \cdot (B + \lambda B') \\ &= A \cdot B + \lambda(A \cdot B') \\ &= f(A, B) + \lambda f(A, B') \end{aligned}$$

Ainsi, f est une application multilinéaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Dans ce cas, elle est même **bilinéaire**.

Exemple 13

Considérons maintenant l'application suivante :

$$\begin{aligned} \varphi : (\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2 &\rightarrow \mathbb{K} \\ (f, g) &\mapsto \int_a^b f g \end{aligned}$$

On remarque que φ est symétrique, c'est-à-dire que $\forall f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$, $\varphi(f, g) = \varphi(g, f)$.

Pour montrer que φ est multilinéaire, il suffit alors de prouver que φ est linéaire par rapport à la première variable. En effet, la symétrie de φ implique que φ est aussi linéaire par rapport à la seconde variable.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $f, f' \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ et $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda f + f', g) &= \int_a^b (\lambda f + f') g \\ &= \int_a^b \lambda f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \int_a^b f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \varphi(f, g) + \varphi(f', g) \end{aligned}$$

Ainsi, φ est une application bilinéaire de $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2$ dans $\mathbb{K}$.

Définition 10 (Forme symétrique et alternée)

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E , avec $p \in \mathbb{N}^*$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- φ est **antisymétrique** si le fait d'échanger deux variables change le signe du résultat. Pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et pour tous indices $1 \leq i < j \leq p$:

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

► φ est **alternée** lorsque le résultat est nul dès que deux variables sont identiques.

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, (\exists i \neq j \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ tel que } x_i = x_j) \implies \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Exemple 14 (Forme symétrique)

Soit $E = \mathbb{R}^n$. L'application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par le produit scalaire usuel :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \varphi(x, y) = \langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

est une forme bilinéaire symétrique. En effet, la commutativité de la multiplication dans $\mathbb{R}$ implique immédiatement que $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$. Elle n'est ni alternée ni antisymétrique (sauf si les vecteurs sont orthogonaux).

Exemple 15 (Forme alternée et antisymétrique)

Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique et de son produit scalaire usuel. L'application $\psi : E \times E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par le produit mixte de trois vecteurs :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad \psi(x, y, z) = [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$$

est une forme trilinéaire ($p = 3$).

- **Alternance** : Si deux vecteurs sont identiques, par exemple $x = y$, le produit vectoriel s'annule ($x \wedge x = 0_{\mathbb{R}^3}$), ce qui donne $\psi(x, x, z) = \langle 0_{\mathbb{R}^3}, z \rangle = 0$. L'application est donc alternée.
- **Antisymétrie** : Par les propriétés géométriques du produit vectoriel, échanger deux variables inversent le signe du résultat, par exemple :

$$\psi(y, x, z) = \langle y \wedge x, z \rangle = \langle -(x \wedge y), z \rangle = -\psi(x, y, z)$$

Propriété 8

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E . Si $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2, alors :

$$\varphi \text{ antisymétrique} \iff \varphi \text{ alternée}$$

Preuve

► **Sens direct** : $\implies$

- ▷ Soit φ une forme p -linéaire antisymétrique. Montrons qu'elle est alternée.
- ▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $i < j$ avec $x_i = x_j = x$.

▷ Par antisymétrie, l'échange des composantes aux indices i et j produit :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p)$$

▷ On en déduit que $2 \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$. Comme $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, l'élément 2 est inversible dans le corps, ce qui implique :

$$\varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

▷ La forme φ est donc alternée.

► **Sens indirect :** $\Leftarrow$

▷ Soit φ une forme p -linéaire alternée. Montrons qu'elle est antisymétrique.

▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et deux indices distincts $i < j$. Évaluons la forme sur un vecteur dupliqué $x_i + x_j$ aux positions i et j :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

▷ Par linéarité par rapport à la i -ième variable, puis par rapport à la j -ième variable, on développe la relation en quatre termes :

$$\begin{aligned} & \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) \\ & + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

▷ Puisque φ est alternée, le premier terme (où x_i est répété) et le quatrième terme (où x_j est répété) sont nuls. L'équation se simplifie en :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

▷ Ce qui donne immédiatement par transposition de terme :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

▷ La forme φ est donc antisymétrique. ■

On rappelle que la caractéristique d'un corps $\mathbb{K}$ est définie par :

$$\text{Car}(\mathbb{K}) = \min\{n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } k \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \text{ s'il existe, sinon } 0\}$$

Par suite, on notera $\mathcal{A}_n(E)$ l'ensemble des formes n -linéaires alternées sur E .

✓ **Propriété 9**

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur un $\mathbb{K}$ -ev. E , avec $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \text{la famille } (x_1, \dots, x_n) \text{ est liée} \implies \varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

Q Preuve

- Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ une famille liée de vecteurs.
- Par définition d'une famille liée, il existe au moins un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que le vecteur x_k s'écrive comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille :

$$x_k = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, \quad \text{où } \lambda_i \in \mathbb{K}$$

- Par linéarité de φ par rapport à sa k -ième variable, on peut extraire la somme et les scalaires :

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_n) &= \varphi \left(x_1, \dots, x_{k-1}, \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, x_{k+1}, \dots, x_n \right) \\ &= \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, x_i, x_{k+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

- Pour chaque terme de cette somme, l'indice courant de la sommation i prend une valeur distincte de k . Le vecteur x_i apparaît donc deux fois dans le n -uplet : à sa position d'origine i et à la position k .
- Puisque φ est alternée, chacun de ces sous-déterminants s'annule identiquement. La somme de termes nuls étant nulle, on obtient :

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

■

→ Conséquence 2 (Invariance par opération élémentaire)

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur E . La valeur de la forme est invariante si l'on ajoute à une variable une combinaison linéaire des autres variables.

$$\begin{aligned} \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1} \\ \varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Q Preuve

Soient $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ et $(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1}$.

En utilisant la linéarité de φ par rapport à sa première composante, on développe

l'expression :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=2}^n \lambda_i \varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$$

Pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, le vecteur x_i de la somme apparaît à la fois à la première position et à la i -ième position dans l'expression $\varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$. L'application étant alternée, ce terme s'annule pour chaque valeur de i .

Il ne subsiste donc que le premier terme libre :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

■

→ Conséquence 3

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\forall p > n, \quad \mathcal{A}_p(E) = \{0\}$$

Où 0 désigne la forme p -linéaire nulle sur E .

Q Preuve

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $p > n$. Soit $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$ une forme p -linéaire alternée sur E .

Par définition de la dimension, le cardinal maximal d'une famille libre dans E est n .

Par conséquent, toute famille contenant p vecteurs (avec $p > n$) est nécessairement liée. En particulier, pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée.

D'après la propriété d'annulation sur les familles liées, on en déduit que :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \quad \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ainsi, φ est l'application nulle. Par conséquent, le seul élément de cet espace est la forme nulle :

$$\mathcal{A}_p(E) = \{0\}$$

■

✓ Propriété 10

Pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$ et pour toute permutation $\sigma \in S_p$:

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \quad \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)$$

Q Preuve

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$. Montrons par récurrence sur le nombre $r \in \mathbb{N}$ de transpositions que si une permutation $\sigma \in S_p$ s'écrit comme le produit de r transpositions, alors la relation est vérifiée.

- **Initialisation** ($r = 0$) : Si σ est le produit de 0 transposition, alors $\sigma = \text{id}$. On a $\varepsilon(\text{id}) = 1$ et $\varphi(x_{\text{id}(1)}, \dots, x_{\text{id}(p)}) = 1 \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)$, la propriété est vraie.
- **Hérédité** : Soit $r \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété soit vraie pour toute permutation décomposable en r transpositions. Soit σ une permutation s'exprimant comme un produit de $r + 1$ transpositions :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r \circ \tau_{r+1}$$

Posons $\theta = \tau_2 \circ \dots \circ \tau_{r+1}$, qui est un produit de r transpositions. Par hypothèse de récurrence, on a :

$$\varphi(x_{\theta(1)}, \dots, x_{\theta(p)}) = \varepsilon(\theta) \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) = (-1)^r \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)$$

La permutation σ s'écrit $\sigma = \tau_1 \circ \theta$. L'application d'une unique transposition τ_1 inverse le signe de la forme par antisymétrie (propriété démontrée précédemment pour les formes alternées). On a donc :

$$\begin{aligned} \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) &= \varphi(x_{\tau_1(\theta(1))}, \dots, x_{\tau_1(\theta(p))}) \\ &= -\varphi(x_{\theta(1)}, \dots, x_{\theta(p)}) \\ &= -((-1)^r \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)) \\ &= (-1)^{r+1} \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) \end{aligned}$$

Comme $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{r+1}$, l'hérédité est démontrée.

Tout élément de S_p admettant une décomposition en produit fini de transpositions, la relation est vérifiée pour toute permutation de S_p . ■

Exercices d'assimilation

Cette section ne fait pas partie du cours officiel.

Exercice 1 (*Étude d'une permutation et calculs explicites*)

Soit σ la permutation de S_6 définie par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer explicitement l'ensemble des inversions de σ . En déduire la valeur de sa signature $\varepsilon(\sigma)$.
2. Décomposer σ en produit de cycles à supports disjoints. En utilisant les propriétés du cours sur la signature d'un cycle, retrouver le résultat de la question précédente.
3. Décomposer la permutation σ en un produit de transpositions. Ce produit est-il unique ? Le nombre de transpositions utilisées est-il unique ?

1. Pour déterminer le nombre d'inversions $I(\sigma)$, nous listons méthodiquement les couples (i, j) tels que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$:
 - Pour $i = 1$ ($\sigma(1) = 4$) : les inversions sont $(1, 3)$ car $4 > 1$, $(1, 4)$ car $4 > 2$, et $(1, 6)$ car $4 > 3$ (3 inversions).
 - Pour $i = 2$ ($\sigma(2) = 6$) : les inversions sont $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, et $(2, 6)$ car l'élément 6 est strictement supérieur à toutes les images suivantes (4 inversions).
 - Pour $i = 3$ ($\sigma(3) = 1$) : aucune inversion car 1 est la valeur minimale de l'ensemble d'arrivée.
 - Pour $i = 4$ ($\sigma(4) = 2$) : aucune inversion car toutes les images à sa droite sont supérieures (5 et 3).
 - Pour $i = 5$ ($\sigma(5) = 5$) : l'unique inversion est $(5, 6)$ car $5 > 3$ (1 inversion).

En sommant ces résultats, on obtient $I(\sigma) = 3 + 4 + 0 + 0 + 1 = 8$ inversions. D'après la relation liant la signature au nombre d'inversions, on en déduit :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^8 = 1$$

La permutation σ est donc une permutation paire.

2. Déterminons les orbites de chaque élément pour obtenir la décomposition en cycles disjoints :

► $1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 6 \mapsto 3 \mapsto 1$, ce qui engendre le 5-cycle $(1\ 4\ 2\ 6\ 3)$.

► $5 \mapsto 5$, l'élément 5 est un point fixe.

La décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints est donc :

$$\sigma = (1\ 4\ 2\ 6\ 3)$$

La signature d'un p -cycle étant égale à $(-1)^{p-1}$, on obtient pour ce 5-cycle :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{5-1} = (-1)^4 = 1$$

On retrouve bien de manière cohérente le résultat de la question précédente.

3. En utilisant la décomposition explicite d'un cycle en produit de transpositions issue du cours, on peut écrire :

$$\sigma = (1\ 3) \circ (1\ 6) \circ (1\ 2) \circ (1\ 4)$$

Cette décomposition n'est pas unique. Par exemple, en exploitant l'involutivité d'une transposition ($\tau \circ \tau = \text{id}$), on peut insérer des termes redondants :

$$\sigma = (1\ 3) \circ (1\ 6) \circ (1\ 2) \circ (1\ 4) \circ (5\ 6) \circ (5\ 6)$$

De fait, le nombre de transpositions utilisées n'est pas unique (on passe ici de 4 à 6 transpositions). En revanche, par morphisme de la signature, la parité du nombre r de transpositions est un invariant structural de la permutation. Comme $\varepsilon(\sigma) = 1$, le nombre de transpositions sera systématiquement pair puisque $(-1)^r = 1$.

Exercice 2 (Autour de la signature et des structures de groupes)

L'objectif de cet exercice est d'établir des propriétés structurelles sur le groupe symétrique.

1. Soit $\sigma \in S_n$. Montrer que la permutation σ et son inverse σ^{-1} possèdent exactement le même nombre d'inversions, c'est-à-dire que $I(\sigma) = I(\sigma^{-1})$.
2. Soit $n \geq 2$. Montrer que le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est engendré par les 3-cycles du groupe symétrique S_n .

Indication : On rappellera que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les produits de paires de transpositions, puis on étudiera les produits de la forme $(i\ j) \circ (i\ k)$ et $(i\ j) \circ (k\ l)$ pour des indices distincts.

1. Soit $\sigma \in S_n$. Notons $\mathcal{I}(\sigma)$ l'ensemble des inversions de σ . Par définition :

$$\mathcal{I}(\sigma) = \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)\}$$

Considérons l'application suivante qui opère sur les paires d'indices :

$$f : \begin{array}{l} \mathcal{I}(\sigma) \rightarrow \mathcal{I}(\sigma^{-1}) \\ (i, j) \mapsto (\sigma(j), \sigma(i)) \end{array}$$

Vérifions que l'image d'une inversion de σ par f est bien une inversion de σ^{-1} . Soit $(i, j) \in \mathcal{I}(\sigma)$. Posons $k = \sigma(j)$ and $l = \sigma(i)$. Puisque (i, j) est une inversion de σ , on a par hypothèse $i < j$ et $l > k$, ce qui donne trivialement $k < l$. En appliquant l'application inverse σ^{-1} , on retrouve :

$$\sigma^{-1}(k) = j \quad \text{et} \quad \sigma^{-1}(l) = i$$

Comme $i < j$, on en déduit que $\sigma^{-1}(k) > \sigma^{-1}(l)$. Le couple d'indices (k, l) vérifie donc $k < l$ et $\sigma^{-1}(k) > \sigma^{-1}(l)$, ce qui caractérise rigoureusement une inversion de σ^{-1} . L'application f est donc bien définie.

Pour démontrer rigoureusement que f est bijective, construisons explicitement son application réciproque. Par symétrie du problème, considérons l'application candidate suivante :

$$g : \begin{array}{c} \mathcal{I}(\sigma^{-1}) \rightarrow \mathcal{I}(\sigma) \\ (k, l) \mapsto (\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k)) \end{array}$$

Par un raisonnement identique à celui mené pour f , l'application g est bien définie. Évaluons les compositions des deux applications pour vérifier qu'elles s'identifient aux identités respectives des ensembles d'inversions :

► Pour tout couple $(i, j) \in \mathcal{I}(\sigma)$, on a :

$$(g \circ f)(i, j) = g(f(i, j)) = g(\sigma(j), \sigma(i))$$

► En appliquant la définition de g sur le couple d'arguments $(\sigma(j), \sigma(i))$, on obtient :

$$g(\sigma(j), \sigma(i)) = (\sigma^{-1}(\sigma(i)), \sigma^{-1}(\sigma(j))) = (i, j)$$

► On a donc $g \circ f = \text{id}_{\mathcal{I}(\sigma)}$.

► Pour tout couple $(k, l) \in \mathcal{I}(\sigma^{-1})$, on a de la même manière :

$$(f \circ g)(k, l) = f(g(k, l)) = f(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k))$$

► En appliquant la définition de f sur le couple d'arguments $(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k))$, on obtient :

$$f(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k)) = (\sigma(\sigma^{-1}(k)), \sigma(\sigma^{-1}(l))) = (k, l)$$

► On a donc $f \circ g = \text{id}_{\mathcal{I}(\sigma^{-1})}$.

L'application f admet une application réciproque à gauche et à droite (qui est g). f est donc une bijection. Cela implique l'égalité des cardinaux des ensembles de départ et d'arrivée, d'où :

$$I(\sigma) = I(\sigma^{-1})$$

2. Par propriété du cours, le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est constitué des permutations paires, et chaque permutation de $\mathcal{A}_n$ peut se décomposer en un produit comportant un nombre pair de transpositions. On peut donc regrouper les transpositions de cette décomposition par paires consécutives de la forme $\tau_1 \circ \tau_2$.

Soient deux transpositions quelconques τ_1 et τ_2 opérant dans S_n . Nous pouvons analyser de manière exhaustive les trois configurations géométriques possibles pour leurs supports :

- **Cas 1 : Les supports sont identiques.** Si les deux transpositions échangent les mêmes éléments i et j , alors :

$$\tau_1 \circ \tau_2 = (i\ j) \circ (i\ j) = \text{id}$$

L'identité peut s'exprimer comme le produit d'un 3-cycle quelconque et de son inverse : $\text{id} = (i\ j\ k) \circ (i\ k\ j)$, où k est un troisième indice distinct choisi dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- **Cas 2 : Les supports ont exactement un élément en commun.** Supposons sans perte de généralité que cet élément pivot commun soit i . Les deux transpositions s'écrivent $(i\ j)$ et $(i\ k)$ avec $j \neq k$. En évaluant la composée sur chaque élément, on obtient :

$$(i\ j) \circ (i\ k) = (i\ k\ j)$$

Le produit de deux transpositions ayant un élément commun est donc égal à un 3-cycle de S_n .

- **Cas 3 : Les supports sont strictement disjoints.** Soient quatre indices distincts deux à deux i, j, k, l . Les deux transpositions s'écrivent $(i\ j)$ et $(k\ l)$. Afin de faire apparaître des points de contact, on insère l'identité sous la forme $(i\ k) \circ (i\ k)$ au centre du produit :

$$(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ j) \circ \text{id} \circ (k\ l) = \underbrace{(i\ j) \circ (i\ k)}_{\text{Cas 2}} \circ \underbrace{(i\ k) \circ (k\ l)}_{\text{Cas 2}}$$

En appliquant le résultat établi dans le Cas 2 aux deux blocs de calcul distincts, on obtient :

$$(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ k\ j) \circ (k\ l\ i)$$

Le produit de deux transpositions disjointes se factorise donc sous la forme d'un produit de deux 3-cycles.

Dans chaque cas de figure, le produit de deux transpositions se décompose exclusivement comme un produit de 3-cycles. Par stabilité de la loi de composition interne, toute permutation paire (élément de $\mathcal{A}_n$) est décomposable en un produit de 3-cycles. On en conclut que la famille des 3-cycles engendre le groupe alterné $\mathcal{A}_n$.

Exercice 3 (Formes bilinéaires symétriques et alternées)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2. On note $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des formes bilinéaires sur E , $\mathcal{S}_2(E)$ l'ensemble des

formes bilinéaires symétriques, et $\mathcal{A}_2(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires alternées.

1. Démontrer que $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.
2. Montrer que l'espace des formes bilinéaires se décompose en somme directe sous la forme :

$$\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$$

3. On suppose dans cette question que l'espace E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Dédurre des questions précédentes la dimension de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_2(E)$.

1. L'application nulle de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ est trivialement symétrique et alternée, donc $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont non vides.

► Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}_2(E)$. Pour tout $(x, y) \in E^2$:

$$(\lambda\varphi_1 + \varphi_2)(y, x) = \lambda\varphi_1(y, x) + \varphi_2(y, x) = \lambda\varphi_1(x, y) + \varphi_2(x, y) = (\lambda\varphi_1 + \varphi_2)(x, y)$$

La combinaison linéaire est symétrique, donc $\mathcal{S}_2(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

► Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{A}_2(E)$. Pour tout $x \in E$:

$$(\lambda\psi_1 + \psi_2)(x, x) = \lambda\psi_1(x, x) + \psi_2(x, x) = \lambda \cdot 0 + 0 = 0$$

La combinaison linéaire est alternée, donc $\mathcal{A}_2(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

2. Procédons par analyse-synthèse pour montrer que $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$.

► **Analyse** : Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Supposons qu'il existe $s \in \mathcal{S}_2(E)$ et $a \in \mathcal{A}_2(E)$ tels que $f = s + a$. Pour tout $(x, y) \in E^2$, on a :

$$\begin{cases} f(x, y) = s(x, y) + a(x, y) \\ f(y, x) = s(y, x) + a(y, x) = s(x, y) - a(x, y) \end{cases}$$

Par somme et différence des deux lignes (puisque $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$), les formes s et a sont uniquement déterminées par :

$$s(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x)) \quad \text{et} \quad a(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) - f(y, x))$$

L'unicité de la décomposition prouve que la somme est directe : $\mathcal{S}_2(E) \cap \mathcal{A}_2(E) = \{0\}$.

► **Synthèse** : Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Définissons les deux applications s et a sur E^2 par les formules obtenues lors de l'analyse. Par bilinéarité de f , s et a sont trivialement bilinéaires. De plus, pour tout $(x, y) \in E^2$, $s(y, x) = s(x, y)$, donc $s \in \mathcal{S}_2(E)$. Pour tout $x \in E$, $a(x, x) = \frac{1}{2}(f(x, x) - f(x, x)) = 0$, donc $a \in \mathcal{A}_2(E)$. Enfin, on vérifie immédiatement que $s(x, y) + a(x, y) = f(x, y)$, ce qui valide l'existence de la décomposition.

On conclut que $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$.

3. L'espace E étant de dimension finie n , fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . L'application qui à toute forme bilinéaire associe sa matrice représentative dans la base $\mathcal{B}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels entre $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On rappelle que, pour tout $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F de dimensions respectives n et m , l'application suivante est bijective :

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \end{array}$$

Où $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont des bases respectives de E et F . En particulier, pour $F = \mathbb{K}$, on a l'isomorphisme :

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f), \mathcal{B}, \mathcal{B}_{\text{can}} \end{array}$$

Par cet isomorphisme, l'espace des formes alternées $\mathcal{A}_2(E)$ est isomorphe à l'espace des matrices antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$. Une matrice antisymétrique $M = (m_{i,j})$ possède une diagonale nulle ($m_{i,i} = 0$) et ses coefficients sous la diagonale sont uniquement déterminés par la relation $m_{i,j} = -m_{j,i}$. Sa dimension est donc égale au nombre de coefficients situés strictement au-dessus de la diagonale, d'où :

$$\dim(\mathcal{A}_2(E)) = \dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Exercice 4 (Propriétés des $\mathcal{A}_n(E)$ et trace d'un $\mathcal{L}(E)$)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée non nulle. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . On définit une application φ_f de E^n dans $\mathbb{K}$ par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, f(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

1. Montrer que l'application φ_f est une forme n -linéaire sur E .
2. Démontrer que φ_f est une forme alternée.
3. On admet que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ des formes n -linéaires alternées est de dimension 1 lorsque $\dim(E) = n$. Que peut-on en déduire concernant la relation entre la forme φ_f et la forme d'origine φ ?

1. L'application φ étant une forme n -linéaire, elle est bien définie de E^n dans $\mathbb{K}$. L'application φ_f est donc également bien définie de E^n dans $\mathbb{K}$ comme somme finie de termes scalaires.

Montrons que φ_f est linéaire par rapport à sa k -ième variable (pour un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé). Soient $x_k, y_k \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \in E^{n-1}$. Évaluons $\varphi_f(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n)$ en séparant la somme définissant φ_f en trois blocs

distincts : le terme $i = k$, et les termes $i \neq k$.

$$\begin{aligned}\varphi_f(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, f(x_i), \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} \varphi(x_1, \dots, f(x_i), \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) \\ &\quad + \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, f(\alpha x_k + y_k), x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &\quad + \sum_{i=k+1}^n \varphi(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, f(x_i), \dots, x_n)\end{aligned}$$

En utilisant la linéarité de f sur le terme central ($f(\alpha x_k + y_k) = \alpha f(x_k) + f(y_k)$) et la linéarité de la forme φ par rapport à ses composantes pour chaque bloc, on peut extraire le scalaire α et séparer les structures :

$$\begin{aligned}&= \alpha \left[\sum_{i=1}^{k-1} \varphi(\dots, f(x_i), \dots, x_k, \dots) + \varphi(\dots, f(x_k), \dots) + \sum_{i=k+1}^n \varphi(\dots, x_k, \dots, f(x_i), \dots) \right] \\ &\quad + \left[\sum_{i=1}^{k-1} \varphi(\dots, f(x_i), \dots, y_k, \dots) + \varphi(\dots, f(y_k), \dots) + \sum_{i=k+1}^n \varphi(\dots, y_k, \dots, f(x_i), \dots) \right] \\ &= \alpha \varphi_f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) + \varphi_f(x_1, \dots, y_k, \dots, x_n)\end{aligned}$$

L'application φ_f est linéaire par rapport à sa k -ième variable pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, elle est donc n -linéaire sur E .

2. Montrons que φ_f est une forme alternée. Soit $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $k < l$ pour lesquels $x_k = x_l = x$. Analysons les termes de la somme $\varphi_f(x_1, \dots, x_n)$:

$$\varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, x_k, \dots, x_l, \dots, x_{i-1}, f(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

► Pour tout indice $i \notin \{k, l\}$, le n -uplet sur lequel est évalué φ contient toujours x_k et x_l intacts. Comme $x_k = x_l = x$, et que la forme φ d'origine est alternée, tous ces termes s'annulent identiquement.

► Il ne subsiste donc dans la somme que les deux termes associés aux indices $i = k$ et $i = l$:

$$\begin{aligned}\varphi_f(x_1, \dots, x_n) &= \varphi(x_1, \dots, f(x_k), \dots, x_l, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x_k, \dots, f(x_l), \dots, x_n) \\ &= \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x, \dots, f(x), \dots, x_n)\end{aligned}$$

Puisque φ est alternée, elle est également antisymétrique. L'échange des composantes aux indices k et l (c'est-à-dire l'échange de $f(x)$ et x) dans le second terme génère un changement de signe :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, f(x), \dots, x_n) = -\varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n)$$

En injectant cette relation d'antisymétrie, on obtient :

$$\varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) - \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

L'application φ_f est donc une forme n -linéaire alternée sur E , soit $\varphi_f \in \mathcal{A}_n(E)$.

-
3. On sait que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ est de dimension 1. De fait, toute famille constituée d'un unique vecteur non nul de cet espace en forme une base.

Puisque $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et que $\varphi \neq 0$ par hypothèse, la famille (φ) est une base de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$. Comme nous avons démontré à la question précédente que φ_f appartient également à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, il existe un unique scalaire dépendant uniquement de f , noté $\lambda_f \in \mathbb{K}$, tel que :

$$\varphi_f = \lambda_f \cdot \varphi$$

3 Déterminant d'un système de vecteurs

Définition 11

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soient $u_1, \dots, u_n \in E$ des vecteurs. Leurs coordonnées respectives dans la base $\mathcal{B}$ sont données par les scalaires $a_{i,j} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i = a_{1,j} e_1 + a_{2,j} e_2 + \dots + a_{n,j} e_n$$

On définit le **déterminant** du système de vecteurs $u_1, \dots, u_n$ dans la base $\mathcal{B}$ par la formule de Leibniz :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k}$$

Par changement d'indice via la permutation inverse σ^{-1} , cette somme peut également s'effectuer sur les lignes, ce qui donne la formulation équivalente :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{k, \sigma(k)}$$

On note de manière compacte ce déterminant sous forme matricielle :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Remarque 6 (Déterminants usuels)

- Dans un espace vectoriel de dimension 2, le déterminant d'un système de vecteurs $u_1 = a_{1,1}e_1 + a_{2,1}e_2$ et $u_2 = a_{1,2}e_1 + a_{2,2}e_2$ est égal à :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2) = \varepsilon(\text{id})a_{1,1}a_{2,2} + \varepsilon((1\ 2))a_{1,2}a_{2,1} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$$

Sachant que $S_2 = \{\text{id}, (1\ 2)\}$ avec $\varepsilon(\text{id}) = 1$ et $\varepsilon((1\ 2)) = -1$.

► Dans un espace vectoriel de dimension 3, le déterminant d'un système de vecteurs

$$\begin{cases} u_1 = a_{1,1}e_1 + a_{2,1}e_2 + a_{3,1}e_3 \\ u_2 = a_{1,2}e_1 + a_{2,2}e_2 + a_{3,2}e_3 \\ u_3 = a_{1,3}e_1 + a_{2,3}e_2 + a_{3,3}e_3 \end{cases}$$

est donné par le **développement de Sarrus** comportant $3! = 6$ termes :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, u_3) &= \varepsilon(\text{id})a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + \varepsilon((1\ 2\ 3))a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + \varepsilon((1\ 3\ 2))a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ &\quad + \varepsilon((1\ 2))a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} + \varepsilon((1\ 3))a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} + \varepsilon((2\ 3))a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} \end{aligned}$$

chacun associé à une des permutations de S_3 dont les signatures respectives sont :

$$\begin{cases} S_3 = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\} \\ \varepsilon(\text{id}) = \varepsilon((1\ 2\ 3)) = \varepsilon((1\ 3\ 2)) = 1 \\ \varepsilon((1\ 2)) = \varepsilon((1\ 3)) = \varepsilon((2\ 3)) = -1 \end{cases}$$

Exemple 16 (Dans $\mathbb{R}^3$)

Dans $\mathbb{R}^3$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, calculons le déterminant du système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 2) \\ v = (2, 0, 3) \\ w = (3, -1, 4) \end{cases}$$

On écrit la matrice associée : $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$.

En appliquant la formule de développement explicite pour $n = 3$, on trouve :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u, v, w) &= 1 \cdot 0 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 3 - 2 \cdot (-1) \cdot 4 - 3 \cdot 0 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \cdot 3 \\ &= 0 - 4 - 9 + 8 - 0 + 3 = -2 \end{aligned}$$

Exemple 17 (Polynômes de degré au plus 2)

Dans $\mathbb{K}_2[X]$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$, calculons le déterminant

du système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} P = (1 - X)^2 = 1 - 2X + X^2 \\ Q = 2 - 3X \\ R = X - 2X^2 \end{cases}$$

On dresse le tableau des coordonnées en colonne : $\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$.

En développant, on obtient explicitement :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) &= 1 \cdot (-3) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) \cdot 0 - 0 \cdot (-3) \cdot 1 - 2 \cdot (-2) \cdot (-2) - 1 \cdot 1 \cdot 0 \\ &= 6 + 2 - 8 = 0 \end{aligned}$$

Pour les propriétés suivantes, on considère E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

✓ Propriété 11

Toute forme n -linéaire alternée de E est un multiple scalaire du déterminant dans la base $\mathcal{B}$:

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Cela implique que la famille $(\det_{\mathcal{B}})$ engendre l'espace des formes n -linéaires alternées, d'où la structure suivante :

$$\begin{cases} \det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E) \\ \mathcal{A}_n(E) = \mathbb{K} \cdot \det_{\mathcal{B}} \\ \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{A}_n(E)) = 1 \end{cases}$$

Q Preuve

Considérons une forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ un n -uplet de vecteurs. Les coordonnées de ces vecteurs dans la base $\mathcal{B}$ s'écrivent :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

En utilisant la linéarité de φ par rapport à chacune de ses composantes, on développe

l'expression globale par rapport aux familles d'indices :

$$\begin{aligned}
\varphi(u_1, \dots, u_n) &= \varphi \left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} e_{i_1}, u_2, \dots, u_n \right) \\
&= \sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} \varphi(e_{i_1}, u_2, \dots, u_n) \\
&= \sum_{1 \leq i_1, i_2 \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, u_3, \dots, u_n) \\
&\vdots \\
&= \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \dots a_{i_n,n} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\
&= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \llbracket 1, n \rrbracket^n} \left(\prod_{k=1}^n a_{i_k, k} \right) \cdot \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\
&= \sum_{f \in \llbracket 1, n \rrbracket^{\llbracket 1, n \rrbracket}} \left(\prod_{k=1}^n a_{f(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)})
\end{aligned}$$

L'indice de sommation f décrit l'ensemble des applications de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même. Si une fonction f n'est pas injective, il existe deux indices distincts $k < l$ tels que $f(k) = f(l)$. Le n -uplet associé possède alors deux vecteurs identiques. La forme φ étant alternée, ce terme s'annule :

$$\varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) = 0_{\mathbb{K}}$$

On peut par conséquent restreindre la somme aux seules applications injectives, c'est-à-dire aux permutations $\sigma \in S_n$:

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)})$$

Par propriété d'antisymétrie sur les formes alternées, l'action de la permutation σ sur la base extrait sa signature : $\varphi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(e_1, \dots, e_n)$. On réinjecte cette relation dans la somme :

$$\begin{aligned}
\varphi(u_1, \dots, u_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varepsilon(\sigma) \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \\
&= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \\
&= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \det_B(u_1, \dots, u_n)
\end{aligned}$$

La relation étant vérifiée pour tout n -uplet, on en conclut l'égalité des formes :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_B$$

■

✓ Propriété 12

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$$

Q Preuve

L'application du déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ appartient à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$. En lui appliquant directement la propriété précédente évaluée sur les vecteurs de la base $\mathcal{B}$, on obtient :

$$\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

L'application déterminant n'étant pas identiquement nulle, son unique coefficient multiplicateur sur elle-même est nécessairement l'élément neutre scalaire, d'où $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$. ■

✓ Propriété 13

Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , alors :

$$\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Cela implique l'identité scalaire inverse suivante :

$$\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$$

Q Preuve

Puisque $\det_{\mathcal{B}'}$ est une forme n -linéaire alternée sur E , elle appartient à $\mathcal{A}_n(E)$. L'application directe du théorème de structure dans la base $\mathcal{B}$ donne immédiatement :

$$\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

En évaluant cette égalité sur la famille de vecteurs de la base $\mathcal{B}'$, et en utilisant la propriété d'identité précédente ($\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}') = 1$), on trouve :

$$1 = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$$

Ce qui démontre la relation demandée. ■

💬 Remarque 7

Comme $\det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E)$, toutes les propriétés d'une forme n -linéaires alternée s'ap-

pliquent à l'application déterminant :

$$\begin{cases} \det_{\mathcal{B}}(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \\ \det_{\mathcal{B}}(u_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i u_i, u_2, \dots, u_n) = \det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) \\ (u_1, \dots, u_n) \text{ est une base de } E \iff \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}} \end{cases}$$

Preuve (Démonstration du troisième point de la remarque)

Soit une famille $B' = (u_1, \dots, u_n)$ de E .

$\implies$ Supposons que B' est une base de E . D'après la propriété de changement de base établie précédemment, on a l'identité scalaire :

$$\det_{B'}(B) \cdot \det_B(B') = 1$$

Si l'on avait $\det_B(B') = 0_{\mathbb{K}}$, le produit membre à membre donnerait $0_{\mathbb{K}} = 1$, ce qui est absurde. Par conséquent, $\det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$.

$\Leftarrow$ Supposons par l'absurde que $\det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$ et que la famille B' ne soit pas une base de E .

Puisque le cardinal de B' est exactement égal à $\dim(E) = n$, le fait que B' ne soit pas une base implique nécessairement que la famille est liée (si elle était libre, elle serait maximale et formerait une base).

Or, d'après la propriété d'annulation des formes alternées sur les familles liées, on a :

$$\det_B(u_1, \dots, u_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ce résultat contredit directement l'hypothèse de départ. Par conséquent, la famille $B' = (u_1, \dots, u_n)$ est obligatoirement une base de E . ■

Exemple 18 (Dans $\mathbb{R}^3$)

On considère la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivante :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 3) \\ v = (2, 1, 1) \\ w = (-1, 4, 1) \end{cases}$$

Calculons le déterminant de ce système de vecteurs dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = 27 \neq 0$$

Par conséquent, la famille de vecteurs (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$.

 Exemple 19 (*Polynômes de degré au plus 2*)

On considère la famille de vecteurs de $\mathbb{R}_2[X]$ suivante :

$$\begin{cases} P = (1 - X)^2 = 1 - 2X + X^2 \\ Q = 2 - 3X \\ R = X - 2X^2 \end{cases}$$

Calculons le déterminant de ce système de vecteurs dans la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$:

$$\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = 0$$

Par conséquent, la famille de vecteurs (P, Q, R) n'est pas une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

4 Déterminant d'un endomorphisme

✓ Propriété 14

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Il existe un unique scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que, pour toute forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et pour tout système de vecteurs $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$, on ait :

$$\varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$$

📖 Définition 12

Ce scalaire unique λ est appelé le **déterminant** de l'endomorphisme f , noté $\det(f)$.

🔍 Preuve

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Introduisons l'application Ψ qui, à chaque forme n -linéaire alternée φ , associe l'application $\Psi(\varphi)$ définie par :

$$\Psi(\varphi) : E^n \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) \mapsto \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n))$$

► Étape 1 : Ψ est bien définie de $\mathcal{A}_n(E)$ dans $\mathcal{A}_n(E)$

- ▷ Par linéarité de f et par n -linéarité de φ , il est immédiat que $\Psi(\varphi)$ est une forme n -linéaire sur E .
- ▷ Montrons qu'elle est alternée. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ tel qu'il existe deux indices distincts $i \neq j$ avec $u_i = u_j$. Par linéarité de f , on a $f(u_i) = f(u_j)$. La forme φ étant alternée, on en déduit :

$$\Psi(\varphi)(u_1, \dots, u_n) = \varphi(f(u_1), \dots, f(u_i), \dots, f(u_j), \dots, f(u_n)) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ainsi, pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, on a $\Psi(\varphi) \in \mathcal{A}_n(E)$.

► Étape 2 : Ψ est une application linéaire

- ▷ Soient $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{A}_n(E)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$:

$$\begin{aligned} \Psi(\alpha\varphi_1 + \varphi_2)(u_1, \dots, u_n) &= (\alpha\varphi_1 + \varphi_2)(f(u_1), \dots, f(u_n)) \\ &= \alpha\varphi_1(f(u_1), \dots, f(u_n)) + \varphi_2(f(u_1), \dots, f(u_n)) \\ &= \alpha\Psi(\varphi_1)(u_1, \dots, u_n) + \Psi(\varphi_2)(u_1, \dots, u_n) \end{aligned}$$

L'égalité étant vraie pour tout n -uplet de vecteurs, on a $\Psi(\alpha\varphi_1 + \varphi_2) = \alpha\Psi(\varphi_1) + \Psi(\varphi_2)$. L'application Ψ est donc un endomorphisme de l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, soit $\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_n(E))$.

► Étape 3 : Application de l'argument de dimension

- ▷ Nous avons démontré précédemment que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ des formes n -linéaires alternées est de dimension 1.
- ▷ Or, tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension 1 est une homothétie vectorielle. En effet, si l'on fixe une base (φ_0) de $\mathcal{A}_n(E)$, l'image $\Psi(\varphi_0)$ appartient à $\mathcal{A}_n(E)$ et s'écrit de manière unique comme un multiple scalaire de la base : $\exists! \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\Psi(\varphi_0) = \lambda \cdot \varphi_0$.
- ▷ Par linéarité de Ψ , pour toute autre forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ s'écrivant $\varphi = \alpha\varphi_0$, on obtient :

$$\Psi(\varphi) = \Psi(\alpha\varphi_0) = \alpha\Psi(\varphi_0) = \alpha(\lambda \cdot \varphi_0) = \lambda \cdot (\alpha\varphi_0) = \lambda \cdot \varphi$$

L'endomorphisme Ψ est donc l'homothétie de rapport λ , soit $\Psi = \lambda \cdot \text{id}_{\mathcal{A}_n(E)}$.

► Étape 4 : Conclusion

- ▷ Par définition de l'égalité de deux applications, on a pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$:

$$\Psi(\varphi) = \lambda \cdot \varphi$$

En évaluant cette relation sur un système de vecteurs quelconque $(u_1, \dots, u_n)$, on trouve :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \quad \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$$

L'unicité de λ est garantie par l'unicité du rapport de l'homothétie associée à Ψ .

■

→ Conséquence 4

Soit $\mathcal{B}$ une base quelconque de E . Le déterminant de l'endomorphisme f correspond au déterminant de la famille des images des vecteurs de la base $\mathcal{B}$ exprimée dans cette même base $\mathcal{B}$:

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B}))$$

Q Preuve

Considérons la base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . Puisque l'application déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ appartient à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, on peut lui appliquer directement le théorème précédent :

$$\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \det(f) \cdot \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n)$$

Or, nous avons établi à la section précédente que $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$. L'équation

se simplifie immédiatement en :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B}))$$

■

 Exemple 20 (*Dans $\mathbb{R}^3$*)

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme défini par :

$$f(x, y, z) = (x - 3y + z, 2x - y, x + y - z)$$

Calculons le déterminant de f dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$.
En appliquant f aux vecteurs de la base, on trouve :

$$\begin{cases} f(e_1) = (1, 2, 1) \\ f(e_2) = (-3, -1, 1) \\ f(e_3) = (1, 0, -1) \end{cases}$$

Le déterminant de f est alors donné par :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det(f) = -2$$

 Exemple 21 (*Polynômes de degré au plus 2*)

Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ l'endomorphisme défini par :

$$f(P) = (1 - X)P' + 3P$$

Calculons le déterminant de f dans la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.
En appliquant f aux vecteurs de la base, on trouve :

$$\begin{cases} f(1) = 3 \\ f(X) = 3X + 1 - X = 2X + 1 \\ f(X^2) = (1 - X) \cdot 2X + 3X^2 = X^2 + 2X \end{cases}$$

Le déterminant de f est alors donné par :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(1), f(X), f(X^2)) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det(f) = 6$$

Dans E , un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, les propriétés suivantes sont vérifiées :

✓ **Propriété 15 (Déterminant de l'identité)**

$$\det(\text{id}_E) = 1$$

Q **Preuve**

En appliquant le corollaire de la section précédente à l'endomorphisme identité id_E , on obtient :

$$\det(\text{id}_E) = \det_{\mathcal{B}}(\text{id}_E(\mathcal{B})) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B})$$

Or, il a été établi lors de la construction du déterminant d'un système de vecteurs que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$. Par conséquent, on a $\det(\text{id}_E) = 1$. ■

✓ **Propriété 16 (Déterminant d'une homothétie)**

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall f \in \mathcal{L}(E), \quad \det(\lambda \cdot f) = \lambda^n \cdot \det(f)$$

Q **Preuve**

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base de E . Par définition du déterminant de l'endomorphisme $\lambda \cdot f$, on évalue la forme alternée $\det_{\mathcal{B}}$ sur le système des images :

$$\det(\lambda \cdot f) = \det_{\mathcal{B}}((\lambda \cdot f)(e_1), \dots, (\lambda \cdot f)(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(\lambda \cdot f(e_1), \dots, \lambda \cdot f(e_n))$$

L'application $\det_{\mathcal{B}}$ étant une forme n -linéaire, on peut extraire le scalaire λ de chacune de ses n composantes de manière successive :

$$\begin{aligned} \det(\lambda \cdot f) &= \lambda \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \lambda \cdot f(e_2), \dots, \lambda \cdot f(e_n)) \\ &= \lambda^2 \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \lambda \cdot f(e_3), \dots, \lambda \cdot f(e_n)) \\ &= \lambda^n \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) \end{aligned}$$

En reconnaissant dans le terme final l'expression de $\det(f)$, on conclut :

$$\det(\lambda \cdot f) = \lambda^n \cdot \det(f)$$

✓ **Propriété 17 (Déterminant d'une composée)**

$$\forall f, g \in \mathcal{L}(E), \quad \det(g \circ f) = \det(g) \cdot \det(f)$$

Q Preuve

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base de E . Par le corollaire de structure, le déterminant de la composée $f \circ g$ correspond au déterminant de la famille des images de la base $\mathcal{B}$ exprimée dans cette même base :

$$\det(f \circ g) = \det_{\mathcal{B}}((f \circ g)(e_1), \dots, (f \circ g)(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n)))$$

Or, l'application $\det_{\mathcal{B}}$ est une forme n -linéaire alternée ($\det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E)$). On peut donc lui appliquer la définition du déterminant de l'endomorphisme f pour le système de vecteurs défini par $u_i = g(e_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n))) = \det(f) \cdot \det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n))$$

► On rappelle que la définition énonce que pour une forme n -linéaire alternée φ et un endomorphisme f , on a $\varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \det(f) \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$ pour tout système de vecteurs $(u_1, \dots, u_n)$. En appliquant cette relation à la forme $\det_{\mathcal{B}}$ et au système de vecteurs $u_i = g(e_i)$, on trouve l'égalité ci-dessus.

En reconnaissant dans le terme de droite la définition du déterminant de l'endomorphisme g exprimé dans la base $\mathcal{B}$, soit $\det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n)) = \det(g)$, l'égalité se simplifie immédiatement par substitution scalaire :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g)$$

■

✓ Propriété 18 (Déterminant de l'inverse)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. L'endomorphisme f est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$f \in \text{GL}(E) \iff \det(f) \neq 0_{\mathbb{K}}$$

Dans ce cas, le déterminant de son inverse est l'inverse de son déterminant :

$$\det(f^{-1}) = (\det(f))^{-1}$$

Q Preuve

L'inversibilité de f équivaut au fait que f soit un automorphisme de E . On procède par équivalences successives en utilisant les propriétés des systèmes géométriques :

$$\begin{aligned} f \text{ est inversible} &\iff f \text{ est un automorphisme de } E \\ &\iff \text{l'image de la base } \mathcal{B}, \text{ notée } f(\mathcal{B}), \text{ est une base de } E \\ &\iff \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B})) \neq 0_{\mathbb{K}} \\ &\iff \det(f) \neq 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

Ce qui démontre le premier point.

Pour établir la formule du déterminant de l'inverse, on suppose f inversible. Il existe donc $f^{-1} \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f^{-1} = \text{id}_E$. En prenant le déterminant de cette égalité et en appliquant la propriété de composition démontrée ci-dessus :

$$\det(f \circ f^{-1}) = \det(\text{id}_E) \implies \det(f) \cdot \det(f^{-1}) = 1$$

Le déterminant étant un élément d'un corps commutatif, on isole le terme recherché :

$$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)} = (\det(f))^{-1}$$

■

Exercice 5

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E tel que $u^2 + \text{id}_E = 0$. Montrer que n est pair.

On résout cet exercice en appliquant la propriété du déterminant d'une composée à l'endomorphisme $u^2 = -\text{id}_E$:

$$\begin{aligned}\det(u^2) &= \det(-\text{id}_E) \\ \det(u)^2 &= (-1)^n \cdot \det(\text{id}_E) \\ \det(u)^2 &= (-1)^n\end{aligned}$$

Comme $\det(u)^2$ est un carré (donc positif), il est nécessaire que $(-1)^n$ soit lui aussi positif, ce qui n'est possible que si n est pair.

Exercices d'assimilation

Encore une fois, cette section ne fait pas partie du cours “officiel”. Tous ces exercices sont faciles et servent juste à appliquer les propriétés qu'on vient de démontrer.

Exercice 6 (*Endomorphismes nilpotents*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit f un endomorphisme nilpotent de E . En utilisant les propriétés du déterminant d'une composée, déterminer la valeur de $\det(f)$. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ un autre endomorphisme de E . Déterminer la valeur du déterminant de la composée $f \circ g$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ l'indice de nilpotence de f , impliquant $f^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Par morphisme du déterminant sur la composition, on obtient :

$$\det(f^k) = \left(\det(f)\right)^k = \det(0_{\mathcal{L}(E)})$$

L'endomorphisme nul s'identifiant à l'homothétie $0_{\mathbb{K}} \cdot \text{id}_E$ dans un espace de dimension $n \geq 1$, son déterminant s'annule : $\det(0_{\mathcal{L}(E)}) = 0_{\mathbb{K}}^n = 0_{\mathbb{K}}$. L'équation devient :

$$\left(\det(f)\right)^k = 0_{\mathbb{K}}$$

$\mathbb{K}$ étant un corps, il est aussi un anneau intègre dénué de diviseur de zéro. D'où :

$$\det(f) = 0_{\mathbb{K}}$$

2. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$. On conclut immédiatement :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}} \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

Exercice 7 (*Relation d'anti-commutation en dimension impaire*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ où n est un nombre impair, et où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ deux endomorphismes de E qui anti-commutent, c'est-à-dire qui vérifient la relation :

$$f \circ g = -g \circ f$$

Démontrer qu'au moins l'un des deux endomorphismes f ou g n'est pas inversible.

Par utilisation directe du déterminant sur la relation de l'énoncé, on a :

$$\det(f \circ g) = \det(-g \circ f)$$

En utilisant la formule du déterminant d'une composition d'opérateurs, le membre de gauche se développe en $\det(f) \cdot \det(g)$.

L'endomorphisme $-g$ situé dans le membre de droite s'identifie à l'homothétie $(-1) \cdot g$. En appliquant la propriété du déterminant d'une homothétie dans un espace de dimension n , on extrait le signe : $\det(-g) = (-1)^n \cdot \det(g)$. n étant impair selon l'énoncé, on a $(-1)^n = -1$, ce qui donne $\det(-g \circ f) = -\det(g) \cdot \det(f)$. L'équation s'écrit alors :

$$\det(f) \cdot \det(g) = -\det(g) \cdot \det(f)$$

Par commutativité de la multiplication dans le corps $\mathbb{K}$, on regroupe les deux produits dans le membre de gauche :

$$2 \cdot \det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

La caractéristique du corps $\mathbb{K}$ étant différente de 2, on peut donc simplifier l'égalité : $\det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$. Enfin, l'intégrité du corps $\mathbb{K}$ implique que :

$$\det(f) = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

On conclut qu'au moins l'un des deux endomorphismes f ou g n'est pas inversible.

Exercice 8 (*Caractérisation des valeurs propres*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$$\lambda \in \mathbb{K} \text{ est une valeur propre de } f \iff \det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$$

$\implies$ Supposons que λ soit une valeur propre de f . Par définition, il existe un vecteur non nul $x \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $f(x) = \lambda x$. Cette égalité se réécrit de manière équivalente :

$$(f - \lambda \cdot \text{id}_E)(x) = 0_E$$

Le vecteur x étant non nul, cela prouve que le noyau de $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est pas trivial ($\ker(f - \lambda \cdot \text{id}_E) \neq \{0_E\}$). L'endomorphisme n'est donc pas injectif. La non-injectivité équivaut à la non-inversibilité (non-bijectivité) de l'opérateur. On en déduit que :

$$\det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$$

$\impliedby$ Réciproquement, supposons que $\det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$. Cette nullité implique directement que l'endomorphisme $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est pas inversible dans $\mathcal{L}(E)$. Comme E est de dimension finie, un endomorphisme $\in \mathcal{L}(E)$ est inversible si et seulement s'il est injectif. Par contraposition, $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est donc pas injectif. Son noyau contient par conséquent au moins un vecteur non nul :

$$\exists x \in E \setminus \{0_E\}, \quad x \in \ker(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$$

Par définition du noyau, cela se traduit par $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)(x) = 0_E$, soit :

$$f(x) = \lambda x$$

L'existence de ce vecteur $x \neq 0_E$ implique que λ est une valeur propre de f .

5 Déterminant d'une matrice

5.1 Notions de base

Définition 13

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à A (i.e. : $\text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(u) = A$ où $\mathcal{B}_c$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$). Le déterminant de la matrice A est défini par :

$$\det(A) = \det(u) = \det_{\mathcal{B}_c}(u(e_1), \dots, u(e_n))$$

avec $\mathcal{B}_c = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Remarque 8

1. Soient $c_1, \dots, c_n$ les colonnes de la matrice A . Par définition de l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice, on a $u(e_i) = c_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par conséquent, le déterminant de la matrice A correspond au déterminant de la famille de ses colonnes exprimée dans la base canonique :

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}_c}(c_1, \dots, c_n)$$

2. Si $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, alors :

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k} \end{aligned}$$

**Exemple 22**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

**Propriété 19**

Le déterminant d'une matrice ne change pas s'il on ajoute à une colonne une combinaison linéaire d'autres colonnes.

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall (\lambda_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathbb{K}^{n-1}, \det(c_1, \dots, c_i + \sum_{1 \leq j \leq n} \lambda_j c_j, \dots, c_n) = \det(c_1, \dots, c_i, \dots, c_n)$$

$$c_i \leftarrow c_i + \sum_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \lambda_j c_j \text{ laisse le déterminant invariant}$$

**Preuve**

recop is eternal

**Propriété 20**

Une permutation σ appliquée sur les colonnes d'une matrice multiplie le déterminant par le signe de la permutation :

$$\forall \sigma \in S_n, \det(c_{\sigma(1)}, \dots, c_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det(c_1, \dots, c_n)$$

**Propriété 21**

Les propriétés du déterminant d'un endomorphisme s'appliquent également au déterminant d'une matrice. En particulier, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

1. $\det(I_n) = 1$ où I_n est la matrice identité de taille n .
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \det(\lambda A) = \lambda^n \cdot \det(A)$
3. $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(B) \cdot \det(A) = \det(BA)$
4. A est inversible $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ si et seulement si $\det(A) \neq 0_{\mathbb{K}}$. Dans ce cas, $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

✓ **Propriété 22 (Déterminant d'une transposée)**

Le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det({}^t A) = \det(A)$$

Q **Preuve**

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Par définition du déterminant d'une matrice, on a :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

En effectuant le changement de variable $\tau = \sigma^{-1}$, on trouve :

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\tau \in S_n} \varepsilon(\tau^{-1}) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\tau^{-1}(k),k} \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \varepsilon(\tau) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,\tau(k)} \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \varepsilon(\tau) \cdot \prod_{k=1}^n ({}^t A)_{\tau(k),k} = \det({}^t A) \end{aligned}$$

■

Le lemme suivant sera utilisé pour démontrer une propriété importante du déterminant d'une matrice triangulaire.

★ **Théorème 3 (Lemme)**

Soit $\sigma \in S_n$ une permutation.

$$\sigma(k) \leq k \text{ pour tout } k \in \llbracket 1, n \rrbracket \implies \sigma = \text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$$

Q **Preuve**

On procède par récurrence sur n .

► L'initialisation est triviale pour $n = 2$.

► **Hérédité :**

- ▷ Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On suppose que $\forall k \in \llbracket 1, i \rrbracket, \sigma(k) = k$. On montre que $\sigma(i+1) = i+1$.
- ▷ On a $\sigma(i+1) \leq i+1$. D'après l'hypothèse de récurrence, on a $\sigma(i+1) \notin \{1, \dots, i\}$, ce qui implique $\sigma(i+1) = i+1$ (sachant que σ est une bijection).
- ▷ Donc $\sigma(k) = k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit $\sigma = \text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$.

■

✓ **Propriété 23** (*Déterminant d'une matrice triangulaire*)

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux.

$$\forall A \in T_{n,s}(\mathbb{K}) \text{ ou } T_{n,i}(\mathbb{K}) \text{ telle que } A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, \det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Q **Preuve**

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure (on traite uniquement ce cas pour l'instant). Par définition du déterminant d'une matrice, on a :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Or, les éléments situés en dessous de la diagonale de A sont nuls. Par conséquent, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) > k$ pour au moins un indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ s'annule.

$$\exists k_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(k_0) > k_0 \implies \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k} = 0_{\mathbb{K}} \text{ sachant que } \forall i > j, a_{i,j} = 0$$

En revanche, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) \leq k$ pour tout indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ correspond au produit des éléments diagonaux de A . En appliquant le lemme démontré ci-dessus, on trouve que la seule permutation qui contribue à la somme est l'identité. L'égalité se simplifie alors en :

$$\det(A) = \varepsilon(\text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,k} = 1 \cdot \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Comme une matrice triangulaire inférieure n'est que la transposée d'une matrice triangulaire supérieure, on conclut que la même formule s'applique également aux matrices triangulaires inférieures, car :

$$\det(A) = \det({}^t A) = \prod_{i=1}^n ({}^t A)_{i,i} = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

■

✎ **Exemple 23** (*Matrice carrée quelconque*)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On a donc :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

En utilisant la formule du déterminant d'un système de trois vecteurs (déjà établie, développement de Saros), on trouve :

$$\det(A) = 7 - (9 - 4) = 2 \neq 0$$

On en déduit aussi que :

$$A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$$

Exemple 24

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}_c}(c_1, \dots, c_n)$$

Or, les colonnes de A sont les vecteurs de la base canonique dans un ordre différent. En appliquant la propriété du déterminant d'une permutation sur les colonnes, on trouve :

$$\det(A) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c)$$

où σ est la permutation qui envoie i sur $i + 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$ et qui envoie n sur 1. On peut l'expliciter comme suit, sous forme d'un cycle de longueur n :

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n)$$

σ est une permutation de signature $(-1)^{n-1}$, ce qui donne :

$$\det(A) = (-1)^{n-1} \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c)$$

Or, il a été établi à la section précédente que $\det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c) = 1$. L'égalité se simplifie alors en :

$$\det(A) = (-1)^{n-1} \neq 0$$

On en déduit aussi que $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

On note cette matrice $A = P_\sigma$. C'est la matrice de la permutation σ dans la base canonique.

absolument
pas
sûr
de ce
que
j'ai
écrit
ici

Remarque 9

Pour $A_1, \dots, A_r \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$\det(A_1 \cdots A_r) = \det(A_1) \cdots \det(A_r)$$

$$\det\left(\prod_{i=1}^r A_i\right) = \prod_{i=1}^r \det(A_i)$$

Remarque 10

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice nilpotente, alors $\det(A) = 0_{\mathbb{K}}$ et A n'est pas inversible.

Remarque 11

Si $M \in \mathcal{M}_n$ est une matrice antisymétrique de taille n où n est impair, alors $\det(M) = 0_{\mathbb{K}}$ et M n'est pas inversible.

Q Preuve

En effet, $\det(M) = \det({}^t M) = \det(-M) = (-1)^n \cdot \det(M)$. n étant impair, on a $(-1)^n = -1$, ce qui donne $\det(M) = -\det(M)$, soit $\det(M) = 0_{\mathbb{K}}$. ■

On rappelle qu'une matrice antisymétrique de taille n est une matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ telle que $m_{j,i} = -m_{i,j}$ pour tout $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.

5.2 Mineur, cofacteur et comatrice

Dans les trois définitions suivantes, $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice carrée de taille n , et le couple $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ est un indice de ligne et de colonne.

Définition 14 (Mineur)

Le **mineur** de A associé à (i,j) est le déterminant de la matrice carrée de taille $n-1$ obtenue à partir de A en supprimant la ligne i et la colonne j . On le note $\Delta_{i,j}$.

$$\Delta_{i,j} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Définition 15 (Cofacteur)

Le **cofacteur** de A associé à (i, j) est le scalaire noté :

$$A_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{i,j}$$

Définition 16

On appelle la comatrice de A la matrice carrée de taille n dont les éléments sont les cofacteurs de A :

$$\text{Com}(A) = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$$



Exemple 25