

01

Algèbre générale



WORK IN PROGRESS

Ce document est incomplet ou en révision. Certaines sections peuvent faire l'objet de modifications.

AUTEUR

Samy Youssoufine

DERNIÈRE MISE À JOUR

17 septembre 2026

DÉPÔT PRINCIPAL

maths2.txt.ma

LIEN MIROIR (SECOURS)

samy-y.github.io/maths-cpi2a

Table des matières

1 Algèbre engendrée par un élément	2
---	----------

1 Algèbre engendrée par un élément

Définition 1

(Algèbre)

$(E, +, \cdot, \times)$ est dite une $\mathbb{K}$ -algèbre si :

1. $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
2. $(E, +, \times)$ est un anneau.
3. L'application "produit" $f : E \times E \rightarrow E$ définie par $(x, y) \mapsto xy$ est bilinéaire. Après calculs, on obtient que pour tout $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:
 - (a) $(\lambda x)y = \lambda(xy)$
 - (b) $x(\lambda y) = \lambda(xy)$

Si l'anneau $(E, +, \times)$ est commutatif (resp. intègre), alors l'algèbre $(E, +, \cdot, \times)$ est dite commutative (resp. intègre).

Attention !

Un anneau est par définition unitaire.

Remarque

(Justification de la simplification)

Par définition, le produit est bilinéaire si et seulement si pour tous $x, y \in E$, les applications partielles $L_x : z \mapsto xz$ et $R_y : z \mapsto zy$ sont linéaires.

Or, l'additivité de ces applications partielles est déjà garantie par la structure d'anneau de $(E, +, \times)$ via la distributivité :

$$(x_1 + x_2)y = x_1y + x_2y \quad \text{et} \quad x(y_1 + y_2) = xy_1 + xy_2$$

Une application additive ($\forall x, y \in E, \varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$) entre espaces vectoriels étant linéaire si et seulement si elle est homogène ($\forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda z) = \lambda\varphi(z)$), la bilinéarité se ramène strictement aux deux conditions d'homogénéité :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad (\lambda x)y = \lambda(xy) = x(\lambda y)$$

Méthode

(Détails des calculs)

On rappelle que la bilinéarité de f signifie que pour tout $x, x', y, y' \in E$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$:

1. $f(x + x', y) = f(x, y) + f(x', y)$
2. $f(x, y + y') = f(x, y) + f(x, y')$

En utilisant les propriétés de l'anneau $(E, +, \times)$, on peut montrer que ces deux conditions sont équivalentes à celles mentionnés dans la définition.

Exemple 1

1. **Algèbre des matrices** : $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot, \times)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre non commutative et non intègre si $n \geq 2$. En effet, $E_{1,1} \times E_{1,2} = E_{1,2}$ mais $E_{1,2} \times E_{1,1} = 0$.
2. **Algèbre des endomorphismes** : $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre non commutative et non intègre si $\dim E \geq 2$. En effet, $\mathcal{L}(E)$ est isomorphe à $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $n = \dim E$. Son élément unité est l'application identité id_E .
3. **Algèbre des polynômes** : $(\mathbb{K}[X], +, \cdot, \times)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre commutative et intègre. Son élément unité est le polynôme constant $1 \in \mathbb{K}[X]$. Utiliser la loi rond $\circ$ au lieu de $\times$ n'est pas possible parce que la distributivité n'est pas conservée; les polynômes ne sont pas des applications linéaires.
4. **Algèbre des applications de I vers $\mathbb{R}$** : $(\mathbb{R}^I, +, \cdot, \times)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre avec $x+y : t \mapsto x(t) + y(t)$ et $xy : t \mapsto x(t)y(t)$. Son élément unité est l'application $1_{\mathbb{R}^I} : t \mapsto 1$ de $I \rightarrow \mathbb{R}$. Il s'agit d'une algèbre commutative mais non intègre (même en se restreignant à des applications continues!). En effet, en posant $x(t) = t + |t|$ et $y(t) = t - |t|$ (non nulles), on trouve que $xy = t^2 - |t|^2 = 0$.

Définition 2**(Sous-algèbre)**

Soit E une $\mathbb{K}$ -algèbre.

S est dite **sous-algèbre** de E si S est un sous-espace vectoriel de E et un sous-anneau de E .

Propriété 1

S est une sous-algèbre de E si et seulement si :

1. $1_E \in S$
2. $\forall x, y \in S, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \begin{cases} \lambda x + y \in S \\ xy \in S \end{cases}$

Démonstration. Le sens direct découle immédiatement de la définition d'une sous-algèbre unitaire. Réciproquement, supposons ces conditions vérifiées :

- Comme $1_E \in S$, la partie S est non vide. La stabilité par combinaisons linéaires ($\lambda x + y \in S$) en fait donc un sous-espace vectoriel de $(E, +, \cdot)$.
- Cette structure vectorielle garantit déjà la stabilité par soustraction (pour $\lambda = -1$), ce qui assure que $(S, +)$ est un sous-groupe additif. En y ajoutant la stabilité par produit ($xy \in S$) et la présence de l'unité ($1_E \in S$), S est également un sous-anneau de $(E, +, \times)$.

Les propriétés d'associativité et de bilinéarité étant automatiquement conservées par restriction, S hérite de la structure d'algèbre unitaire. $\square$

Exemple 2

$T_n^s(\mathbb{K})$ (l'ensemble des matrices triangulaires supérieures) est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En effet : $x \in T_n^s(\mathbb{K}) \iff \forall i > j, x_{i,j} = 0$. On peut alors retrouver les conditions de caractérisation d'une sous-algèbre :

1. I_n est diagonale donc triangulaire supérieure.
2. — Si $i > j$, on a $(xy)_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}y_{kj}$. Dans le cas où $i \leq k$ et $k \leq j$, on aura $i \leq j$ ce qui est absurde. Donc $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $i > k$ ou $k > j$, c'est-à-dire $x_{ik} = 0$ ou $y_{kj} = 0$. Par suite,

- $x_{ik}y_{kj} = 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et donc $(xy)_{ij} = 0$ pour tout $i > j$.
 — La stabilité est vérifiée et donc $xy \in T_n^s(\mathbb{K})$.

Définition 3**(Morphisme d'algèbres)**

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -algèbres. Une application $f : E \rightarrow F$ est dite un morphisme d'algèbres si :

1. $\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$ et $f(xy) = f(x)f(y)$
2. $f(1_E) = 1_F$

Remarque

Si S est une sous-algèbre de E , alors $u(S)$ est une sous-algèbre de F , en particulier pour $S = E$. Alors $\text{Im}(u) = u(E)$ est une sous-algèbre de F . En revanche, ce n'est pas vrai pour le noyau $\text{Ker}(u)$, qui est un sous-espace vectoriel de E mais jamais un sous-anneau parce qu'il ne contient pas l'élément unité 1_E (car $f(1_E) = 1_F \neq 0$). Néanmoins, le noyau a une structure d'idéal de E ; il est absorbant car $\forall x \in E, \forall y \in \text{Ker}(u), xy \in \text{Ker}(u)$.

En résumé :

1. $\text{Im}(u)$ est une sous-algèbre de F .
2. $\text{Ker}(u)$ est un idéal de E . C'est aussi un idéal bilatère de E , c'est-à-dire que $E \times \text{ker}(u) \subset \text{ker}(u)$, $\text{ker}(u) \times E \subset \text{ker}(u)$ et $(\text{ker}(u), +)$ est un sous-groupe de $(E, +)$.

Exemple 3

Soit E une $\mathbb{K}$ -algèbre, $a \in E$, et $f : \mathbb{K}[X] \rightarrow E$ l'application définie par $f(P) = P(a)$ avec $P(a) = \sum_{k=1}^n \lambda_k a^k + \lambda_0 \cdot 1_E$. Alors f est un morphisme d'algèbres. En effet, pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

1. $f(\lambda P + Q) = (\lambda P + Q)(a) = \lambda P(a) + Q(a) = \lambda f(P) + f(Q)$
2. $f(PQ) = (PQ)(a) = P(a)Q(a) = f(P)f(Q)$
3. $f(1_{\mathbb{K}[X]}) = 1_{\mathbb{K}[X]}(a) = 1_E$

En conséquence, $\text{Im}(f) = \{P(a) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ est une sous-algèbre de E engendrée par l'élément a . On la note $\mathbb{K}[a]$. Il s'agit aussi de la plus petite sous-algèbre de E contenant a .

Propriété 2

$\mathbb{K}[a] = \{P(a) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ est la plus petite sous-algèbre de E contenant a .

Démonstration. L'ensemble $\mathbb{K}[a]$ est une sous-algèbre de E (image de $\mathbb{K}[X]$ par le morphisme d'évaluation) et contient $a = X(a)$.

Soit S une sous-algèbre de E contenant a . Comme S est un sous-anneau unitaire, $a^0 = 1_E \in S$, puis par stabilité sous le produit, $a^k \in S$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. S étant également un sous-espace vectoriel, il est stable par combinaisons linéaires : pour tout $P = \sum_{k=0}^n \lambda_k X^k \in \mathbb{K}[X]$, on a $P(a) = \sum_{k=0}^n \lambda_k a^k \in S$.

On en déduit l'inclusion $\mathbb{K}[a] \subset S$, ce qui établit que $\mathbb{K}[a]$ est la plus petite sous-algèbre de E contenant a . $\square$

Exemple 4

Soient $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. On pose :

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \mid (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect} \left(I_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

Montrons que $\mathbb{R}[A] = S$.

1. Inclusion $\mathbb{R}[A] \subset S$: Le polynôme caractéristique de A donne la relation annulatrice :

$$A^2 - \text{tr}(A)A + \det(A)I_2 = A^2 - 2A - 3I_2 = 0$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la division euclidienne de X^n par $P(X) = X^2 - 2X - 3 = (X+1)(X-3)$ s'écrit :

$$X^n = Q(X)P(X) + a_nX + b_n$$

En évaluant en $X = -1$ et $X = 3$, on obtient :

$$\begin{cases} (-1)^n = -a_n + b_n \\ 3^n = 3a_n + b_n \end{cases} \iff \begin{cases} a_n = \frac{1}{4}(3^n - (-1)^n) \\ b_n = \frac{1}{4}(3^n + 3(-1)^n) \end{cases}$$

Comme $P(A) = 0$, il vient :

$$A^n = a_nA + b_nI_2 = \begin{pmatrix} a_n + b_n & 2a_n \\ 2a_n & a_n + b_n \end{pmatrix} \in S$$

S étant un sous-espace vectoriel stable par combinaison linéaire, pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$, $Q(A) = \sum \lambda_k A^k \in S$. Donc $\mathbb{R}[A] \subset S$.

2. Inclusion $S \subset \mathbb{R}[A]$: Soit $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \in S$. On cherche $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $M = xI_2 + yA$:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y & 2y \\ 2y & x+y \end{pmatrix} \iff \begin{cases} y = \frac{\beta}{2} \\ x = \alpha - \frac{\beta}{2} \end{cases}$$

Le système admet toujours une solution, d'où $M \in \text{Vect}(I_2, A) \subset \mathbb{R}[A]$, ce qui donne $S \subset \mathbb{R}[A]$.

On conclut que $\mathbb{R}[A] = S$.

Remarque

(Méthode alternative pour A^n via le binôme de Newton)

En posant $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, on remarque que $B^2 = I_2$ et $A = I_2 + 2B$. Comme I_2 et B commutent, la formule du binôme assure l'existence de scalaires (α_n, β_n) tels que :

$$A^n = (I_2 + 2B)^n = \alpha_n I_2 + \beta_n B = \begin{pmatrix} \alpha_n & \beta_n \\ \beta_n & \alpha_n \end{pmatrix} \in S$$

Dans l'exemple précédent, on peut simplifier les expressions de α_n et β_n trouvées. En effet, nous avons seulement utilisé le fait que la matrice $B^2 = I_2$. On peut aussi prendre $B = I_2$ pour que les

calculs précédents donnent $A = I_2 + 2I_2 = 3I_2$ et au final obtenir $3^n I_2 = \alpha_n I_2 + \beta_n I_2 = (\alpha_n + \beta_n) I_2$. Par conséquent, on obtient $\alpha_n + \beta_n = 3^n$.

On pourrait aussi prendre la matrice $B = -I_2$ pour retrouver $B^2 = I_2$ et obtenir $(-1)^n I_2 = \alpha_n I_2 - \beta_n I_2 = (\alpha_n - \beta_n) I_2$. Par conséquent, on obtient $\alpha_n - \beta_n = (-1)^n$. En résolvant le système d'équations obtenu :

$$\begin{cases} \alpha_n + \beta_n = 3^n \\ \alpha_n - \beta_n = (-1)^n \end{cases}$$

On trouve $\alpha_n = \frac{3^n + (-1)^n}{2}$ et $\beta_n = \frac{3^n - (-1)^n}{2}$. Ces expressions peuvent être différentes selon la base (A, B) choisie, mais on retrouve la même expression pour A^n .

Rappel

Un idéal I de $\mathbb{K}[X]$ est soit nul soit engendré par un polynôme unitaire P de $\mathbb{K}[X]$. En effet, si $I \neq \{0\}$, on peut choisir un polynôme $P \in I$ de degré minimal (via double-inclusion dont un sens est démontré par division euclidienne) pour montrer que $I = P_0 \mathbb{K}[X]$.

Propriété 3

(Étude de dimension)

Soit $a \in E$. L'ensemble $I_a = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(a) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, appelé l'idéal annulateur de a . Deux cas disjoints se présentent :

1. Si $I_a = \{0\}$, le morphisme d'évaluation induit un isomorphisme $\mathbb{K}[X] \simeq \mathbb{K}[a]$. La famille $(a^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[a]$ et $\dim(\mathbb{K}[a]) = \infty$.
2. Si $I_a \neq \{0\}$, il existe un unique polynôme unitaire $\pi_a \in \mathbb{K}[X]$, appelé polynôme minimal de a , tel que :

$$I_a = \pi_a \mathbb{K}[X], \quad \text{c'est-à-dire} \quad P(a) = 0 \iff \pi_a \mid P$$

En posant $d = \deg(\pi_a)$, la famille $(1_E, a, a^2, \dots, a^{d-1})$ est une base de $\mathbb{K}[a]$, et $\dim(\mathbb{K}[a]) = d$.

Démonstration. Considérons le morphisme d'algèbres $f : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[a]$ défini par $P \mapsto P(a)$, surjectif par définition, de noyau $\ker(f) = I_a$.

1. Cas $I_a = \{0\}$: L'application f est injective, donc est un isomorphisme d'espaces vectoriels. L'image de la base canonique $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}[X]$ par cet isomorphisme est $(f(X^k))_{k \in \mathbb{N}} = (a^k)_{k \in \mathbb{N}}$, qui constitue ainsi une base de $\mathbb{K}[a]$. En particulier, $\dim(\mathbb{K}[a]) = \infty$.

2. Cas $I_a \neq \{0\}$: L'anneau $\mathbb{K}[X]$ étant principal, l'idéal non nul I_a admet un unique générateur unitaire noté π_a , de degré minimal $d = \deg(\pi_a) \geq 1$. Montrons que $\mathcal{B} = (1_E, a, \dots, a^{d-1})$ est une base de $\mathbb{K}[a]$:

- **Liberté :** Soit $(\lambda_0, \dots, \lambda_{d-1}) \in \mathbb{K}^d$ tel que $\sum_{k=0}^{d-1} \lambda_k a^k = 0$. Le polynôme $Q = \sum_{k=0}^{d-1} \lambda_k X^k$ vérifie $Q(a) = 0$, donc $Q \in I_a$, d'où $\pi_a \mid Q$. Or, $\deg(Q) \leq d-1 < \deg(\pi_a)$, ce qui impose $Q = 0$, et par identification $\lambda_0 = \dots = \lambda_{d-1} = 0$. La famille est libre.
- **Génération :** Pour tout $x \in \mathbb{K}[a]$, il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $x = P(a)$. La division euclidienne de P par π_a donne $P = Q\pi_a + R$ avec $\deg(R) < d$. Comme $\pi_a(a) = 0$, on en déduit :

$$x = P(a) = Q(a)\pi_a(a) + R(a) = R(a) \in \text{Vect}(1_E, a, \dots, a^{d-1})$$

La famille $(1_E, a, \dots, a^{d-1})$ est libre et génératrice, c'est donc une base de $\mathbb{K}[a]$, d'où $\dim(\mathbb{K}[a]) = d$. $\square$

À RECOPIER

Exemple 5

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $n \geq 2$.

Un calcul direct donne $A^2 = nA$, c'est-à-dire $A^2 - nA = 0$. Le polynôme $P(X) = X(X - n)$ est donc annulateur de A , d'où :

$$\pi_A \mid X(X - n) \implies \pi_A \in \{1, X, X - n, X(X - n)\}$$

On élimine les diviseurs stricts :

- $\pi_A \neq 1$ car $1(A) = I_n \neq 0$.
- $\pi_A \neq X$ car $A \neq 0$.
- $\pi_A \neq X - n$ car $A \neq nI_n$ (pour $n \geq 2$).

On en déduit que $\pi_A = X^2 - nX$. Par conséquent, $\deg(\pi_A) = 2$, la famille (I_n, A) forme une base de $\mathbb{R}[A]$ et $\dim(\mathbb{R}[A]) = 2$.

Exercice 1

$u \in \mathcal{L}(E)$ avec $2 \leq \dim(E) < \infty$ tel que $\text{rg}(u) = 1$. Montrer que $\Pi_u = X^2 - \text{Tr}(u)X$.

Correction

À RECOPIER

Remarque

Le degré d'un polynôme minimal π_a vaut 1 si et seulement si la famille $(1_E, a)$ est liée, c'est-à-dire si et seulement si a est un multiple scalaire de l'élément unité 1_E (homothétie).

Dans ce cas, le polynôme minimal est $\pi_a = X - \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $a = \lambda 1_E$.

Dans le cas contraire où $a \neq \lambda 1_E$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, le polynôme minimal π_a est de degré $d \geq 2$ et la famille $(1_E, a)$ est libre. On résout alors $a^2 = \lambda_0 1_E + \lambda_1 a$ pour voir si elle admet des solutions pour $\lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{K}$. Si c'est le cas, on obtient $\pi_a = X^2 - \lambda_1 X - \lambda_0$ et $\dim(\mathbb{K}[a]) = 2$. Sinon, on continue avec a^3 et ainsi de suite **jusqu'à trouver un polynôme annulateur minimal**.

En effet, il faut trouver le plus petit $d \geq 1$ tel que $a^d \in \text{Vect}(1_E, a, \dots, a^{d-1})$. Le polynôme minimal π_a est alors de degré d et la famille $(1_E, a, \dots, a^{d-1})$ est une base de $\mathbb{K}[a]$, car $a^d = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i a^i$ implique $\pi_a = X^d - \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i X^i$.

Exemple 6

Prenons $E = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Soit $a = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Calculons π_a .

On a $a \neq \lambda I_3$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, donc $\deg(\pi_a) \geq 2$. On calcule :

$$a^2 = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 12 \\ -6 & 7 & -12 \\ 6 & -6 & 13 \end{pmatrix},$$

On cherche $\lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{R}$ tels que $a^2 = \lambda_1 a + \lambda_0 I_3$. En comparant les coefficients, on obtient le système :

$$\begin{cases} 7 = 2\lambda_1 + \lambda_0 \\ -6 = -\lambda_1 \\ 12 = 2\lambda_1 \\ -6 = -\lambda_1 \\ 7 = 2\lambda_1 + \lambda_0 \\ -12 = -2\lambda_1 \\ 6 = \lambda_1 \\ -6 = -\lambda_1 \\ 13 = 3\lambda_1 + \lambda_0 \end{cases}$$

Donc $\lambda_1 = 6$ et $\lambda_0 = -5$. Ainsi, $a^2 = 6a - 5I_3$, et le polynôme minimal est $\pi_a(X) = X^2 - 6X + 5$. La dimension de $\mathbb{R}[a]$ est donc 2, et une base est donnée par (I_3, a) .

Remarque

Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$, alors on peut considérer que $\mathbb{L}$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre. En particulier, $\mathbb{C}$ est une $\mathbb{R}$ -algèbre et $\mathbb{R}$ est une $\mathbb{Q}$ -algèbre.

Exercice 2

Prenons $E = \mathbb{R}$ une $\mathbb{Q}$ -algèbre (ce qui est possible car $\mathbb{Q}$ est un sous-anneau et un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}$)

Soit $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$.

Montrer que le polynôme minimal π_a existe et donner son expression.

Correction

On doit construire un polynôme dont les racines sont $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ mais à coefficients rationnels. On a :

$$\begin{aligned} a = \sqrt{2} + \sqrt{3} &\implies (a - \sqrt{2})^2 = 3 \\ &\implies a^2 - 2a\sqrt{2} + 2 = 3 \\ &\implies a^2 - 1 = 2a\sqrt{2} \\ &\implies (a^2 - 1)^2 = 8a^2 \end{aligned}$$

On en déduit que le polynôme $P(X) = (X^2 - 1)^2 - 8X^2 = X^4 - 10X^2 + 1$ est annulateur de a .

On a $P \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0\}$ (et il est annulateur), donc π_a existe et $\pi_a \mid P$.

Vérifions pour le cas $\deg \pi_a = 1$. On vérifie si P admet des racines dans $\mathbb{Q}$. Si $\frac{p}{q}$ est une racine de P avec $p \wedge q = 1$, alors $p \mid a_0 = 1$ et $q \mid a_4$ (résultat démontré en TD), donc $p \mid 1$ et $q \mid 1$, ce qui implique que $\frac{p}{q} = \pm 1$. Or, $P(\pm 1) = 1 - 10 + 1 = -8 \neq 0$, donc P n'admet pas de racines rationnelles. Par conséquent, $\deg \pi_a \geq 2$.

Si $\pi_a = D_1 D_2$ et $\deg D_1 = 3$, alors D_1 admet une racine rationnelle $\frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$. Par le même raisonnement que précédemment, on obtient que $\frac{p}{q} = \pm 1$, ce qui est impossible car $P(\pm 1) \neq 0$. Donc $\deg D_1 \neq 3$ et $\deg \pi_a \neq 3$.

On en déduit que $\deg \pi_a \in \{2, 4\}$.

Supposons par absurde que $\deg \pi_a = 2$. Cela implique que :

$$\pi_a(X) = (X - a)(X - b)$$

avec $a = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$.

On a aussi $P(-X) = P(X)$, donc $-a$ est racine de P . Donc les racines de P sont $\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ et $-\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$.

Dans le cas où $b = -a$: On a $\pi_a(X) = (X - a)(X + a) = X^2 - a^2$. Or, $a^2 = 5 + 2\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$, donc $\pi_a \notin \mathbb{Q}[X]$ ce qui est absurde. Donc $b \neq -a$. Donc $\pi_a \neq X^2 - a^2$.

Dans le cas où $b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$: On a $\pi_a(X) = (X - a)(X - b) = X^2 - (a + b)X + ab$. Or, $a + b = 2\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$, donc $\pi_a \notin \mathbb{Q}[X]$ ce qui est absurde. Donc $b \neq \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

Dans le cas où $b = \sqrt{2} - \sqrt{3}$: On a $\pi_a(X) = (X - a)(X - b) = X^2 - (a + b)X + ab$. Or, $a + b = 2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, donc $\pi_a \notin \mathbb{Q}[X]$ ce qui est absurde. Donc $b \neq \sqrt{2} - \sqrt{3}$.

Donc $\pi_a \neq X^2 - (a + b)X + ab$ pour $b \in \{-a, \sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2} - \sqrt{3}\}$.

On en déduit que $\deg \pi_a \neq 2$.

Donc $\pi_a = P = X^4 - 10X^2 + 1$.



Note

La division euclidienne est conservée dans $\mathbb{Q}[X]$ et même dans n'importe quel corps $\mathbb{K}$ (pour justifier la division $\pi_a = D_1 D_2$).