

---

# He comido fuera y me encuentro mal, ¿qué hago?

*Protocolo de actuación para cuando comer fuera no ha ido bien*

Comer fuera es uno de los momentos que más angustia genera cuando estás trabajando tu digestión. Pierdes el control sobre los ingredientes, los aceites, las cantidades, la forma de cocinar... Y cuando encima te sienta mal, la frustración puede ser enorme. **Comer fuera no es el enemigo. Y que te haya sentado mal no significa que hayas arruinado el proceso.**

## Lo que puedes hacer ahora mismo

### 1. No te castigues ni entres en pánico

Una comida fuera que no ha ido bien no es un fracaso ni un retroceso. Es una parte del proceso. Tu cuerpo sigue trabajando.

### 2. Hidrátate bien

Bebe agua a pequeños sorbos durante el resto del día. Si tienes hinchazón o pesadez, una infusión de jengibre o menta puede ayudarte a aliviar la molestia.

### 3. Descansa y dale espacio a tu cuerpo

No fuerces ninguna actividad intensa. Si puedes, da un paseo suave. El movimiento ligero ayuda al tránsito y reduce la sensación de pesadez.

### 4. No compenses con restricción

Puede que tengas la tentación de saltarte la siguiente comida o de comer muy poco. No lo hagas. La compensación solo genera más desregulación.

### 5. Aplica calor si hay dolor o espasmos

Una bolsa de agua caliente en el abdomen puede aliviar los espasmos y la tensión digestiva. También puedes hacer unas respiraciones diafragmáticas para ayudar a relajar el sistema digestivo.

### 6. Si tienes suplementación pautada, sigue tomándola

No la interrumpas por haber tenido un mal día. Si tienes dudas sobre si tomar algo extra, escíbeme.

### 7. Escucha a tu cuerpo en la siguiente comida

Si no tienes hambre, no te fuerces. A veces dar un pequeño descanso digestivo y esperar a tener hambre real es lo mejor que puedes hacer. Cuando vuelvas a comer, vuelve a tu rutina habitual.

## Cuando estés mejor: entiende qué ha pasado

No siempre va a ser posible saber exactamente qué te ha sentado mal. Pero sí puedes reflexionar sobre algunos factores que suelen influir:

- **El tipo de cocción.** Los fritos, rebozados o salteados con mucho aceite son más difíciles de digerir.
- **Las salsas y aderezos.** Suelen llevar ingredientes que no conocemos: grasa de mala calidad, lácteos, azúcares, aditivos.
- **El alcohol.** Irrita la mucosa digestiva y altera la microbiota. Si tomaste alcohol, eso puede explicar gran parte del malestar.
- **El ritmo y el contexto.** Comer rápido, con tensión o en un entorno con mucho ruido también afecta a la digestión.
- **La cantidad.** Las raciones fuera de casa suelen ser mayores. Comer por encima de la saciedad puede generar pesadez aunque los alimentos sean adecuados.
- **El momento del proceso.** Si llevas poco tiempo trabajando tu digestión, tu tolerancia todavía es más sensible. Eso no es para siempre.

## Al día siguiente

Vuelve a tu rutina habitual. Sin culpas y sin compensaciones.

- Comidas normales, siguiendo tu pauta.
- Hidratación adecuada.
- Si tienes estreñimiento, aplica el protocolo de estreñimiento que tienes en tus materiales.
- Anota cómo te has sentido mal si recuerdas los detalles: qué comiste, cómo estaba cocinado, si tomaste alcohol, cómo fue el ritmo de la comida. Eso nos va a ayudar en la próxima revisión.

## Cuándo escribirme

- Tienes fiebre, vómitos o dolor agudo.
- Llevas más de 48 horas sin encontrarte bien.
- No sabes si lo que comiste podía ser problemático para tu caso.

*Comer fuera no es el enemigo. Es una parte de la vida que también vamos a aprender a gestionar juntas. 🌿*