

Me he hinchado mucho, ¿qué hago?

Protocolo de actuación para momentos de hinchazón intensa

Hay días en los que la hinchazón aparece de golpe y la sensación puede ser muy incómoda, y también muy frustrante, especialmente si sientes que estabas haciendo todo bien. Este protocolo está pensado para esos momentos: para que no te quedes paralizada sin saber qué hacer y para que entiendas que la hinchazón, aunque molesta, tiene una explicación y tiene solución. **Una hinchazón puntual no significa que hayas retrocedido ni que el proceso no funcione.**

Lo que puedes hacer ahora mismo

1. Para y no fuerces la digestión

Si acabas de comer, no hagas esfuerzos físicos intensos. Quédate tranquila, a ser posible sentada o dando un paseo suave. El movimiento ligero, caminar 10-15 minutos, ayuda a activar el tránsito y a liberar gases acumulados.

2. Aplica calor en el abdomen

Una bolsa de agua caliente o una almohadilla térmica sobre el abdomen ayuda a relajar la musculatura intestinal y reduce la sensación de presión y dolor. Úsala entre 15 y 20 minutos.

3. Prueba el masaje abdominal

Realiza movimientos circulares suaves con la palma de la mano siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Empieza por la parte inferior derecha, sube, cruza y baja. Házelo despacio, sin presionar en exceso, durante 5-10 minutos.

4. Infusión digestiva templada

Una infusión templada de menta, jengibre, hinojo o manzanilla puede ayudar a relajar el tracto digestivo y aliviar la sensación de presión. Bébelas despacio. Evita las bebidas muy frías o con gas en este momento.

5. Respira con el diafragma

La respiración diafragmática activa el sistema nervioso parasimpático y ayuda a relajar la musculatura abdominal. Inspira lentamente por la nariz llevando el aire hacia el abdomen, mantén 2 segundos y suelta despacio por la boca. Repite 6-8 veces.

6. Escucha a tu cuerpo en la siguiente comida

Si no tienes hambre, no te fuerces. A veces dar un pequeño descanso digestivo y esperar a tener hambre real es lo mejor que puedes hacer. Cuando vuelvas a comer, vuelve a tu rutina habitual.

Luego, cuando estés mejor: entiende qué ha pasado

La hinchazón no aparece por casualidad. Tiene una causa y entenderla es parte del proceso. Estos son los desencadenantes más frecuentes:

- **Has comido demasiado rápido o sin masticar bien.** Tragar rápido significa tragar también más aire y menos digestión en boca. El estómago y el intestino tienen que trabajar mucho más.
- **Has comido en un momento de estrés o tensión.** Si comiste con el cuerpo activado, la digestión no habrá ido bien independientemente de lo que hayas comido.
- **Algún alimento ha desencadenado la reacción.** No significa que esté prohibido para siempre. Significa que en este momento tu digestión no está preparada para procesarlo bien. Anótalo para que lo revisemos juntas.
- **Has dormido mal o llevas días con el cuerpo muy cargado.** El descanso afecta directamente a la motilidad intestinal y a la respuesta inflamatoria.
- **Has picado entre comidas y el intestino no ha tenido tiempo de hacer su limpieza.** El complejo migratorio motor solo funciona cuando el intestino lleva un tiempo vacío.
- **Has estado muy sedentaria ese día.** El movimiento activa el tránsito intestinal. Un día muy parado puede provocar acumulación de gases.

Sobre la suplementación

Si tienes suplementación indicada en tu plan, puedes utilizarla según las pautas que te he dado. Si tienes dudas sobre si algo te puede ayudar en este momento, escíbeme.

Cuándo escribirme

- La hinchazón es muy intensa y no mejora pasadas unas horas.
- Va acompañada de dolor agudo, fiebre o vómitos.
- Llevas varios días seguidos así sin mejoría.
- No sabes identificar qué puede haberla desencadenado.

Una hinchazón puntual no es un retroceso. Es información. Y cuanto más la entendemos, mejor podemos trabajarla. 🌿