pra frente, CIÊNCIA: RS em foco! 7 - 9 . NOV . 2024
MTC 2024 MOSTRA TÉCNICO-CIENTÍFICA
ANOS Construindo Saberes
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

Eficiência comparativa de micro-organismos e fungicida químico no controle de Antracnose em Uvas

Henrique Miguel Weschenfelder[1]; Marcus André Kurtz Almança[1*]; Gabriel Augusto Luft[1]; Taís Gireli[1]; Valentina Brandt Ludwig[1]; Frantchesca Sperotto Glanert[1];

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) -

O agente causal da Antracnose na videira, *Elsinoe Ampelina*, é umas das mais importantes doenças da cultura da videira, principalmente, em regiões de alta umidade do ar. A presença do fungo está relacionada a temperaturas entre 20 e 26°C em ambientes com umidade do ar saturada. O período de brotação é o período mais vulnerável da planta, uma vez que o fungo há favorabilidade por tecidos jovens, causando sinais de deformação e escurecimento nas brotações e até em ramos e cachos, comprometendo assim o desenvolvimento e qualidade da uva. Tradicionalmente, o controle do agente causal é feito com fungicidas químicos, porém essa técnica pode gerar malefícios ao ecossistema local. Com isso, a importância do trabalho é buscar um manejo mais sustentável da doença. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do controle do confronto direto entre fungicidas microbiológicos e fitopatógeno *in vitro*. Essa pesquisa foi executada no Laboratório de Fitopatologia do IFRS - BG. O ensaio foi realizado em placas de petri, após serem devidamente marcadas para a medição diária do fitopatógeno. O meio de cultura utilizado foi ágar batata e dextrose (BDA), e os fungicidas foram homogeneamente adicionados, e após, a introdução do fungo de Antracnose, a partir de uma fonte de inóculo de 7 mm. Foram usados os seguintes agente de controle biológico: (1) Bacillus amyloliquefaciens cepa D-747 (Bacilo-X®), (2) Bacillus amyloliquefaciens CCT 7901 (isolado do produto Pardella®) (3) Bacillus amyloliquefaciens + Bacillus pumilus + Bacillus subtilis (produto em desenvolvimento); (4) Trichoderma asperellum URM 8120 e (5) Trichoderma asperellum URM 8119; além de duas testemunhas (6) e (7) e um tratamento controle (8) Ditianona (Delan® - fungicida químico). As placas foram incubadas em BOD a uma temperatura de 26º C, e foram feitas medições diárias até a colonização total da testemunha na placa de petri. A análise estatística considerou a análise de variância e teste de tukey a 5%. Os resultados do experimento contrastam os seguintes valores para o fungicida químico (8) com 100% de controle, enquanto (1) se destacou com controle de 74,07%, e ainda é estatisticamente semelhante ao (4 e 5) com eficiência de 73,07% e 72,17%, respectivamente. Além disso, (5 e 2) são iguais, segundo o teste de médias, sendo (2) 60,89% de controle, e ainda (2) é equivalente a (3) com controle de 60,38% e as testemunhas (6 e 7) não obtiveram controle. Conclui-se que em alguma medida todos os produtos são eficientes no controle do fitopatógeno, sendo que a cepa presente no produto comercial Bacilo-X® foi o microrganismo que mais se aproximou do controle do fungicida químico. Contudo, todos os produtos testados podem ser empregados no manejo integrado de doenças de videiras, a fim de mitigar o impacto ambiental do uso constante de fungicidas químicos.

Palavras-chave: Videira; Controle Biológico; Sustentável;

Trabalho executado com recursos do Edital PROPPI Nº 19/2023 - DE FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2024 / Programa de Fomento à Pesquisa e à Inovação do IFRS da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação/ do *Campus* Bento Gonçalves.

CC BY