OCORRÊNCIA DA FERRUGEM DA VIDEIRA (*PHAKOPSORA EUVITIS*) EM CULTIVARES DE UVAS PARA PROCESSAMENTO NA REGIÃO NOROESTE DE SÃO PAULO

Rosemeire de Lellis Naves[(1)]; Reginaldo Teodoro de Souza[(1)]; Marco Antônio Fonseca Conceição[(1)]; Mara Fernandes Moura[(2)]; Marco Antonio Tecchio[(3)]

[(1)] Embrapa Uva e Vinho. [(2)] Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Frutas, Instituto Agronômico - IAC. [(3)] Departamento de Produção Vegetal/Horticultura, Faculdade de Ciências Agronômicas - UNESP.

Entre as doenças fúngicas da videira, a ferrugem, causada por *Phakopsora euvitis*, pode comprometer a produção quantitativa e qualitativa de uvas em todas as regiões do Brasil. O objetivo deste trabalho foi monitorar, no campo, a ocorrência da ferrugem da videira em cultivares de uva para processamento na região noroeste de São Paulo, a fim de subsidiar a tomada de decisão quanto ao intervalo de aplicação de fungicidas para o controle dessa doença em cada cultivar. Durante os ciclos vegetativos de formação de ramos de 2021 e o de produção de 2022, em videiras conduzidas no sistema de espaldeira na área experimental do Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais do Instituto Agronômico, Votuporanga, São Paulo, a severidade da ferrugem, expressa pela porcentagem da área foliar afetada (AFA), foi avaliada semanalmente utilizando-se escala diagramática. Foram avaliadas quatro cultivares copa (IAC 138-22 'Máximo', 'BRS Carmem', 'BRS Cora' e 'Isabel Precoce') enxertadas em dois porta-enxertos ('IAC 766' e 'IAC 572'), totalizando oito tratamentos com cinco repetições, sendo cada parcela constituída por quatro plantas e as avaliações realizadas nas duas plantas centrais de cada parcela. A severidade média máxima da ferrugem observada nas folhas da 'BRS Carmem' (9% de AFA), foi significativamente menor ($P \leq 0,05$) que a observada nas demais cultivares (19,5%, 23% e 26% de AFA na 'Máximo', 'Isabel Precoce e 'BRS Cora', respectivamente) as quais não se diferenciaram entre si. A interação entre as cultivares copa e os porta-enxertos não foi significativa, não havendo, também, diferença entre a severidade da doença observada nas copas sobre os dois porta-enxertos. Considerando que, em regiões tropicais, o controle de doenças representa cerca de 30% dos custos de produção, a 'BRS Carmem' é uma alternativa para o cultivo de uvas para processamento nessas regiões com menor número de pulverizações, redução dos impactos ambientais e maior viabilidade econômica da viticultura.

Palavras-chave: *Vitis* sp.; 'BRS Carmem'; resistência a doenças

Apoio institucional: Instituto Agronômico (IAC)