

Práctica: CAPÍTULO 1 - MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1. ¿Verdadero o falso?
 - a) Si A^2 está definida, entonces A es necesariamente una matriz cuadrada.
 - b) Si AB y BA están definidas, entonces A y B son matrices cuadradas.
 - c) Si AB y BA están definidas, entonces AB y BA son matrices cuadradas.
 - d) Si $AB = B$, entonces $A = I$.
2. Consideramos las matrices A, B, C, D y E . Supongamos que los productos AB y CDE están bien definidos. Sin realizar de manera explícita dichos productos, ¿qué productos de matrices podría realizar si sólo se quiere conocer
 - a) la tercera columna de AB ?
 - b) la primera fila de AB ?
 - c) el elemento en la fila 3, columna 4 de AB ?
 - d) la entrada de la fila 1, columna 1 de CDE ?
3. Encontrar ejemplos de matrices de orden 2 tales que:
 - a) $A^2 = -I$, con A matriz de entradas reales.
 - b) $B^2 = \mathbf{0}$, con $B \neq \mathbf{0}$.
 - c) $CD = -DC$ y $CD \neq \mathbf{0}$.
 - d) $EF = \mathbf{0}$ y ninguna de las dos matrices tiene entradas nulas.
4. Determinar la veracidad de las siguientes afirmaciones. Justificar.
 - a) Si la primera y la tercera columna de B son iguales, también lo son la primera y la tercera columna de AB .
 - b) Si la primera y la tercera fila de B son iguales, también lo son la primera y la tercera fila de AB .
 - c) Si la primera y la tercera fila de A son iguales, también lo son la primera y la tercera fila de AB .
 - d) Sean A y B matrices de tamaño $n \times n$, entonces $(AB)^2 = A^2B^2$.

5. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- a) Escribir la primer fila de AB como combinación lineal de las filas de B .
 - b) Escribir la primer columna de AB como combinación lineal de las columnas de A .
6. Dada A una matriz $m \times n$ y B una matriz $n \times p$, definimos $T_i = A^i B_i$, para todo $i = 1, \dots, n$.
- a) ¿Qué dimensión tiene T_i , para todo $i = 1, \dots, n$?
 - b) Probar que

$$AB = \sum_{i=1}^n T_i.$$

7. Sea A una matriz de tamaño $n \times p$ y $B = E_{ij}(\ell)A$. Probar que para todo $i \neq j$ y $k = 1, \dots, n$, $B_k = A_k$ si $k \neq i$ y además, $B_i = A_i + \ell A_j$ si $k = i$.
8. Probar que $E_{ij}(\ell)E_{kj}(t) = E_{kj}(t)E_{ij}(\ell)$.
9. Probar que la inversa de la matriz $E_{ij}(\ell)$ es $E_{ij}(-\ell)$.

10. Sean P_{ij} la matriz de permutación simple de tamaño $n \times n$ que se obtiene al intercambiar las filas i y j de I y A , una matriz $n \times p$. Probar que $P_{ij}A$ es la matriz $n \times p$ que se obtiene intercambiando las filas i y j de A .

Sugerencia: Si e_k es el vector canónico de \mathbb{R}^n con un 1 en la entrada k , probar que $e_k A = A_k$ y recordar que si la fila k de $P_{ij}A$ es el producto de la fila k de $E_{ij}(\ell)$ por A .

11. Probar que si P es una matriz de permutación $n \times n$ y A es una matriz $n \times p$, entonces PA es la matriz $n \times p$ obtenida al permutar las filas de A de la misma manera que se permutan las filas de I para obtener P .

Sugerencia: Usar lo hecho para producto por matrices de permutación simple.

12. En cada ítem, encontrar la matriz C que transforma A en B , es decir, C tal que $CA = B$.

$$a) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 5 \\ 1 & 4 & -7 \\ 3 & -1 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & -1 & 6 \end{bmatrix}.$$

$$b) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0 & -5 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -5 & 9 \end{bmatrix}.$$

$$c) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 8 \\ 4 & -1 & 3 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 8 \\ 0 & 7 & -1 & -6 \end{bmatrix}.$$

$$d) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & -3 & 9 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

13. Sean

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & c & 1 \end{bmatrix}.$$

Obtener EF , FE y E^2 utilizando las propiedades de las matrices elementales.

14. Resolver los siguientes sistemas utilizando eliminación gaussiana e identificar las matrices de eliminación y/o permutación utilizadas en cada caso.

$$a) \quad \begin{cases} x_2 + 4x_3 = -5 \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = -2 \\ 3x_1 + 7x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases} \quad b) \quad \begin{cases} x_1 - 3x_2 = -4 \\ 3x_1 - 7x_2 + 7x_3 = -8 \\ -4x_1 + 6x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

$$c) \quad \begin{cases} x_1 - 3x_2 = 5 \\ -x_1 + x_2 + 5x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad d) \quad \begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -2 \\ -2x_1 - 8x_2 + 3x_3 = 32 \\ x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

15. Determinar los valores de a y b para los cuáles la matriz A es no singular siendo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ a & 8 & 3 \\ 0 & b & 3 \end{bmatrix}$$

16. Considere el sistema de ecuaciones $Ax = b$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 7 \\ 6 & 9 & 8 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Resolver el sistema y hallar la factorización LU de A .

17. Probar que la descomposición LU y LDV de una matriz A invertible, es única.

18. a) Resolver el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 2x_4 = 6 \\ 3x_2 + 3x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 7x_4 = 8 \\ 6x_3 + 5x_4 = -4 \end{cases}$$

b) Si A es la matriz de coeficientes del sistema anterior, resolver el sistema $Ax = \tilde{b}$ para los casos $\tilde{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\text{y } \tilde{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

c) ¿Existe \tilde{b} tal que el sistema $Ax = \tilde{b}$ no tiene solución única?

19. Encontrar los factores L, D, U para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 7 \\ 6 & 9 & 8 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Resolver el sistema } A^T x = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

20. Encontrar P tal que PA admite una factorización LDV y mostrar tal factorización.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

21. Sea $A = \begin{bmatrix} E \\ I \end{bmatrix}$, donde E es una matriz de tamaño $m \times n$ e I es la matriz identidad de tamaño $n \times n$.

¿Existe B tal que $AB = I$?

22. Hallar la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -3 & 9 & \frac{1}{3} \\ 6 & 1 & 3 & \frac{1}{9} & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

23. Encontrar cuando sea posible, las matrices inversas de las matrices de coeficientes del ejercicio 14., utilizando el método de Gauss-Jordan.

24. Sean A y B matrices inversibles. Probar que A^{-1} y AB son inversibles con $(A^{-1})^{-1} = A$ y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

25. Sean A y B matrices tales que A es inversible y B es no inversible. ¿Puede ser AB inversible?

26. Sean P_{ij} la matriz de permutación simple de tamaño $n \times n$ que se obtiene al intercambiar las filas i y j de I . Probar que:

a) P_{ij} es simétrica.

b) $(P_{ij})^{-1} = P_{ij}$.

c) Para toda matriz de permutación, su inversa es su transpuesta.

27. Probar que si A es simétrica $n \times n$, $(A_i)^T = A^i$ para todo $i = 1, \dots, n$.

28. Sea R una matriz $m \times n$. Probar que RR^T y $R^T R$ son simétricas.

Sugerencia: Recordar que $(AB)_{ij} = A_i B^j$.

EJERCICIOS ADICIONALES

- Exhibir la matriz M de orden 3 tal que, para toda matriz A de orden 3, MA que produce los siguientes cambios en A :
 - suma 5 veces la fila 1 a la fila 2.
 - suma -7 veces la fila 2 a la fila 3.
 - intercambia las filas 1 y 2, y luego las filas 2 y 3.

- Utilizando las propiedades de las matrices de permutación y matrices elementales, obtener los siguientes productos de matrices:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

- Una matriz “noroeste” tiene ceros por abajo de la antidiagonal que va de $(1, n)$ a $(n, 1)$ mientras que una matriz “sureste” tiene ceros por encima de dicha antidiagonal. Si una matriz *noroeste* A se multiplica por una matriz *sureste* B , ¿qué tipo de matrices son AB y BA ?
- Sean

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Verificar que $Ax = 0$. ¿Existen otros vectores x que verifiquen dicha igualdad?

- Sean A y B matrices de tamaño 3×3 . Determinar la única matriz B que verifica, para toda matriz A :
 - $BA = 4A$.
 - $BA = 4B$.
 - BA tiene intercambiadas las columnas 1 y 3 de A y la fila 2 sin cambios.
 - Todas las filas de BA son iguales a la fila 1 de A .
- Resolver los siguientes problemas:
 - X es dos veces más viejo que Y y la suma de la edad de ambos es igual a 39. Encontrar X e Y .
 - $(x, y) = (2, 5)$ y $(3, 7)$ están en la recta $y = mx + c$. Encontrar m y c .
 - La parábola $y = a + bx + cx^2$ pasa por los puntos $(x, y) = (1, 4)$, $(2, 8)$ and $(3, 14)$. Encontrar (a, b, c) .
- Determinar las matrices que llevan la siguiente matriz A a su forma triangular U

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Calcular la matriz $E = E_{32}E_{31}E_{21}$ que realiza todos los pasos de la eliminación $EA = U$.

- Encontrar la matriz inversa de

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -b & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$