

Práctica: CAPÍTULO 2 - ESPACIOS VECTORIALES (cuarta parte)

- Sea  $\mathcal{B}_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$  una base para un espacio vectorial  $V$ .
  - Demstrar que  $\mathcal{B}_2 = \{v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3\}$  también es una base.
  - Hallar la matriz de cambio de base  $M$  de  $\mathcal{B}_2$  a  $\mathcal{B}_1$ .
- Sean  $\mathcal{B}_1 = \{(1, 3), (-2, -2)\}$  y  $\mathcal{B}_2 = \{(-12, 0), (-4, 4)\}$  dos bases de  $\mathbb{R}^2$ .
  - Determinar la matriz de cambio de base  $M_1$  de  $\mathcal{B}_1$  a  $\mathcal{B}_2$ .
  - Determinar la matriz de cambio de base  $M_2$  de  $\mathcal{B}_2$  a  $\mathcal{B}_1$ .
  - ¿Qué relación existe entre  $M_1$  y  $M_2$ ?
  - Dado  $x = (2, -1)$  en la base  $\mathcal{B}_2$ , determinar las coordenadas de  $x$  en la base  $\mathcal{B}_1$ .
- Sea  $V = \left\{ \sum_{i=0}^2 a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R} \right\}$  y  $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$  base estándar de  $V$ .
  - Probar que  $\mathcal{B}_2 = \{x - 1, 1, (x - 1)^2\}$  es otra base de  $V$ .
  - Hallar la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_1$  a  $\mathcal{B}_2$ .
  - Utilizar lo obtenido en el ítem anterior y determinar la coordenadas de  $p$  en la base  $\mathcal{B}_2$  siendo  $p(x) = 2x^2 - 5x + 6$ . ¿Cuáles son las coordenadas de  $p$  en la base  $\{1, (x - 1)^2, x - 1\}$ ?
- Hallar la matriz de cambio de base de:
  - la base canónica de  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ,  $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ , a la base  $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \right\}$ .  
Determinar las coordenadas de  $A$  en la base  $\mathcal{B}'$  para  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  una matriz cualquiera.
  - la base  $\{1, x, -1 + 2x^2, -3x + 4x^3\}$  de  $\mathbb{R}_3[x]$  a la base  $\{1, -\frac{1}{2} + x, -x + x^2, \frac{1}{4} - \frac{3}{2}x^2 + x^3\}$ .
- Sea  $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$  la base canónica de  $\mathbb{R}^2$  y  $A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ . ¿Existe una base  $\mathcal{B}'$  tal que  $A$  es la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$ ? De existir, hallar dicha base.
- Sea  $V$  un espacio vectorial y  $\mathcal{B}_{1,2}$  dos bases ordenadas de  $V$ . Entonces, para todo  $v \in V$ ,  $[v]_{\mathcal{B}_1}$  es la solución de un sistema  $Ax = b$  donde  $b = [v]_{\mathcal{B}_2}$  y  $A$  es la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_1$  a  $\mathcal{B}_2$ .
- Para cada una de las siguientes funciones  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  determinar si se trata de una transformación lineal y en caso afirmativo: obtener  $N(T)$  y  $\text{Rec}(T)$ , calcular su dimensión y determinar si  $T$  es inversible.
  - $T((x, y)) = (y, x)$ .
  - $T((x, y)) = (x^2, y^2)$ .
  - $T((x, y)) = (x, -y)$ .
  - $T((x, y)) = (x, 0)$ .

Observación:

$$N(T) = \{x \in \text{Dom}(T) : T(x) = 0\}.$$

$$\text{rec}(T) = \{y \in \text{Codom}(T) : T(x) = y \text{ para algún } x \in \text{Dom}(T)\}.$$

- Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales. Sea  $T_1$  la transformación nula de  $V$  en  $W$  y  $T_2$  la transformación identidad de  $V$  en  $V$ . Probar que  $T_1$  y  $T_2$  son transformaciones lineales.
- Definimos  $I : C(\mathbb{R}) \rightarrow C(\mathbb{R})$  tal que  $I(f)(x) = \int_0^x f(t) dt$  e  $I_a^b : C(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $I_a^b(f)(x) = \int_a^b f(x) dx$ .  
Probar que  $I$  y  $I_a^b$  son transformaciones lineales.

10. Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales sobre  $\mathbb{K}$  y  $\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \rightarrow W : T \text{ transformación lineal}\}$ . Probar que para  $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(V, W)$ :

- a)  $\{v \in V : T_1(v) = T_2(v)\} \underset{s.e.}{\subset} V$ .  
b) Si  $V = \langle U \rangle$  y  $T_1(u) = T_2(u), \forall u \in U$ , entonces  $T_1(v) = T_2(v), \forall v \in V$ .

11. Consideramos la aplicación  $T$  definida por:

$$T : \begin{matrix} \mathbb{R}^{2 \times 2} & \rightarrow & \mathbb{R}_3[x] \\ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} & \mapsto & T \left( \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) \end{matrix} = 2dx^3 + (a+b)x^2 + (a-c)x + 2(c+d).$$

- a) Probar que  $T$  es lineal.  
b) Hallar una base para  $N(T)$  y una para  $Rec(T)$ .  
c) Determinar si  $T$  es un isomorfismo.  
12. Sea  $T_w : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} / T_w(z) = z + w\bar{z}$ , donde  $w = a + ib$  para  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $\mathbb{C}$  son los números complejos vistos como un espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$ .  
a) Considerar  $w = 1 + i$  y calcular  $T_w(2 + 3i)$ .  
b) Comprobar que  $T_w$  es una transformación lineal entre espacios vectoriales.  
c) Si  $B = \{1, i\}$  es base de  $\mathbb{C}$ , hallar la matriz de  $T_w$  en dicha base.  
d) Probar que  $T_w$  es isomorfismo si y solo si  $a^2 + b^2 \neq 1$ .

13. Sea  $V = \mathbb{R}^n$ , fijamos la base canónica  $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ . Para cada  $T_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  hallar  $A_i$  tal que  $A_i x = T_i(x), \forall x \in \mathbb{R}^n, i = 1, \dots, 4$ .

- a)  $T_1(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}^n$ .  
b)  $T_2(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$ .  
c)  $T_3(x) = c \cdot x, c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n$ .  
d) Sean  $p, q$  enteros distintos entre 1 y  $n$  inclusive,

$$T_4(x) = y, \text{ donde } y = (y_k)_{k=1}^n \text{ con } y_k = \begin{cases} x_k & \text{para } k \neq p, \quad k \neq q \\ x_p & \text{para } k = q \\ x_q & \text{para } k = p \end{cases}$$

14. Sea  $T : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$  tal que  $T(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0 + a_1(x+1) + \dots + a_n(x+1)^n$ . Probar que  $T$  es isomorfismo.  
15. Sea  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  transformación lineal tal que

$$T((0, 0, 1)) = (2, 3, 5), \quad T((0, 1, 1)) = (1, 0, 0), \quad T((1, 1, 1)) = (0, 1, -1).$$

- a) Probar que con esta información es posible obtener  $T(v), \forall v \in \mathbb{R}^3$ .  
b) Determinar, fijada la base canónica en  $\mathbb{R}^3$ , la matriz de  $T$ .  
c) Utilizando el ítem anterior, obtener  $\dim(N(T))$  y  $rg(T) = \dim(Rec(T))$ .  
d) Determinar si  $T$  es inversible.  
16. Determinar, si existe, una transformación lineal  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  que verifique:  $T((1, -1, 1)) = (1, 0)$  y  $T((1, 1, 1)) = (0, 1)$ .  
17. Sea  $\mathbb{C}$  el espacio vectorial de los números complejos sobre  $\mathbb{R}$ , con las operaciones usuales. Describir explícitamente un isomorfismo de este espacio con  $\mathbb{R}^2$ .  
18. Mostrar que  $\mathbb{K}^{m \times n}$  es isomorfo a  $\mathbb{K}^{mn}$ .  
19. Sean  $V$  y  $W$  dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre  $\mathbb{K}$ . Probar que  $V$  y  $W$  son isomorfos si y solo si  $\dim V = \dim W$ .  
20. Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales y  $\mathcal{B}_1$  y  $\mathcal{B}_2$  bases de  $V$  y  $W$  respectivamente. Sea  $T : V \rightarrow W$  una transformación lineal y  $A_T$  la matriz asociada a  $T$  respecto a las bases  $\mathcal{B}_1$  y  $\mathcal{B}_2$ . Mostrar que, para todo  $v \in V$ ,  $[Tv]_{\mathcal{B}_2} = A_T[v]_{\mathcal{B}_1}$ .

21. Sea  $T$  la transformación lineal de  $\mathbb{R}^3$  en  $\mathbb{R}^2$  definida por

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, 2x_3 - x_1).$$

a) Si  $\mathcal{B}$  es la base ordenada canónica de  $\mathbb{R}^3$  y  $\mathcal{B}'$  es la base ordenada canónica de  $\mathbb{R}^2$ , determinar la matriz asociada a  $T$  relativa al par  $(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$ .

b) Si  $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (1, 0, 0)\}$  y  $\mathcal{B}' = \{(0, 1), (1, 0)\}$  ¿Cuál es la matriz asociada a  $T$  relativa a al par  $(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$ ?

22. Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita sobre  $\mathbb{K}$  y  $S, T \in \mathcal{L}(V)$ . Probar que,  $T \circ S$  es inversible si y solo si  $S$  y  $T$  son inversibles.

23. a) Encontrar la matriz asociada a la transformación lineal que resulta de la composición de las transformaciones lineales que representan la rotación de un vector en un ángulo de  $90^\circ$  y la proyección sobre el eje  $x$  (en ese orden).

b) Hallar la matriz que representa la proyección de un vector sobre el eje  $x$  seguida de la proyección de un vector sobre el eje  $y$ .

24. La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

produce una transformación llamada *esfuerzo constante*, que deja fijo al eje  $y$ . Hacer un bosquejo para indicar qué ocurre cuando se aplica dicha transformación a los vectores  $(1, 0)$ ,  $(2, 0)$  y  $(-1, 0)$ . ¿Cómo se transforma el eje  $x$ ?

25. a) Encontrar la *matriz de permutación cíclica*  $A$  de tamaño  $4 \times 4$  que transforma el vector  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$  en  $(x_2, x_3, x_4, x_1)$ .

b) ¿Cuál es la transformación asociada a  $A^2$ ?

c) Demostrar que  $A^3 = A^{-1}$ .

26. a) Encontrar la matriz  $A$  de tamaño  $4 \times 3$  que representa el *desplazamiento derecho* que transforma  $(x_1, x_2, x_3)$  en  $(0, x_1, x_2, x_3)$ .

b) Calcular la matriz  $B$  de tamaño  $3 \times 4$  que representa el *desplazamiento izquierdo* que transforma  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$  en  $(x_2, x_3, x_4)$ .

c) ¿Cuáles son los productos  $AB$  y  $BA$ ?

## EJERCICIOS ADICIONALES

1. a) Sea  $x = (-26, 32) \in \mathbb{R}^2$  en la base canónica. Encontrar la representación de  $x \in \mathbb{R}^2$  en la base  $\mathcal{B}' = \{(-6, 7), (4, -3)\}$ .

b) Sea  $x = (0, -20, 7, 15) \in \mathbb{R}^4$  en la canónica. Encontrar la representación de  $x \in \mathbb{R}^4$  en la base  $\mathcal{B}' = \{(9, -3, 15, 4), (3, 0, 0, 1), (0, -5, 6, 8), (3, -4, 2, -3)\}$ .

2. Determinar la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B} = \{(1, 3, 2), (2, -1, 2), (5, 6, 1)\}$  a  $\mathcal{B}' = \{e_1, e_2, e_3\}$ .

3. Consideremos la base canónica de  $V = \mathbb{R}^2$  dada por  $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$  y la transformación lineal  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  que aplica los vectores  $e_1$  y  $e_2$  como sigue:

$$T(e_1) = e_1 + e_2,$$

$$T(e_2) = 2 \cdot e_1 - e_2.$$

Obtener:

a)  $T(3 \cdot e_1 - 4 \cdot e_2)$  y  $T^2(3 \cdot e_1 - 4 \cdot e_2)$ ,

b) las matrices asociadas a  $T$  y  $T^2$  en la base  $\mathcal{B}$ ,

c)  $T(v), \forall v \in V$ .

4. Sean  $T_{1,2} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  tal que  $T_1((x, y, z)) = (x, y, 0)$  y  $T_2((x, y, z)) = (x, y, y)$ . Hallar  $T_1 \circ T_2$  y  $T_2 \circ T_1$ . Analizar si son epimorfismos, monomorfismos, isomorfismos o ninguna de ellas.
5. Sea  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  tal que  $T(v) = (x + y, x + z, \alpha(v))$ , donde  $v = (x, y, z)$  y  $\alpha : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ . Determinar, si es posible,  $\alpha$  de modo que  $T$  resulte lineal.
6. Una matriz  $n \times n$ ,  $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$  con entradas en  $\mathbb{C}$  tal que  $A = \overline{A}^t$ , i.e.  $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$ , para todos  $i, j = 1, \dots, n$ , se dice *Hermitiana*.

Sea  $W$  el conjunto de todas las matrices Hermitianas  $2 \times 2$ .

a) Verificar que  $W$  es un espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$ .

b) Verificar que la aplicación

$$(x, y, z, t) \mapsto \begin{bmatrix} t + x & y + iz \\ y - iz & t - x \end{bmatrix}$$

es un isomorfismo de  $\mathbb{R}^4$  en  $W$ .