

# Sección 7.5

## Polinomios de Taylor

## Ejercicio 12

Encuentre el polinomio de Maclaurin de grado  $n = 3$  para la función  $f(x) = \text{sen}(\pi x)$ .

Solución. Por definición, el polinomio de Maclaurin de grado 3 para  $f$  viene dado por:

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3$$

Dado que,

$$f(x) = \text{sen}(\pi x) \Rightarrow f(0) = 0.$$

$$f'(x) = \pi \cos(\pi x) \Rightarrow f'(0) = \pi.$$


$$f''(x) = -\pi^2 \text{sen}(\pi x) \Rightarrow f''(0) = 0.$$

$$f'''(x) = -\pi^3 \cos(\pi x) \Rightarrow f'''(0) = -\pi^3.$$

## Ejercicio 12

Por consiguiente,

$$P_3(x) = \pi x - \frac{\pi^3}{3!}x^3 = \pi x - \frac{\pi^3}{6}x^3$$



Cerca de  $(0,0)$  podemos emplear la gráfica de  $P_3$  para aproximar la gráfica de  $f(x) = \text{sen}(\pi x)$ . Al alejarnos del punto de expansión  $c = 0$ , la exactitud de aproximación disminuye.

## Ejercicio 14

Encuentre el polinomio de Maclaurin de grado  $n = 4$  para la función

$$f(x) = x^2 e^{-x}.$$

Solución. Por definición, el polinomio de Maclaurin de grado 4 para  $f$  viene dado por:

$$P_4(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4$$

Dado que,

$$f(x) = x^2 e^{-x} \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = (2x)e^{-x} + x^2(-e^{-x}) = (-x^2 + 2x)e^{-x} \Rightarrow f'(0) = 0$$

$$f''(x) = (-2x + 2)e^{-x} + (-x^2 + 2x)(-e^{-x}) =$$

$$= (x^2 - 4x + 2)e^{-x} \Rightarrow f''(0) = 2$$

$$f'''(x) = (2x - 4)e^{-x} + (x^2 - 4x + 2)(-e^{-x}) =$$

$$= (-x^2 + 6x - 6)e^{-x} \Rightarrow f'''(0) = -6$$


$$f^{(4)}(x) = (-2x + 6)e^{-x} + (-x^2 + 6x - 6)(-e^{-x}) =$$

$$= (x^2 - 8x + 12)e^{-x} \Rightarrow f^{(4)}(0) = 12$$

## Ejercicio 14

Por consiguiente,

$$P_4(x) = \frac{2}{2!}x^2 - \frac{6}{3!}x^3 + \frac{12}{4!}x^4 \Rightarrow P_4(x) = x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4$$



Cerca de  $(0,0)$ , podemos utilizar la gráfica de  $P_4$  para aproximar la gráfica de  $f(x) = x^2 e^{-x}$ .

## Ejercicio 23

Encuentre el polinomio de Taylor de grado 4 centrado en  $c = 1$  para  $f(x) = \ln x$ .

Solución. Por definición, el polinomio de Taylor de grado 4 para  $f$  en  $c = 1$  viene dado por:

$$P_4(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 + \frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4$$

Expandiendo alrededor de  $c = 1$  se obtiene lo siguiente,

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f(1) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(1) = 1$$

$$f''(x) = -x^{-2} \Rightarrow f''(1) = -1$$


$$f'''(x) = 2x^{-3} \Rightarrow f'''(1) = 2$$

$$f^{(4)}(x) = -6x^{-4} \Rightarrow f^{(4)}(1) = -6$$

## Ejercicio 23

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} P_4(x) &= (x-1) - \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}(x-1)^3 - \frac{6}{4!}(x-1)^4 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 \end{aligned}$$



Cerca de  $(1,0)$  podemos emplear la gráfica de  $P_4$  para aproximar la gráfica de  $f(x) = \ln x$ . Al alejarnos del punto de expansión  $c = 1$ , la exactitud de aproximación disminuye.

## Ejercicio 24

Encuentre el polinomio de Taylor de grado 2 centrado en  $c = \pi$  para  $f(x) = x^2 \cos x$ .

Solución. Por definición, el polinomio de Taylor de grado 2 para  $f$  en  $c = \pi$  viene dado por:

$$P_2(x) = f(\pi) + f'(\pi)(x - \pi) + \frac{f''(\pi)}{2!}(x - \pi)^2$$

Expandiendo alrededor de  $c = \pi$  se obtiene lo siguiente,

$$f(x) = x^2 \cos x \Rightarrow f(\pi) = -\pi^2$$

$$f'(x) = 2x \cos x - x^2 \sin x = x(2 \cos x - x \sin x) \Rightarrow f'(\pi) = -2\pi$$

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x + x(-2 \sin x - (\sin x + x \cos x)) \Rightarrow f''(\pi) = -2 + \pi^2$$

Por consiguiente,

$$P_2(x) = -\pi^2 - 2\pi(x - \pi) + \frac{-2 + \pi^2}{2}(x - \pi)^2$$



## Ejercicio 24

A continuación se ilustra la gráfica de  $f(x)$  con su polinomio de Taylor de grado 2 centrado en  $c = \pi$ .

