


Segundo examen parcial (15/06/2013)

	Nombre:	DNI:	Nro. hojas:
--	---------	------	-------------

Regularización

1. En el sistema de la figura, el bloque (m = 0,50 kg) comprime al resorte (k = 200 N/m) una distancia de 5 cm (posición a). El sistema se suelta desde el reposo. La energía mecánica se conserva. Calcule la velocidad del bloque en b, a 10 cm de a, si: 1.1. El bloque está ligado al resorte




- 1.2. El bloque no está ligado al resorte.
- **2**. La hélice de un molino comienza a girar cuando sopla viento (t = 0), y logra una velocidad de 72 rpm luego de dar 5 vueltas completas. Escriba la posición angular $\theta(t)$ de una de sus aspas, indicando cada uno de los parámetros de la ecuación (suponga aceleración constante).
- 3. Un vehículo de 1280 kg, a 40 km/h, colisiona con otro de 1430 kg que estaba estacionado, y ambos quedan unidos. Calcule la velocidad del muevo cuerpo.
- **4**. Una barra uniforme de 10 kg se encuentra en equilibrio pivotada a 1/8 del extremo izquierdo, y apoyada sobre una balanza a 1/4 del extremo derecho (ver figura). Indique la lectura de la balanza en kg.



Promoción

- **1.** Considere el ejercicio 1 de Regularización, con x = 0 en la posición de equilibrio, y x(t=0) = -5 cm. Escriba la ecuación x(t) que describe el movimiento del bloque, indicando el valor de cada parámetro, en ambos casos:
- 1.1. Bloque ligado al resorte.
- 1.2. Bloque no ligado al resorte (en este caso divida el dominio en dos partes: -5 cm $\le x < 0$; $x \ge 0$).
- **2.** Considere el ejercicio 2 de Regularización. Calcule el trabajo realizado por el viento para que el molino logre 72 rpm, si la hélice tiene tres aspas separadas 120°, simétricas, uniformes, de 15 m de longitud y 560 kg cada una.
- **3**. Considere el ejercicio 3 de Regularización. Demuestre que si los vehículos quedan unidos, la energía cinética final siempre será menor que la inicial.
- **4**. Una bola de billar de 165 g viaja a 2 m/s hacia la banda de la mesa, donde impacta formando un ángulo de 45°, y rebota elásticamente. Calcule la fuerza promedio (módulo, dirección y sentido) que hace la bola sobre la banda, si el contacto dura 18 ms. Realice un esquema con el sistema de referencia elegido.
- **5**. Tres monedas iguales están sobre una mesa (figura) donde pueden deslizar sin fricción. La moneda 1 se lanza con velocidad v_1 y colisiona de manera perfectamente elástica con la moneda 2 (en reposo con la 3). Indique cuáles de las situaciones propuestas a continuación **no** ocurren, y fundamente por qué. Luego del impacto:
- (a) las monedas 1 y 2 quedan en reposo y la 3 sale con velocidad v₁
- (b) la moneda 1 queda en reposo, mientras 2 y 3 salen con velocidad v₁/2.
- (c) las tres monedas salen con velocidad v₁/3.



- **6.** Un satélite de 17 kg deberá permanecer en una órbita geoestacionaria, es decir, siempre sobre una misma posición de la tierra, sobre el ecuador. Datos: $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \cdot Nm^2/kg^2$; $M_T = 5.97 \cdot 10^{24} \cdot kg$; $R_T = 6.4 \cdot 10^6 \cdot m$. Calcule: 6.1. La altura sobre la superficie de la tierra a la que debe posicionarse el satélite.
- 6.2. La energía mecánica del mismo.
- **7.** Considere una polea vertical (M = 2 kg, I = 10^{-2} kg m²) que rota sin fricción sostenida por un eje central. La polea tiene dos carreteles, de R₁ = 8 cm y R₂ = 12 cm, donde se enrollan hilos, en cuyos extremos actúan fuerzas constantes F₁ = F₂ = 3 N, como muestra la figura. Calcule la velocidad de cada hilo, 5 s después de que comienzan a actuar las fuerzas (desde el reposo).



Pricial 2 2013

R 2) $t_{1}=0$ $w_{0}=0$ $\theta=0$ $\theta=5$ yielts = 5-27 = 10 7 13d tz=3 Wz=721pm az=?

W= = W02 + 202 (0-00)

 $w_2 = 72 \text{ feV}$ $27700 \frac{1000}{605} = 7.54100 \frac{1}{5}$ $w_2^2 = 2000$

 $\frac{\alpha_{7} - W_{2}^{2}}{2\Theta} = \frac{(7,84100/s)^{2}}{207100} = \frac{56,852500/s^{2}}{207100}$

:. +(t)=+ Wozt + Lxzt (+(t) = 1 (0,905 rd,3) = 0,452 rd/s +

0/2 = 0,905 md/2

(0(8,335)=0,452130/52 (8,335)=31,36 M 1)d

Verticoción Wz= aztz "t2= W2 = 8,335

m=0,50kg k=200N & se conserva - No by fricción

- Sem=-0,05m Sem=0,05m

(a) (b)

(b)

(c)

(c)

(c)

(c)

(d)

(d)

 $k_1 = 0$ $U_1 = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} (200 N \cdot m) (0,0025 m) = 0,25 J$

 $K_z = \frac{1}{3}$ $V_z = \frac{1}{2}Kx^2 = 0.255$

0+0,255 =0,25 J + KZ

 $k_2 = \frac{1}{2} m v_1^2 = 0$: $v_2 = 0$

D El resorto solo ejerce fuerzo hosto x=0 (Equilibrio)

Ki + Ui = Ki No hay Ve porque de bloque no est lipado 1 KX2 = Vary2 mv2 = KX1

0+0, vz = \ (xx,2) = \ (200 N·m) (0,05m) = 1m/5 (0,05m)

