

Trabajo Práctico 6 - Formas canónicas elementales II

Santiago

1. Sea A una matriz tal que $A^2 = A$ pero $A \neq I, 0$.

(a) Hallar el polinomio minimal de A .

(b) Probar que A es semejante a la matriz diagonal $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donde $r = \text{Rg}(A)$.

2. Sea $T \in L(\mathbb{R}^4)$ tal que

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Probar que los únicos autovalores de T son 0 y 1, pero T no es una proyección.

(b) ¿Es diagonalizable T ?

(c) Sea S un operador diagonalizable que tiene como únicos autovalores al 0 y al 1 ¿Se puede afirmar que S es una proyección?

3. Probar que los siguientes operadores son proyecciones:

(a) $T : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ dado por $T(ax^2 + bx + c) = c$.

(b) $\text{diag} : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ dado por

$$(\text{diag}(A))_{ij} = \begin{cases} A_{ii} & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \text{para } i, j = 1, \dots, n.$$

4. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(la matriz del ejercicio 1 del TP 5) y supongamos que $A = [T]_{\mathcal{E}}$ para $T \in L(\mathbb{C}^3)$. Hallar tres subespacios no nulos de \mathbb{C}^3 que sean invariantes por T y tales que \mathbb{C}^3 se pueda escribir como suma directa de ellos.

5. (a) Descomponer a \mathbb{R}^3 como suma directa de subespacios W_1, W_2, W_3 .

(b) Hallar las proyecciones P_1, P_2, P_3 correspondientes a cada uno de los subespacios del inciso a, respectivamente.

(c) Hallar el polinomio minimal y el característico de $\sqrt{2}P_1 + \pi P_2 + 3P_3$.

(d) ¿Es $\sqrt{2}P_1 + \pi P_2 + 3P_3$ un operador diagonalizable? Hallar sus autovalores y autovalores correspondientes.

6. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

una representación matricial de $T \in L(\mathbb{C}^4)$ (pensando a \mathbb{C}^4 como \mathbb{C} -EV)

(a) Hallar el polinomio característico de T y el minimal. ¿Es T diagonalizable?

(b) Hallar dos subespacios de \mathbb{C}^4 que sean T -invariantes y tales que su suma directa sea \mathbb{C}^4 .

7. Sea $T \in L(\mathbb{R}^2)$ tal que

$$[T]_{\mathcal{E}} = A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(a) Probar que $W_1 = \overline{\{(1, 0)\}}$ es T -invariante.

(b) Probar que no existe un subespacio W_2 de \mathbb{R}^2 que sea T -invariante y que además $\mathbb{R}^2 = W_1 \oplus W_2$.

8. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

(a) Si $T \in L(\mathbb{R}^2)$ es tal que $[T]_{\mathcal{E}} = A$ ¿Existe algún subespacio propio de \mathbb{R}^2 que sea T -invariante?

(b) Si $S \in L(\mathbb{C}^2)$ (pensado a \mathbb{C}^2 como \mathbb{C} -EV), es tal que $[S]_{\mathcal{E}} = A$ ¿Existe algún subespacio propio de \mathbb{C}^2 que sea T -invariante?

9. Sean V un \mathbb{K} -EV y $T, S \in L(V)$.

(a) Sea W un subespacio de V que es invariante por T y S . Probar que W también es invariante por los operadores $T + S$ y $T \circ S$.

(b) Supongamos que $S \circ T = T \circ S$. Probar que si λ es un autovalor de T , entonces el autoespacio asociado a λ es S -invariante.

10. ¿Se puede afirmar que un operador lineal tiene como único autovalor al cero, el nilpotente?

11. Sea $N \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ tal que $N^2 = 0$. Probar que, o bien $N = 0$, o bien N es semejante a la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

12. Sea V un \mathbb{K} -EV tal que $\dim(V) = n$ y $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ es una base (ordenada) de V . Sea $T \in L(V)$ dado por

$$T(b_j) = \begin{cases} b_{j+1} & \text{si } j = 1, \dots, n-1 \\ 0 & \text{si } j = n \end{cases}$$

(a) Probar que el único autovalor de T es cero.

(b) Probar que T es nilpotente.

(c) ¿Cuánto vale la traza de T ? ¿Y el determinante?

13. Sea V un \mathbb{K} -EV tal que $\dim(V) = n$. Probar que si $N \in L(V)$ es nilpotente, entonces $p_N(x) = x^n$