

Álgebra lineal

Trabajo práctico N°7 - 2022

Descomposición cíclica y forma de Jordan

1. Considerar las transformaciones lineales $R_{\frac{\pi}{2}}$, S_Y , H_2 y P_X del ejercicio 11 de la práctica
2. Sea $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$ la base canónica de \mathbb{R}^2 .
 - a) Probar que $Z(e_1, R_{\frac{\pi}{2}}) = \mathbb{R}^2 = Z(e_2, R_{\frac{\pi}{2}})$.
 - b) Hallar $Z(e_1, S_Y)$ y $Z(e_2, S_Y)$.
 - c) Probar que H_2 no tiene vectores cíclicos.
 - d) Hallar $Z(e_1, P_X)$ y $Z(e_2, P_X)$. ¿Puede dar algún vector cíclico de P_X ?
2. Sean $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ (fija) y $T \in L(\mathbb{K}^{n \times n})$ dado por

$$T(B) = AB - BA.$$

- a) Probar que si A y B se diagonalizan simultáneamente, $T(B) = 0$.
- b) Probar que si A y B son nilpotentes y $T(B) = 0$ entonces AB es nilpotente. Hallar un ejemplo en que A y B sean nilpotentes, pero AB no lo sea.
- c) Probar que si A es una matriz nilpotente de orden 2, entonces T es un operador nilpotente de orden 3.
- d) Sea

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hallar $Z(E_{12}, T)$ y el polinomio T -anulador de E_{12} . Verificar que el T -anulador de E_{12} divide al polinomio minimal de T . ¿Puede hallar algún vector T -cíclico?

3. Sea $T \in L(\mathbb{R}^5)$ cuya representación matricial en la base canónica de \mathbb{R}^5 es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Probar que T no tiene ningún vector cíclico.
- b) Hallar el subespacio cíclico generado por $(1, 1, -1, -1, -1)$.

4. Sea $T \in L(\mathbb{C}^3)$ tal que

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 5 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix},$$

es una representación matricial de T (pensando a \mathbb{C}^3 como \mathbb{C} -EV). Hallar la forma de Jordan de T y una base B de \mathbb{C}^3 tal que $[T]_B$ es una matriz de Jordan.

5. Sea $T \in L(\mathbb{R}^5)$ tal que

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

la representación matricial de T en la base canónica de \mathbb{R}^5 .

- a) ¿Es T diagonalizable?
- b) Hallar, en caso de que exista, una matriz de Jordan semejante a A y la matriz de cambio de base correspondiente.
- c) Probar que existe un operador diagonalizable $D \in L(\mathbb{R}^5)$ y un operador nilpotente $N \in L(\mathbb{R}^5)$, tales que $T = D + N$ y $DN = ND$. Escribir las representaciones matriciales de D y N en la base canónica de \mathbb{C}^5 .
6. Hallar dos endomorfismos de \mathbb{R}^3 diferentes, que tengan como forma de Jordan a la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix},$$

7. Encontrar la forma de Jordan de los operadores representados por las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

8. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Decir si ambas matrices tienen la misma forma de Jordan, sin calcularla.

Sugerencia: Recordar las propiedades de la semejanza entre matrices.

9. Sea $T \in L(\mathbb{R}^3)$ y sea B una base en la cual

$$[T]_B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Determinar, observando la matriz, el polinomio minimal y el característico de T .

10. ¿Cuáles son las posibles formas de Jordan de un operador lineal $T \in L(\mathbb{C}^5)$ si $p_T(x) = (x+4)^2(x-\pi)^2(x-i)$? (pensando a \mathbb{C}^5 como \mathbb{C} -EV).

11. Sea

$$A = \begin{pmatrix} \pi & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \pi & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \pi & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \pi & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \pi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Hallar la forma de Jordan asociada a A .
- Hallar el polinomio característico, el minimal, los autovalores y la dimensión de los autoespacios asociados.

Sugerencia: Observar que la matriz es diagonal por bloques.

12. Hallar las posibles formas de Jordan de un operador $T \in L(\mathbb{C}^9)$ tal que

$$p_T(x) = (x+7)^4(x-3)^3(x+i)^2 \quad \text{y} \quad m_T(x) = (x+7)^2(x-3)^2(x+i).$$

Mencionar en cada caso la dimensión de los autoespacios asociados.