



UNIVERSIDAD  
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

MATEMÁTICAS PARA LAS CIENCIAS  
APLICADAS II

---

## Tarea III

---

*Alumno:* Arroyo Lozano Santiago

*Profesor:* Héctor "Awakatito" Díaz

Ciencias de la computación

May 19, 2020

# 1 Localizar en el plano:

Sabemos que las coordenadas polares son de la forma  $(r, \theta)$

## 1.1 $(3, \frac{-2\pi}{3})$

Esta coordenada nos indica que tiene radio 3 y  $\theta = \frac{-2\pi}{3}$ . Se encuentra entonces en el círculo 3 y como  $\frac{-2\pi}{3} = -120^\circ$  el grado positivo es  $240^\circ$ . Le llamaremos punto  $A$


## 1.2 $(-2, \frac{4\pi}{3})$

Esta coordenada nos indica que tiene radio -2, pero tomamos valores positivos, entonces se encuentra entonces en el círculo 2 y  $\frac{-2\pi}{3} = 60^\circ$ . Le llamaremos punto  $B$

## 1.3 $(-5, \frac{-17\pi}{6})$

Esta coordenada nos indica que tiene radio -5, pero tomamos valores positivos, entonces se encuentra entonces en el círculo 5 y  $\frac{-17\pi}{6} = 30^\circ$ . Le llamaremos punto  $C$

Veamos ahora donde se encuentran nuestros puntos  $A, B, C$ :



Puntos  $A, B, C$  en el plano polar

## 2 Demuestre que la gráfica $r = a\cos\theta + b\sin\theta$ es una circunferencia (Encontrar centro y radio)

Sabemos que  $(x, y) \rightarrow (r, \theta)$  y además  $x = r\cos\theta$   $y = r\sin\theta$  tal que  $r^2 = x^2 + y^2$ . Y la forma canónica del círculo es:  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$  Seguimos entonces:

$$\begin{aligned}
 r &= a\cos\theta + b\sin\theta \\
 r^2 &= (a\cos\theta + b\sin\theta) \cdot r && \text{(Multiplicamos por } r\text{)} \\
 r^2 &= ar\cos\theta + br\sin\theta && \text{(Distributividad)} \\
 x^2 + y^2 &= ax + by && \text{(Identidades de } x, y, r^2\text{)} \\
 x^2 + y^2 - ax - by &= 0 && \text{(Igualamos a 0)}
 \end{aligned}$$

Formamos un trinomio cuadrado perfecto sin perder la igualdad

$$\begin{aligned}
 \left(x^2 - ax + \frac{a^2}{4}\right) + \left(y^2 - by + \frac{b^2}{4}\right) &= 0 + \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} \\
 \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 &= \frac{a^2 + b^2}{4}
 \end{aligned}$$

El centro del círculo estará dado por  $(a, b)$  con  $r = \frac{a^2 + b^2}{4}$

Y como ya obtuvimos que la ecuación sí se puede escribir como la forma canónica de un círculo queda demostrado ■

### 3 Sea $0 \leq \theta < 2\pi$ , demuestre:

#### 3.1 Que $r = \cos 2\theta$ es una rosa de cuatro pétalos

$$\cos(2(-\theta)) = \cos 2\theta$$

$\therefore$  SI es simétrica respecto al eje polar

$$-r = \cos 2\theta \rightarrow r = -\cos 2\theta$$


$\therefore$  NO es simétrica respecto al polo

$$\cos(2(\pi - \theta)) = \cos 2\theta$$


$\therefore$  SI es simétrica respecto al eje copolar

Entonces la gráfica cuyas tabulaciones son:

$\theta$	$\cos(2\theta)$
0	1
$\frac{\pi}{12}$	0.866
$\frac{\pi}{6}$	0.500
$\frac{\pi}{3}$	-0.500
$\frac{5\pi}{12}$	-0.866
$\frac{\pi}{2}$	-1
$\frac{7\pi}{12}$	-0.866
$\frac{4\pi}{6}$	-0.500
$\frac{5\pi}{6}$	0.500
$\pi$	1



Se replica conforme al eje polar y copolar resultando en:



$$r = \cos 2\theta$$

### 3.2 Que $r = 1 + 2\cos\theta$ es un caracol

$$1 + 2\cos(-\theta) = 1 + 2\cos(\theta)$$

$\therefore$  SI es simétrica respecto al eje polar

$$-r = 1 + 2\cos 2\theta \rightarrow r = 1 - \cos 2\theta$$


$\therefore$  NO es simétrica respecto al polo

$$1 + 2\cos(\pi - \theta) = 1 - 2\cos\theta$$


$\therefore$  NO es simétrica respecto al eje copolar

Entonces la gráfica cuyas tabulaciones son:

$\theta$	$1 + 2\cos\theta$
$\frac{\pi}{12}$	2.93
$\frac{\pi}{6}$	2.73
$\frac{\pi}{3}$	2
$\frac{5\pi}{12}$	1.517
$\frac{\pi}{2}$	1
$\frac{7\pi}{12}$	0.482
$\frac{4\pi}{6}$	0
$\frac{5\pi}{6}$	-0.41
$\pi$	-1



Se replica conforme al eje polar resultando en:



$$r = 1 + 2\cos\theta$$

**4 Demostrar:**  $\frac{\vec{a} \cdot \hat{\mathbf{i}}}{|\vec{a}| \cdot |\hat{\mathbf{i}}|} = \frac{a_1}{|\vec{a}|}$   
**Donde**  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$

Sabemos que  $\hat{\mathbf{i}}$  es un vector unitario tal que  $|\hat{\mathbf{i}}| = 1$  donde  $\hat{\mathbf{i}} = (1, 0, 0)$ , seguimos:

$$\begin{aligned} \frac{\vec{a} \cdot \hat{\mathbf{i}}}{|\vec{a}| \cdot |\hat{\mathbf{i}}|} &= \frac{(a_1, a_2, a_3) \cdot (1, 0, 0)}{|\vec{a}| \cdot 1} \\ &= \frac{a_1}{|\vec{a}|} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Y análogamente podemos notar que se cumple:

$$\begin{aligned} \frac{\vec{a} \cdot \hat{\mathbf{j}}}{|\vec{a}| \cdot |\hat{\mathbf{j}}|} &= \frac{a_2}{|\vec{a}|} \\ \frac{\vec{a} \cdot \hat{\mathbf{k}}}{|\vec{a}| \cdot |\hat{\mathbf{k}}|} &= \frac{a_3}{|\vec{a}|} \end{aligned}$$

Donde  $\hat{\mathbf{j}} = (0, 1, 0) \wedge \hat{\mathbf{k}} = (0, 0, 1)$

## 5 Demostrar que los ángulos directores $\alpha, \beta, \gamma$ de un vector $\vec{a} \neq 0 \in \mathbb{R}^3$ cumplen:

### 5.1 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{1}{|\vec{a}|}(a_1, a_2, a_3)$

Osease *P.D.*  $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

Sabemos que:

$$\begin{aligned}\cos\alpha &= \frac{a_1}{|\vec{a}|} \rightarrow a_1 = |\vec{a}|\cos\alpha \\ \cos\beta &= \frac{a_2}{|\vec{a}|} \rightarrow a_2 = |\vec{a}|\cos\beta \\ \cos\gamma &= \frac{a_3}{|\vec{a}|} \rightarrow a_3 = |\vec{a}|\cos\gamma\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= (|\vec{a}|\cos\alpha, |\vec{a}|\cos\beta, |\vec{a}|\cos\gamma) \\ \vec{a} &= |\vec{a}|(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) && \text{(Factorizamos)} \\ \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} &= \frac{|\vec{a}|(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)}{|\vec{a}|} && \text{(Dividimos sobre } |\vec{a}|) \\ \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} &= (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) \quad \blacksquare\end{aligned}$$

### 5.2 $\cos^2\alpha, \cos^2\beta, \cos^2\gamma = 1$

Sea  $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$  un vector, tenemos:

$$|(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)| = \sqrt{\cos^2\alpha, \cos^2\beta, \cos^2\gamma} \quad \text{(Def. de norma)}$$

Pero como or 5.1 sabemos que  $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$  y como  $|\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}| = 1$  porque es un vector unitario tenemos:

$$\begin{aligned}\sqrt{\cos^2\alpha, \cos^2\beta, \cos^2\gamma} &= 1 \\ \left(\sqrt{\cos^2\alpha, \cos^2\beta, \cos^2\gamma}\right)^2 &= 1^2 && \text{(Elevamos al cuadrado)} \\ \cos^2\alpha, \cos^2\beta, \cos^2\gamma &= 1 \quad \blacksquare\end{aligned}$$