
Tributarios Río Grande

REPÚBLICA DE COLOMBIA - Departamento de Antioquia



Origen/ Tipo material		Nombre UGS	Nomenclatura	Descripción
Suelo	Transportado	Suelo transportado aluvial de cauce activo	Staca	Ocupan las llanuras de inundación de las vertientes actuales, están conformados por material poco o nada consolidado, como gravas de rocas plutónicas en diferentes proporciones en una matriz de material arcillo-arenoso con cementación débil a moderada, los clastos están mal seleccionados, con formas subangulares a subredondeadas, en tamaños desde métricos hasta centimétricos.
		Suelo transportado aluvial de terraza	Stat	Los depósitos están conformados por arcillas abigarradas con intercalaciones de cantos mal seleccionados de cuarzo, de rocas intrusivas graníticas en una matriz areno arcillosa color blanco amarillento a amarillo o pardo por acumulación de óxidos de hierro, se observa estratificación lenticular
		Suelo transportado coluvial arcilloso	Stcoa	Depósitos de suelos finogranulares arcillosos formados por suelo transportados por gravedad, con variaciones en la humedad. Además, muestra distintos grados de meteorización, el material es homogéneo en composición, principalmente de la tonalita perteneciente al Batolito Antioqueño.
		Suelo transportado coluvial arcillo-limoso	Stcoal	Los suelos transportados coluviales representan los depósitos de vertientes. Estos suelos están compuestos principalmente de arcilla y limo con variaciones en la humedad. Además, muestran distintos grados de meteorización. La composición de estos suelos proviene principalmente de la granodiorita perteneciente al Batolito Antioqueño, y la cobertura vegetal presenta variaciones en los espesores. Los depósitos que no alcanzan a ser removidos por las corrientes quedan dispuestos a manera de lenguas.
	Residual	Suelo residual arcilloso de granodiorita del Batolito Antioqueño	Sragba	Suelo residual arcilloso con una coloración que va desde naranja a naranja rojizo y violeta o colores abigarrados dependiendo del grado de alteración. Normalmente el feldespato encuentra totalmente alterado por procesos de caolinización, razón por la cual el saprolito toma un aspecto arcilloso y algo plástico. La composición de este suelo corresponde principalmente a la granodiorita del batolito antioqueño.
		Suelo residual arcilloso de tonalita del Batolito Antioqueño	Sratba	Suelo residual arcilloso con una coloración que va desde naranja a naranja rojizo y violeta o colores abigarrados dependiendo del grado de alteración. Normalmente el feldespato encuentra totalmente alterado por procesos de caolinización, razón por la cual el saprolito toma un aspecto arcilloso y algo plástico. La composición de este suelo corresponde principalmente a la tonalita del Batolito Antioqueño.
		Suelo residual arcillo-limoso de granodiorita del Batolito Antioqueño	Sralgba	Suelo residual arcillo limoso. Se genera como resultado de la meteorización de la granodiorita del Batolito Antioqueño. Este suelo se caracteriza por partículas de tamaño arcilla y limo, de coloración anaranjada a anaranjada rojiza. Este tipo de suelo tiene una alta susceptibilidad a generar movimientos en masa y desarrolla espesores variables de cobertura vegetal.
		Suelo residual arcillo-limoso de tonalita del Batolito Antioqueño	Sraltba	Suelo residual arcillo limoso. Se genera como resultado de la meteorización de la tonalita del Batolito Antioqueño. Este suelo se caracteriza por partículas de tamaño arcilla y limo, de coloración anaranjada a anaranjada rojiza. Este tipo de suelo tiene una alta susceptibilidad a generar movimientos en masa y desarrolla espesores variables de cobertura vegetal.
		Suelo residual areno-gravoso de granodiorita del Batolito Antioqueño	Sraggba	El suelo residual arenoso-gravoso es un producto de la meteorización de la granodiorita presente en el Batolito Antioqueño. Su composición se distingue por la presencia predominante de partículas de arena y grava, suelen presentar un aspecto arenoso o sacaroidal debido a que se mantienen los cristales de cuarzo, además presentan una tonalidad que varía entre el anaranjado y el rojo anaranjado. Este suelo exhibe una tendencia a provocar movimientos en masa debido a su naturaleza, y tiende a desarrollar coberturas vegetales de espesor variable.
		Suelo residual areno-gravoso de tonalita del Batolito Antioqueño	Sragtba	El suelo residual arenoso-gravoso es un producto de la meteorización de la tonalita presente en el Batolito Antioqueño. Su composición se distingue por la presencia predominante de partículas de arena y grava, suelen presentar un aspecto arenoso o sacaroidal debido a que se mantienen los cristales de cuarzo, además presentan una tonalidad que varía entre el anaranjado y el rojo anaranjado. Este suelo exhibe una tendencia a provocar movimientos en masa debido a su naturaleza, y tiende a desarrollar coberturas vegetales de espesor variable.
Roca	Ígnea	Roca de calidad buena de tonalita del Batolito Antioqueño	Rbtba	Macizo de roca cristalina de calidad buena, corresponde a tonalita perteneciente al batolito antioqueño, su composición se caracteriza principalmente por cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, entre otros minerales. La textura general que predomina es la hipidiomórfica, variando de equigranular a inequigranular.
		Roca de calidad regular de tonalita del Batolito Antioqueño	Rrtba	Macizo de roca cristalina de calidad regular, corresponde a tonalita perteneciente al batolito antioqueño, su composición se caracteriza principalmente por cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, entre otros minerales. La textura general que predomina es la hipidiomórfica, variando de equigranular a inequigranular, las micas (biotita) que pueden llegar a tomar un color pardo rojizo a bronce según el grado de alteración del mineral y en ocasiones con algunos cristales de anfíboles muy alterados y deleznables.
		Roca de calidad muy mala de tonalita del Batolito Antioqueño	Rmmtba	Macizo de roca cristalina de calidad muy mala, corresponde a tonalita perteneciente al batolito antioqueño, su composición se caracteriza principalmente por cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, entre otros minerales. La textura general que predomina es la hipidiomórfica, variando de equigranular a inequigranular, las micas (biotita) que pueden llegar a tomar un color pardo rojizo a bronce según el grado de alteración del mineral y en ocasiones con algunos cristales de anfíboles muy alterados y deleznables.
		Roca de calidad buena de granodiorita del Batolito Antioqueño	Rbgba	Macizo de roca cristalina de calidad buena, corresponde a granodiorita perteneciente al batolito antioqueño, su composición se caracteriza principalmente por cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, entre otros minerales. La textura general que predomina es la hipidiomórfica, variando de equigranular a inequigranular.

CONVENCIONES

Drenajes

Curvas de nivel

AUTORES

Leidy Estefania Cadavid Arango

Sairandelly Gil Martínez

Santiago Lerma Merchan

Carlos Andrés Muñoz Arrieta

Dubán de Jesús Uribe Góez


INFORMACIÓN DE REFERENCIA

0,47 0,24 0 0,47 0,95 1,42 1,9 Km

Escala 1:5 000

Proyección transversal de Mercator
MAGNA-SIRGAS - Origen Nacional
Meridiano central -73,0
Latitud de origen 4,0

ÍNDICE DE LOCALIZACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

MAPA DE UNIDADES DE GEOLOGÍA PARA LA INGENIERÍA

NOTAS

1. Modelo Digital Elevación de Antioquía de un metro.

2. Las curvas de nivel se elaboraron con un intervalo de 50 metros de altura.