


 ----- Rose diagram/Circular Histogram | 14/07/2025 at 8:42 a. m.----- Planes data set (petals parallel strike direction): Imported Planes Max value = 23.07692% between 251° and 260° Mean Vec = 210,5° ± 29,2°; Average Length = 0,3715 Circular Variance = 0,6285; kappa = 0,7973 [vector mean; uncertainty is 1 standard error, for 95% confidence level multiply by 1.96]	Concentracion→ alrededor de 250°–260° **no todas las foliaciones son paralelas**, Puede haber **rotación estructural local**, **plegamiento débil**, o foliaciones heredadas. Las foliaciones en Arcillolita presentan una orientación preferente SSW–NNE (promedio 210.5°), pero con una dispersión angular significativa, lo que sugiere una deformación moderadamente heterogénea, posiblemente relacionada a una fase tectónica compresiva oblicua o una superposición de microestructuras.

Calculo de polos y Contorno (Analisis densidad de polos)

 ----- Kamb Contouring | 14/07/2025 at 8:33 a. m.----- Data set name = Poles to Imported Planes Contour Int. = 1 sigma; Counting Area = 40,91% of net area Expected Num. = 5.318182 Signif. Level = 3 sigma	La foliación en la unidad Arcillolita tiene una **orientación estructural predominante y bien definida**, con **poco ruido estadístico**. Esto indica una **deformación coherente** que probablemente corresponde a **una sola fase tectónica significativa**, con orientación de compresión NW–SE o una estructura axial bien desarrollada. azimuts 110° a 130° Rojo → maxima densidad angular: indica la dirección hacia la que la mayoría de las foliaciones están inclinadas

Contorno (Analisis densidad de polos)



----- Bingham Analysis | 14/07/2025 at 8:37 a. m.-----
Data set: Poles to Imported Planes

Axis	Eigenvalue	Trend	Plunge	a95 min	a95 max
1.	0,6840	126,2,	71,2	0,0	0,0
2.	0,2251	228,0,	04,0		
3.	0,0909	319,3,	18,3	0,0	0,0

Best fit great circle (strike, dip RHR) = 049,3, 71,7


El **Cylindrical Best Fit** demuestra que las foliaciones en Arcillolita se organizan en un plano promedio de **strike 049.3° y buzamiento 71.7°**, con **alta coherencia estructural** y poca dispersión estadística. Esto respalda firmemente la hipótesis de una **única fase de deformación dominante** con foliaciones bien desarrolladas e inclinadas hacia el sureste.

Vector medio

----- Fisher Mean Vector | 14/07/2025 at 8:39 a. m.-----
Data set: Poles to Imported Planes

	N	Trend	Plunge	a95	a99	kappa	mean length
all	13	120,8	75,7	22,4	28,9	4,4	0,7898

N < 16; Kappa (Fisher et al. 1987) = 4,1



----- Bingham Analysis | 14/07/2025 at 8:37 a. m.-----
Data set: Poles to Imported Planes

Axis	Eigenvalue	Trend	Plunge	a95 min	a95 max
1.	0,6840	126,2,	71,2	0,0	0,0
2.	0,2251	228,0,	04,0		
3.	0,0909	319,3,	18,3	0,0	0,0

Best fit great circle (strike, dip RHR) = 049,3, 71,7


Orientacion promedio

----- Fisher Mean Vector | 14/07/2025 at 8:39 a. m.-----
Data set: Poles to Imported Planes

	N	Trend	Plunge	a95	a99		kappa	mean length
all	13	120,8	75,7		22,4	28,9	4,4	0,7898

N < 16; Kappa (Fisher et al. 1987) = 4,1

Diagrama de rosas



----- Rose diagram/Circular Histogram | 14/07/2025 at 8:42 a. m.-----
Planes data set (petals parallel strike direction): Imported Planes
Max value = 23.07692% between 251° and 260°
Mean Vec = 210,5° ± 29,2°; Average Length = 0,3715
Circular Variance = 0,6285; kappa = 0,7973
[vector mean; uncertainty is 1 standard error,
for 95% confidence level multiply by 1.96]