[2] $wp(\ s[i] := 0,\ Q\ ) \equiv$

$wp(\ s := setAt(s,i,0)\ ,\ Q\ ) \equiv$

$0 \leq i < |s| \ \wedge_L \ Q^{s}_{setAt(s,i,0)}$ (Δ)

(Δ) $(\forall j : \mathbb{Z})\ (\ 1 \leq j < |s| \longrightarrow_L setAt(s,i,0)[j] = setAt(s,i,0)[j-1])$

$(\forall j : \mathbb{Z})(\ 1 \leq j < |s| \longrightarrow_L$

$(i \neq j \wedge i \neq j-1 \wedge s[j] = s[j-1]\ ) \vee$

$(i = j \wedge \ 0 = s[j-1]) \vee$

$(i = j-1 \ \wedge \ \ s[j] = 0)$

$)$ B

$\equiv \ i \leq 1 \ \wedge_L \ 0 \leq i < |s| \wedge_L \ B$

$\equiv \ 0 \leq i \leq 1 \wedge_L B$

entonces formalizando quedaría:

$(1 < i < |s| \wedge_L A) \vee (0 \leq i \leq 1 \wedge_L B)$

(P) Pero, ¿Está bien que quede así?
¿Quizás debamos llegar a algo más simple?