
A
η² of dominant-expert assignment (mean ± s.d., 5 seeds)
LogP
Aromatic rings
MW
Polar surface area
H-bond acceptors
H-bond donors
Rotatable bonds
Ring count
0.27 ± 0.04
0.16 ± 0.10
0.14 ± 0.05
0.02 ± 0.03
0.21 ± 0.07
0.32 ± 0.09
0.39 ± 0.04
0.04 ± 0.03
0.12 ± 0.03
0.12 ± 0.03
0.12 ± 0.03
0.07 ± 0.03
0.09 ± 0.04
0.19 ± 0.09
0.08 ± 0.03
0.04 ± 0.02
0.08 ± 0.03
0.18 ± 0.07
0.07 ± 0.03
0.07 ± 0.04
0.06 ± 0.02
0.14 ± 0.06
0.04 ± 0.01
0.01 ± 0.01
0.05 ± 0.02
0.15 ± 0.07
0.07 ± 0.03
0.06 ± 0.02
0.11 ± 0.06
0.15 ± 0.09
0.28 ± 0.05
0.03 ± 0.03
Solubility (AqSolDB)
Caco-2 (Wang)
LD50 (Zhu)
Lipophilicity (AstraZeneca)
η² (mean over seeds)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
B
Per-expert descriptor means, AqSolDB, seed 0 (text: raw mean; colour: z-score)
E5 (n = 3,111)
E7 (n = 2,447)
E1 (n = 1,912)
E3 (n = 1,257)
E6 (n = 1,253)
322.7 4.5 48.5 0.7 3.1 1.7
199.4 0.4 71.9 1.6 3.7 0.6
326.7 -0.3 95.5 1.4 5.0 1.2
250.5 2.0 59.6 0.9 3.2 1.2
180.2 2.4 31.2 0.8 1.5 0.2
MW
LogP
TPSA
HBD
HBA
ArRings
z-score of expert mean vs all molecules
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0