

CALENDRIER DE VACCINATION ANTIRABIQUE TISSULAIRE

	Grade II (VAR)	Grade III (SAR + VAR)	Faite
J0	/...../.....	/...../.....	
J1	/...../.....	/...../.....	
J2	/...../.....	/...../.....	
J3	/...../.....	/...../.....	
J4	/...../.....	/...../.....	
J5	/...../.....	/...../.....	
J6	/...../.....	/...../.....	
	Doses de rappel	Doses de rappel	
J10	/...../.....	/...../.....	
J14	/...../.....	/...../.....	
J24		/...../.....	
J29	/...../.....		
J34		/...../.....	
J90	/...../.....	/...../.....	

NB:

- La voie d'administration intramusculaire :
(Moins de 2 ans : face antérolatérale externe de la cuisse et
Plus de 2 ans : muscle deltoïde).
- Pour le patient immunodéprimé, l'exposition de grade II doit
être prise en charge comme une exposition de grade III.

Observations :

Médecin :

.....
.....
.....



Direction de la santé et de la population
de la wilaya de TLEMCCEN



CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE Dr TEDJINI DAMERDJI- TLEMCCEN
Service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive
Tél : 043 41 72 19 / 043 41 72 21 poste : 24-22



« A présenter à chaque acte vaccinal »

Nom et prénom :

Age : Poids : Kg

Adresse :

Date d'exposition :/...../.....

Grade I ☐

Grade II ☐

Grade III ☐

Attention : La rage est une maladie mortelle, le schéma vaccinal doit
être terminé.

Terrain particulier (comorbidités) :

Types d'exposition: ☐ Morsure ☐ Griffure ☐ Léchage

Au niveau de

Espèce de l'animal en cause :

☐  Chien ☐  Chat ☐ Autre :

TRAITEMENT

• Soins locaux : ☐ Oui ☐ Non

• Sérum (ERIG) : ☐ Oui ☐ Non

Date d'administration :/...../.....

Dose totale administrée : ml

Voie d'administration : Infiltré ml

en IM ml

Lot N°:

Date de péremption :/...../.....

• Vaccin antirabique : ☐ Cellulaire ☐ Tissulaire

Date d'administration :/...../.....

Lot N°:

Date de péremption :/...../.....

• Vaccin antitétanique et antidiphtérique :

☐ Oui ☐ Non

• Antibiotique :

☐ Oui ☐ Non

CALENDRIER DE VACCINATION ANTIRABIQUE CELLULAIRE

	Protocol de ZAGREB	Protocol d'ESSEN	Faite
J0	/...../.....(2Doses)	/...../.....	
J3		/...../.....	
J7	/...../.....	/...../.....	
J14		/...../.....	
J21	/...../.....		

- Vaccin cellulaire en quantité insuffisante ou le sujet est à risque hémorragique → Utiliser la voie ID (0,1 ml) :

	Dates	Faite
J0	/...../.....(2Doses)	
J3	/...../.....(2Doses)	
J7	/...../.....(2Doses)	

CHEZ UN SUJET PRÉALABLEMENT VACCINÉ

« Schéma 1 »

	Dates	IM (1ml) ou ID (0.1ml)	Faite
J0	/...../.....		
J3	/...../.....		

Ou « Schéma 2 »

	Dates	ID (0.1ml)	Faite
J0	/...../.....	<u>04 Doses en 04 sites différents</u>	