

REPOSICIÓN DE LÍQUIDOS

¿Qué debe contener el plan de líquidos?

- Agua
- Na
- K
- Glucosa (especialmente en neonatos)

¿Cómo calcular?

MENORES 10 KG Cálculo por peso

- 100 a 150 ml / Kg EN 24 HRS
- Na: 4 a 6 mEq / Kg / día
- K: 2 a 4 mEq / Kg / día

Del total colocar:

- $\frac{2}{3}$ solución glucosada 5%
- $\frac{1}{3}$ solución fisiológica

NOTA: ¿Cuándo colocar KCl?

- Hipopotasemia (vómitos intensos, diarrea prolongada)
- Diuréticos
- Corticoesteroides
- CAD
- Alcalosis
- Arritmia

Ampolletas 5ml -> 20 mEq

Ej: Niño de 8 kg que ingresa por neumonía

Si se lo colocamos a 120 ml/ kg/ día sería:
(120 x 8 = 960 ml)

960 ml -> en 24 hrs
320 ml -> en 8 hrs

Por lo tanto los 320 ml se dividen en:
 $\frac{2}{3}$ solución glucosada 5% (200 ml)
 $\frac{1}{3}$ solución fisiológica (120 ml)
+ 2ml de KCl en 24 hrs

MAYOR 10 KG Cálculo por superficie corporal

- 1200 a 1800 ml / msc EN 24 HRS
- Na: 40 a 60 mEq/ msc/ día
- K: 40 a 60 mEq/ msc/ día

Menores de 10 kg

(peso x 4) + 9

entre

100

Mayores de 10 kg

(peso x 4) + 7

entre

(peso + 90)

En paciente con pérdida alta de Na colocar:

- Solución mixta (contiene 0.9g de Na/ 100 ml y 0.5g de Glucosa /100 ml)

En otros casos considerar:

- $\frac{1}{2}$ solución glucosada 5%
- $\frac{1}{2}$ solución fisiológica

O bien:

- $\frac{2}{3}$ solución glucosada 5%
- $\frac{1}{3}$ solución fisiológica