

	Agente etiológico	Epidemiología	Tiempo de incubación	Lesiones	Tratamiento
Tiña capilar (Tinea capitis) Seca	Microsporum canis Trichophyton tonsurans	Preescolares Escolares	10 – 15 días	Descamación “Pelos tiñosos” Vaina blanquecina Tricofíticas: Alopecia difusa con placas pequeñas e irregulares, intercaladas con los pelos sanos; los pelos afectados semejant granos de pólvora (puntos negros) Microspóricas: Una o pocas zonas seudoalopécicas redondeadas (placas), bien limitadas, con los pelos tiñosos cortados al mismo nivel.	Adulto: Terbinafina, Itraconazol, Sulfara de selenio (shampoo) Pediatrico: Terbinafina, Griseofulvina
Tiña capilar (Tinea capitis) Inflamatoria “Querion de Celso”	Microsporum canis Trichophyton mentagrophytes			plastrón inflamatorio, doloroso al tacto, pústulas, abscesos, úlceras y costras melicéricas.	

				Adenopatía satélite No fiebre	
Tiña fávica (favus)	Trichophyton schoenleinii o Microsporum gypseum			Escútuas o cazoletas fávicas, constituidas por costras y masas de filamentos que despiden un olor a rata mojada	
Tiña del cuerpo (tinea corporis)	M. canis T. rubrum T. tonsurans T. mentagrophytes E. floccosum			Eritema y escamas en placas redondeadas Bordes vesiculares activos Prurito	
Tiña de la barba (tinea barbae)	T. verrucosum M. canis T. mentagrophytes T. megninii		1 – 2 semanas	Eritema Descamación Ampollas Prurito Indoloro Fiebre	Terbinafina, Itraconazol, Sulfara de selenio (shampoo) Inflamación: prednisona
dermatosis glútea dermatofítica del lactante, o epidermofitosis de la zona del pañal	E. floccosum T. rubrum (rara vez)	Menores de 3 años		Placas eritematoescamosas anulares y pápulas, con pocas vesículas, que dejan zonas de piel sana	
Tiña de la ingle (tinea cruris)	T. rubrum E. floccosum T. mentagrophytes	Zonas calurosas Px que permanecen sentados mucho	T. R: 1- 2 semanas E. F: 7 – 9 días T.M: 1 – 2	Placas eritematoescamosas con borde vesicular Evolución crónica	Miconazol, Ketoconazol, clotrimazol, naftilina

		tiempo	semanas	Prurito intenso Pigmentación y liquenificación	Crema antifungica
Tiña de los pies (tinea pedis)	T. rubrum E. floccosum T. mentagrophytes		1 – 2 semanas	localización: interdigital, plantas y bordes de pies. grietas, fisuras, descamación, vesículas, ampollas y costras melicéricas (vesiculoampollar, dishidrótica o eccematiforme) Hiperqueratósica	VO: Griseofulvina, itraconazol, fluconazol, terbinafina Tópico: Imidazones, ciclopiroxolamina, alilaminas, amorolfina
Tiña de las manos (tinea manuum)	T. rubrum	Predomina en la izquierda	7 – 15 días	Hiperqueratosis difusa, descamación, anhidrosis y eritema Forma inflamatoria con vesículas o pústulas (a veces)	VO: terbinafina, itraconazol, fluconazol Tópico: Miconazol, clotriamzol, ketoconazol
“Onicomycosis” Tiña de las uñas (tinea unguium)	Candida T. rubrum T. mentagrophytes	Uñas de las manos (27%) Pies (70%) Ambas (3%)	Días – 2 semanas	Engrosamiento, fragilidad, estrías, coloración amarillenta o café (marrón) oscura y predominio distal	VO: terbinafina, itraconazol, fluconazol Tópico: Bifonazol, ciclopirox, amorolfina