

Домашнее задание по курсу "Математическая логика - 2"

1 Язык и аксиоматика теории множеств

§ 1.3

Условие Доказать, что $\emptyset \neq \{\emptyset\}$.

Доказательство По определению

$$x = y \Rightarrow \forall t(t \in x \Leftrightarrow t \in y).$$

Пусть $\emptyset = \{\emptyset\}$, $\Rightarrow \forall t(t \in \{\emptyset\} \Leftrightarrow t \in \emptyset)$ Противоречие для $t = \emptyset$

§ 1.4

Условие Доказать, что $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\} \neq \{1, 2, 3\}$.

Доказательство По определению

$$x = y \Rightarrow \forall t(t \in x \Leftrightarrow t \in y).$$

Пусть $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\} = \{1, 2, 3\}$, $\Rightarrow \forall t(t \in \{1, 2, 3\} \Leftrightarrow t \in \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\})$ Противоречие для $t = 1$

§ 1.6

Условие Доказать, что \exists лишь одно множество, не имеющее элементов.

Доказательство Пусть \exists два множества X и X_0 , не имеющих элементов и такие, что $X \neq X_0$

$$\Rightarrow \exists t(t \in X \Rightarrow t \notin X_0)$$

Противоречие так как $\nexists t \in X$.

§ 1.8

Условие Доказать, что множество всех корней многочлена $\alpha(x) = \beta(x)\gamma(x)$ есть объединение множеств корней $\beta(x)$ и $\gamma(x)$.

Доказательство Чтобы доказать, что множество корней = объединения множеств, надо доказать, что любой корень является либо корнем $\beta(x)$ либо $\gamma(x)$ и что других корней не существует.

1) Пусть существует корень x_0 , который не является корнем ни $\beta(x)$, ни корнем $\gamma(x)$

$\Rightarrow \alpha(x_0) = 0, \beta(x_0) \neq 0, \gamma(x_0) \neq 0$. Противоречие 2) Пусть x_0 корень $\beta(x)$ или $\gamma(x)$, тогда $\beta(x_0) = 0$ или $\gamma(x_0) = 0 \Rightarrow \alpha(x_0) = 0$

§ 1.9

Условие Доказать, что пересечение множеств действительных корней многочленов $\alpha(x)\beta(x)$ с действительными коэффициентами совпадает с множеством всех действительных корней $\gamma(x) = \alpha^2(x) + \beta^2(x)$.

Доказательство Чтобы доказать, что множество корней = пересечение множеств, надо доказать, что любой корень из пересечения является корнем и что других корней не существует.

1) Если x_0 корень $\alpha(x)\beta(x) \Rightarrow \gamma(x_0) = 0$ 2) Пусть существует корень $\gamma(x)x_0$, который не является корнем ни $\alpha(x)$, ни корнем $\beta(x)$

Тогда $\gamma(x_0) = 0 \Rightarrow \alpha^2(x_0) + \beta^2(x_0) = 0 \Rightarrow \alpha(x_0) = 0 \& \beta(x_0) = 0$

§ 1.11 (а, г, ж)

Условие Доказать следующие тождества

а) $A \cup A = A \cap A = A$

Доказательство Распишем по определению


$$\{Z \mid (Z \in A \vee Z \in A)\} = \{Z \in A \cup A \mid Z \in A \wedge Z \in A\} = A$$

Упростим

$$\{Z \mid (Z \in A)\} = \{Z \in A \cup A \mid Z \in A\} = A \Leftrightarrow A = \{Z \in A \mid Z \in A\} = A \Leftrightarrow A = A = A$$


Условие г) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Доказательство



Условие ж) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Доказательство



§ 1.12(в, д, ж, п, т)

§ 1.13(а, д, к)

§ 1.14(в, к)

§ 1.15

Условие Доказать, что

$$а) (A_1 \cup \dots \cup A_n) \triangle (B_1 \cup \dots \cup B_n) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup \dots \cup (A_n \triangle B_n)$$

Доказательство Докажем по индукции:

База индукции

$$n=1) (A_1) \triangle (B_1) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \text{ (очевидно)}$$

$$n=2) (A_1 \cup A_2) \triangle (B_1 \cup B_2) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup (A_2 \triangle B_2) \text{ (Доказывалось на уроке)}$$

Предположение индукции

Пусть верно для $\forall n < k$

Шаг индукции

Докажем для $k+1$

$$(A_1 \cup \dots \cup A_k + 1) \triangle (B_1 \cup \dots \cup B_k + 1) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup \dots \cup (A_k + 1 \triangle B_k + 1)$$

$$\text{пусть } A_0 = A_1 \cup \dots \cup A_k, B_0 = B_1 \cup \dots \cup B_k$$

$$(A_1 \cup \dots \cup A_{k+1}) \triangle (B_1 \cup \dots \cup B_{k+1}) \Leftrightarrow (A_0 \cup A_{k+1}) \triangle (B_0 \cup B_{k+1}) \subseteq$$

$$\subseteq (A_0 \triangle B_0) \cup (A_k \triangle B_k)$$

$$(A_0 \triangle B_0) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup \dots \cup (A_k \triangle B_k)$$

$$\Rightarrow (A_1 \cup \dots \cup A_k + 1) \triangle (B_1 \cup \dots \cup B_k + 1) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup \dots \cup (A_k + 1 \triangle B_k + 1)$$

$$\text{Условие } б) (A_1 \cap \dots \cap A_n) \triangle (B_1 \cap \dots \cap B_n) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup \dots \cup (A_n \triangle B_n)$$

Доказательство Докажем по индукции:

База индукции

$$n=1) (A_1) \triangle (B_1) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \text{ (очевидно)}$$

$$n=2) (A_1 \cap A_2) \triangle (B_1 \cap B_2) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup (A_2 \triangle B_2) \text{ (Доказывалось на уроке)}$$

Предположение индукции

Пусть верно для $\forall n < k$

Шаг индукции

Докажем для $k+1$

$$(A_1 \cap \dots \cap A_k + 1) \triangle (B_1 \cap \dots \cap B_k + 1) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup \dots \cup (A_k + 1 \triangle B_k + 1)$$

$$\text{пусть } A_0 = A_1 \cap \dots \cap A_k, B_0 = B_1 \cap \dots \cap B_k$$

$$(A_1 \cap \dots \cap A_{k+1}) \triangle (B_1 \cap \dots \cap B_{k+1}) \Leftrightarrow (A_0 \cap A_{k+1}) \triangle (B_0 \cap B_{k+1}) \subseteq$$

$$\subseteq (A_0 \triangle B_0) \cup (A_k \triangle B_k)$$

$$(A_0 \triangle B_0) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup \dots \cup (A_k \triangle B_k)$$

$$\Rightarrow (A_1 \cap \dots \cap A_k + 1) \triangle (B_1 \cap \dots \cap B_k + 1) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup \dots \cup (A_k + 1 \triangle B_k + 1)$$

§ 1.17

Условие Определить операции \cup, \cap, \setminus , через:

$$а) \triangle, \cap$$

Доказательство

$$\cap = \cap$$

$$A \cup B = (A \triangle B) \triangle (A \cap B)$$

$$A \setminus B = (A \triangle B) \cap A$$

Условие б) \triangle, \cup

Доказательство

$$\cup = \cup$$

$$A \cap B = ((A \cup B) \triangle A) \triangle B$$

$$A \setminus B = (A \cup B) \triangle B$$

Условие и) \setminus, \triangle

Доказательство

$$A \cup B = (A \setminus B) \triangle$$

$$A \cap B = (B \setminus (A \setminus B))$$

$$\setminus = \setminus$$

§ 1.18

Условие Доказать, что нельзя определить:

а) \setminus через \cap и \cup

б) \cup через \cap и \setminus

Решение

а) Пусть можно, тогда подставим в это определение множества A и A - их симметрическая разница равна \emptyset , но объединение пересечение могут дать только само A

б) \cap и \setminus размер множества после выполнения данных операций не больше, чем максимальное из множества. Но объединение двух множеств дает множество размером суммы размеров. Значит размеры будут разные. \rightarrow нельзя определить.

§ 1.20

Условие Найти все подмножества множеств: $\emptyset, \{\emptyset\}, \{x\}, \{1, 2\}$.

Ответ

\emptyset - нет

$\{\emptyset\} - \emptyset$

$\{x\} - \emptyset, \{x\}$

$\{1, 2\} - \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

§ 2.1

Условие Доказать, что существуют A, B и C такие, что:

а) $A \times B \neq B \times A$

Решение

$A = \{1\}$ и $B = \{2\}$, так как, пользуясь определением упорядоченной пары: $(\{1\}, \{2\}) = \{\{1\}, \{1, 2\}\} \neq \{\{2\}, \{2, 1\}\} = (\{2\}, \{1\})$.

Условие б) $A \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C$

Решение

§ 2.3

Условие Доказать, что если A, B, C и D не пусты, то:

а) $A \subseteq B$ и $C \subseteq D \Leftrightarrow A \times C \subseteq B \times D$ б) $A = B$ и $C = D \Leftrightarrow A \times C = B \times D$

Решение

Очевидно доказывается методом от противного.

§ 2.6(а, б, г)

Условие Доказать, что:

а) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

б) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

г) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$

Решение

2 Отношения и функции

§ 2.8(а, в)

Условие Найти $\delta_R, \rho_R, R^{-1}, R \cdot R, R \cdot R^{-1}, R^{-1} \cdot R$ для следующих отношений:

(а) $R = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{N} \text{ и } x \text{ делит } y\}$;

(в) $R = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{D} \text{ и } x + y \leq 0\}$.

Решение (а) Это отношение - всюдуопределенное, так как для любого x существует $y = x$, для которого x делит $y \Rightarrow \delta_R = Pr_1(R) = \mathbb{N}$.

Аналогично это отношение - всюдузначное. $\Rightarrow \rho_R = Pr_2(R) = \mathbb{N}$.

$R^{-1} = \{(x, y) | (y, x) \in R\} = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{N} \text{ и } y \text{ делит } x\}$.

$$R \cdot R \Rightarrow \{t \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} | \exists u = (u_1, u_2) \exists v = (v_1, v_2) (u \in R \& v \in R \& pr_1(t) = pr_1(u) \& pr_2(u) = pr_1(v) \& pr_2(v) = pr_2(t))\} \sim$$

$$\sim \{(x, y) | x, y \in \mathbb{N} \& \exists u \exists v (u_2 : u_1 \& v_2 : v_1 \& x = u_1 \& u_2 = v_1 \& v_2 = y)\} \sim$$

$$\sim \{(x, y) | x, y \in \mathbb{N} \& y : x\} \Rightarrow R \cdot R = R.$$

(так как $v_2 = y : v_1 = u_2 : u_1 = x$, значит x должен делить y)

$$R \cdot R^{-1} \Rightarrow \{t \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} | \exists u = (u_1, u_2) \exists v = (v_1, v_2) (u \in R \& v \in R^{-1} \& pr_1(t) = pr_1(u) \& pr_2(u) = pr_1(v) \& pr_2(v) = pr_2(t))\} \sim$$

$$\sim \{(x, y) | x, y \in \mathbb{N} \& \exists u \exists v (u_2 : u_1 \& v_1 : v_2 \& x = u_1 \& u_2 = v_1 \& v_2 = y)\} \sim$$

$$\sim \{(x, y) | x, y \in \mathbb{N}\} \Rightarrow R \cdot R^{-1} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

(так как $u_2 = v_1 \dot{v}_2 = y$ и $u_2 \dot{u}_1 = x$, то можно взять в качестве u_2 число, делящееся и на x , и на y , а сами x и y связаны не будут. Значит, нет дополнительных условий на упорядоченную пару (x, y))

$$\begin{aligned} R^{-1} \cdot R &\Leftrightarrow \{t \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} | \exists u = (u_1, u_2) \exists v = (v_1, v_2) (u \in R^{-1} \& v \in R \& pr_1(t) = \\ &= pr_1(u) \& pr_2(u) = pr_1(v) \& pr_2(v) = pr_2(t))\} \sim \\ &\sim \{(x, y) | x, y \in \mathbb{N} \& \exists u \exists v (u_1 \dot{u}_2 \& v_2 \dot{v}_1 \& x = u_1 \& u_2 = v_1 \& v_2 = y)\} \sim \\ &\sim \{(x, y) | x, y \in \mathbb{N}\} \Rightarrow R^{-1} \cdot R = \mathbb{N} \times \mathbb{N} \end{aligned}$$

(так как $x = u_1 \dot{u}_2 = v_1$ и $v_2 = y \dot{v}_1$, то можно взять в качестве v_1 число 1, на которое делится и x , и y , а сами x и y связаны не будут. Значит, нет дополнительных условий на упорядоченную пару (x, y))

(в) Это отношение - всюдуопределенное, так как для любого x существует $y = -x$, для которого $x + y \leq 0 \Rightarrow \delta_R = Pr_1(R) = \mathbb{D}$.

Аналогично это отношение - всюдузначное. $\Rightarrow \rho_R = Pr_2(R) = \mathbb{D}$.

$R^{-1} = \{(x, y) | (y, x) \in R\} = R$, так как отношение - симметричное.

$$\begin{aligned} R \cdot R &\Leftrightarrow \{t \in \mathbb{D} \times \mathbb{D} | \exists u = (u_1, u_2) \exists v = (v_1, v_2) (u \in R \& v \in R \& pr_1(t) = \\ &= pr_1(u) \& pr_2(u) = pr_1(v) \& pr_2(v) = pr_2(t))\} \sim \\ &\sim \{(x, y) | x, y \in \mathbb{D} \& \exists u \exists v (u_1 + u_2 \leq 0 \& v_1 + v_2 \leq 0 \& x = u_1 \& u_2 = v_1 \& v_2 = y)\} \sim \\ &\sim \{(x, y) | x, y \in \mathbb{D}\} \Rightarrow R \cdot R = \mathbb{D} \times \mathbb{D}. \end{aligned}$$

(условие на x, y : $x + v_1 \leq 0$ и $v_1 + y \leq 0$, но всегда можно взять v_1 таким, что оба условия будут выполняться)

В силу симметричности отношения $R \cdot R^{-1} = R^{-1} \cdot R = R \cdot R = \mathbb{D} \times \mathbb{D}$.

§ 2.9(а, в)

Условие Доказать, что:

(а) $\delta_R = \emptyset \Leftrightarrow R = \emptyset \Leftrightarrow \rho_R = \emptyset$;

(в) $\delta_{R_1 \cdot R_2} = R_1^{-1}(\rho_{R_1} \cap \delta_{R_2})$.

Решение (а) $\delta_R = \emptyset \Leftrightarrow \forall u \in \cup \cup R \forall v (u, v) \notin R \Leftrightarrow R = \emptyset$

$\rho_R = \emptyset \Leftrightarrow \forall v \in \cup \cup R \forall u (u, v) \notin R \Leftrightarrow R = \emptyset$

(в) $x \in \delta_{R_1 \cdot R_2} \Leftrightarrow \exists y : (x, y) \in R_1 \cdot R_2 \Leftrightarrow \exists y : \exists u \exists v (u \in R_1 \& v \in R_2 \& x = u_1 \& u_2 = v_1 \& v_2 = y) \Leftrightarrow \exists y \exists z = u_2 = v_1 : (x = u_1, z) \in R_1 \& (z, y = v_2) \in R_2 \Leftrightarrow \exists z : (x, z) \in R_1 \& z \in \delta_{R_2} \Leftrightarrow \exists z : (z, x) \in R_1^{-1} \& z \in \rho_{R_1} \& z \in \delta_{R_2} \Leftrightarrow x \in R_1^{-1}(\rho_{R_1} \cap \delta_{R_2})$.

§ 2.12 (б, г)

Условие Доказать, что для любых бинарных отношений:

б) $(R^{-1})^{-1} = R$;

г) $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$.

Решение

§ 2.13

Условие Для каких бинарных отношений R справедливо $R^{-1} = -R$?

Решение Пусть $R \subseteq A \times B$.

- 1) Предположим, что $x \in A \cap B$. Тогда $(x, x) \in R \Leftrightarrow (x, x) \in R^{-1}$. Если $R^{-1} = -R$, то получим, что (x, x) лежит и в отношении, и в его дополнении, чего быть не может.
- 2) Значит, $A \cap B = \emptyset$. По определению $R \subseteq A \times B$, $R^{-1} \subseteq B \times A$. Значит, $-R = R^{-1} = \emptyset$. Получим, что $R = \emptyset$ и $R = A \times B$, что возможно только при $A = B = \emptyset$.

§ 2.14

Условие Пусть A и B - конечные множества, состоящие из m и n элементов соответственно.

- а) Сколько существует бинарных отношений между элементами множеств A и B ?
- б) Сколько имеется функций из A в B ?
- в) Сколько имеется 1-1-функций из A в B ?
- г) При каких m и n существует взаимно однозначное соответствие между A и B ?

Решение а) Столько, сколько подмножеств у множества упорядоченных пар элементов A и B . Всего пар mn , бинарных отношений 2^{mn} .

б) Функция по определению - это всюдуопределенное прямое однозначное бинарное отношение, то есть каждый элемент множества A (из m штук) входит в отношение ровно с одним элементом множества B (из n штук). Тогда всего функций $\underbrace{n \cdot \dots \cdot n}_m = n^m$.

в) Функция f называется 1-1-функцией, если $\forall x_1, x_2, y: y = f(x_1), y = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Если $n < m$, то не существует ни одной такой функции, так как не для всех элементов множества A найдется элемент B , входящий с ним в отношение. Если $n \geq m$, то число таких функций равно $n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-m+1)$, так как выбор каждой новой "пары" для элемента множества A уменьшает на 1 количество возможных пар для прочих элементов множества A .

г) При $m = n$, тогда и только тогда каждый элемент множества A сможет входить в отношение ровно с одним элементом множества B и наоборот.

§ 2.22

Условие Доказать, что если f есть функция из A в B и g есть функция из B в C , то $f \cdot g$ есть функция из A в C . (???Имелось в виду $g \cdot f$ - функция из A в C ???)

Решение $g \cdot f \Leftarrow \{t \in Pr_1(f) \times Pr_2(g) | \dots\}$. $Pr_1(f) = A$, $Pr_2(g) = C \Rightarrow g \cdot f : A \rightarrow C$.

§ 2.25(а-д)

Условие Доказать, что можно установить взаимно однозначное соответствие между множествами:

- а) $A \times B$ и $B \times A$;
- б) $A \times (B \times C)$ и $(A \times B) \times C$;
- в) $(A \times B)^C$ и $A^C \times B^C$;
- г) $(A^B)^C$ и $A^{B \times C}$;
- д) $A^{B \cup C}$ и $A^B \times A^C$, если $B \cap C = \emptyset$.

Решение а) Предъявим это соответствие: $\forall x \in A, y \in B : (x, y) \in A \times B \leftrightarrow (y, x) \in B \times A$, то есть любой упорядоченной паре из первого векторного произведения соответствует ровно одна из второго и наоборот.
б)

§ 2.31(а)

Условие Доказать, что для любой функции f :
а) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

Решение

$$\begin{aligned} f[A \cup B] &= \{y \in Pr_2(f) | \exists x(x \in A \cup B \ \& \ (x, y) \in f)\} \\ \exists x(x \in A \cup B \ \& \ (x, y) \in f) &\sim \exists x(x \in A \vee x \in B \ \& \ (x, y) \in f) \sim \\ &\sim \exists x(x \in A \ \& \ (x, y) \in f) \vee (x \in B \ \& \ (x, y) \in f) \end{aligned}$$

Значит, $f[A \cup B] = f[A] \cup f[B]$.

§ 2.32(а)

Условие Доказать, что для любой функции f :
а) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$.

Решение

$$\begin{aligned} f[A \cap B] &= \{y \in Pr_2(f) | \exists x(x \in A \cap B \ \& \ (x, y) \in f)\} \\ \exists x(x \in A \cap B \ \& \ (x, y) \in f) &\sim \exists x(x \in A \ \& \ x \in B \ \& \ (x, y) \in f) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists x(x \in A \ \& \ (x, y) \in f) \ \& \ (x \in B \ \& \ (x, y) \in f) \end{aligned}$$

Значит, $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$.

§ 2.34

Условие Доказать, что $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$ для любой функции f .

Решение

$$\begin{aligned} f[A] \setminus f[B] &= \{y \in Pr_2(f) | \exists x(x \in A \ \& \ (x, y) \in f) \ \& \ \neg \exists x(x \in B \ \& \ (x, y) \in f)\}. \\ \exists x(x \in A \ \& \ (x, y) \in f) \ \& \ \forall x \neg(x \in B \ \& \ (x, y) \in f) &\Rightarrow \\ \Rightarrow \exists x(x \in A \ \& \ (x, y) \in f) \ \& \ (x \notin B \vee (x, y) \notin f) &\sim \\ \sim \exists x(x \in A \ \& \ x \notin B \ \& \ (x, y) \in f). & \end{aligned}$$

Значит, $f[A] \setminus f[B] \subseteq f[A \setminus B]$.

§ 2.35

Условие Доказать, что если в предыдущем примере f есть 1-1-функция, то выполняется равенство.

Решение Пусть f является 1-1-функцией, то есть $\forall x_1, x_2, y : y = f(x_1), y = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Включение в одну сторону доказано в предыдущей задаче.

$y \in f(A \setminus B) \Rightarrow \exists! x \in A \setminus B : y = f(x) \Rightarrow y \in f(A)$. Так как для элемента y образа существует единственный прообраз, то $\forall z \in B f(z) \neq y$ (потому что элемент x такой, что $f(x) = y$, лежит в $A \setminus B$, значит, не лежит в B). $\Rightarrow y \notin f(B) \Rightarrow y \in f(A) \setminus f(B) \Rightarrow f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$.

Вместе с результатом предыдущей задачи получаем:

$$f(A) \setminus f(B) = f(A \setminus B).$$

§ 2.38(а, в, д)

Условие Доказать следующие тождества для любой функции f :

а) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$;

в) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$;

д) $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$.

Решение а)

$$\begin{aligned} f^{-1} &\Leftarrow \{t \in Pr_2(f) \times Pr_1(f) | f(pr_2(t)) = pr_1(t)\}, \\ f^{-1}[A \cup B] &\Leftarrow \{v \in Pr_2(f^{-1}) | \exists p(p \in A \cup B) \ \& \ (p, v) \in f^{-1}\} \sim \\ &\sim \{v \in Pr_1(f) | \exists p(p \in A \cup B) \ \& \ f(v) = p\} \sim \\ &\sim \{v \in Pr_1(f) | \exists p(p \in A \vee p \in B) \ \& \ f(v) = p\} \sim \\ &\sim \{v \in Pr_1(f) | \exists p(p \in A) \vee \exists p(p \in B) : f(v) = p\} \Rightarrow f^{-1}[A \cup B] = f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B]. \end{aligned}$$

Условие в) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$;

Решение

$$\begin{aligned} f^{-1}[A \cap B] &\Leftarrow \{v \in Pr_2(f^{-1}) | \exists p(p \in A \cap B) \ \& \ (p, v) \in f^{-1}\} \\ \exists p(p \in A \cap B) \ \& \ ((p, v) \in f^{-1}) &\sim \exists p(p \in A \ \& \ p \in B) \ \& \ ((p, v) \in f^{-1}) \sim \\ \sim \exists p(p \in A) \ \& \ ((p, v) \in f^{-1}) \ \& \ (p \in B) &\Rightarrow f^{-1}[A \cap B] = f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B] \end{aligned}$$

3 Мощности множеств

§ 4.1

Условие Доказать, что:

$A \smile A$ (рефлексивность)

Если $A \smile B$, то $B \smile A$ (симметричность)

Если $A \smile B$ и $B \smile C$, то $A \smile C$ (транзитивность)

Решение

§ 4.5

Условие Доказать, что:

а) Всякое подмножество конечного множества конечно

б) Объединение конечного числа конечных множеств конечно

в) Прямое произведение конечного числа конечных множеств конечно

Доказательство

Доказательство от противного

§ 4.8

Условие Доказать, что множество тогда и только тогда бесконечно, когда оно эквивалентно некоторому своему подмножеству.

Доказательство

В условии имеется в виду, подмножество не равно множеству, т.к. иначе есть контрпример.

$\{1\}$ эквивалентен $\{1\}$

Докажем лемму о том, что счетное множество $A \sim A \setminus B$, где B конечное множество.

A - счетное, значит все его элементы можно пронумеровать.

Возьмем множество $A \setminus B$, его мы тоже можем пронумеровать, сдвигая каждый раз нумерацию.

\Rightarrow) Если множество бесконечно, то в нем есть счетное подмножество $\Rightarrow \exists$ подмножество нашего счетного множества, которое ему \sim

\Leftarrow) Если множество \sim своему подмножеству, то оно не может быть конечным, доказывается от противного \Rightarrow оно бесконечно.

§ 4.10 а

Условие Пусть область определения счетна, доказать, что область значений этой функции конечна или счетна.

Доказательство

Докажем, что она не более чем счетна.

Т.к. область определения счетна, а каждой точке из области определения можно поставить в соответствие значение функции в этой точке \Rightarrow область значений не более чем счетна \Rightarrow область значений этой функции конечна или счетна.

§ 4.13

Условие Доказать, что:

а) Если A бесконечно и B - конечное или счетное множество, то $A \cup B \sim A$

Доказательство Рассмотрим 2 варианта A счетно и A не счетно.

Докажем от противного, что в каждом из этих случаев $A \cup B$ счетно и $A \cup B$ не счетно соответственно.

Условие б) Если A бесконечно и несчетно, B конечное или счетное множество, то $A \setminus B \sim A$

Доказательство Пусть это не так $\Rightarrow A \setminus B$ - счетно или конечно. Доказываем от противного, что это невозможно.

§ 4.15

Условие Доказать, что:


а) Множество целых чисел счетно

Доказательство пронумеруем

1	2	3	4	5	6	7	8	...
0	1	-1	2	-2	3	-3	4	...

Условие б) Множество рациональных чисел счетно

Доказательство пронумеруем



Условие в) Множество рациональных чисел сегмента $[a, b]$ счетно при $a < b$

Доказательство Множество рациональных чисел сегмента $[a, b]$ - бесконечно. (тк множество плотно)

\Rightarrow оно не менее чем счетно. Но по доказанному выше оно не более, чем счетно \Rightarrow счетно.

Условие г) Множество пар $\langle x, y \rangle$, где x и y - рациональные числа, счетно

Доказательство Множество рациональных чисел счетно.

Тогда выпишем все рациональные числа сеткой и докажем, что кол-во пар счетно аналогично доказательству 4.15 б

§ 4.16

Условие Доказать, что множество всех конечных последовательностей, составленных из элементов некоторого счетного множества, есть счетное множество.

Доказательство Докажем, что множество последовательностей длины n счетно.

Используя 4.15 Г мы знаем, что счетно * счетно = счетно

\Rightarrow счетноеⁿ = счетное.

Кол-во последовательностей конечной длины счетно \Rightarrow множество всех последовательностей конечной длины тоже счетно.

§ 4.18

Условие Доказать, что множество многочленов от одной переменной с целыми коэффициентами счетно.

Доказательство Многочлен от одной переменной с целыми коэффициентами представляет из себя конечную последовательность целых чисел \Rightarrow сводится к задаче 4.16

§ 4.19

Условие Доказать счетность множества алгебраических чисел, т. е. чисел, являющихся корнями многочленов от одной переменной с целыми коэффициентами.

Доказательство Кол-во корней у многочлена степени n не более, чем n .

Тк кол-во многочленов с целыми коэффициентами от одной переменной счетно (по задаче 4.18), то и кол-во корней счетно.

Тк можем пронумеровать.

§ 4.20

Условие Доказать, что любое множество попарно непересекающихся открытых интервалов на действительной прямой не более чем счетно.

Доказательство Кол-во рациональных чисел счетно. А в каждом интервале есть хотя бы одно рациональное число \Rightarrow интервалов не более чем счетное кол-во.

§ 4.23

Условие Доказать, что множество точек разрыва монотонной функции на действительной оси не более, чем счетно.

Доказательство У монотонной функции каждая точка разрыва соответствует интервалу на оси Y

Эти интервалы попарно непересекающиеся \Rightarrow по задаче 4.20 множество не более, чем счетно.

§ 4.24

Условие Доказать, что:

а) $(0, 1) \sim [0, 1] \sim (0, 1] \sim [0, 1)$

Доказательство

$(0, 1) \sim [0, 1]$

$1/2 \leftrightarrow 0$

$1/4 \leftrightarrow 1$

$1/k^n \leftrightarrow 4/k^n$

остальные числа переведем в себя же соответственно

$(0, 1] \sim [0, 1]$

$1 \leftrightarrow 1$

$1/2 \leftrightarrow 0$

$1/k^n \leftrightarrow 2/k^n$

остальные числа переведем в себя же соответственно

$(0, 1] \sim [0, 1)$

$x \leftrightarrow 1/2 - |1/2 - x|$ (симметрично относительно $1/2$)

Доказательство Докажем от противного.

Пусть их нет. Тогда $\mathbb{R} \sim$ множество алгебраических чисел.

Но \mathbb{R} более чем счетно, а множество всех алгебраических чисел счетно
 \Rightarrow существуют неалгебраические числа.

§ 4.36

Условие

Решение

§ 4.38

Условие

Решение

§ 4.39

Условие

Решение

§ 4.42

Условие

Решение

4 Отношение эквивалентности

§ 3.6

Условие Построить бинарное отношение

а) рефлексивное, симметричное, не транзитивное

Решение a - нормированное пространство

$$r \subseteq a * a : (x, y) \in r \leftrightarrow \|x - y\| \leq \delta$$

$$\text{реф. : } \forall x \|x - x\| = 0 \leq s$$

$$\text{симм. : } \|x - y\| = \|y - x\|$$

$$\text{Транзитивности нет } \|x - y\| \leq s \text{ и } \|y - z\| \leq s \Rightarrow \|x - z\| \leq s$$

Условие б) рефлексивное, антисимметричное, не транзитивное

Решение $r \subseteq \mathbb{R} * \mathbb{R} : (x, y) \in r \leftrightarrow x \leq y \leq x^2$
 реф. : $\forall x(x, x) \in r$
 антисимметрично: $x \leq y \leq x^2$ и $y \leq x \leq y^2 \Rightarrow x = y$
 не транз. : $(2, 3) \in r, (3, 8) \in r, (2, 8) \notin r$

Условие в) рефлексивное, не симметричное, транзитивное

Решение \leq на \mathbb{R}
 $x \leq x$
 $x \leq y, y \leq z \rightarrow x \leq z$
 $x \leq y \nrightarrow y \leq x$

Условие г) антисимметричное, транзитивное, не рефлексивное

Решение $a \in \mathbb{R}$
 $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
 $r = \{(a; a)\}$

§ 3.7

Условие а) Построить бинарное отношение, симметричное, транзитивное, но не рефлексивное.

Решение $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
 $a \in \mathbb{R}$
 $r = \{(a; a)\}$

Условие б) Доказать, что если R есть транзитивное и симметричное отношение на множестве A и $\delta_R \cup \rho_R = A$, то R есть эквивалентность на A .

Решение тк $\delta_R \cup \rho_R = A$, то $\exists x \in a \exists y :$
 либо $(x, y) \in R$ либо $(y, x) \in R$
 Из симметричности $(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \rightarrow (x, x) \in R$
 Те R - отношение эквивалентности.

§ 3.8

Условие Доказать, что если R симметрично и антисимметрично, то оно транзитивно

Решение Симметричность $(x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R$
 Антисимметричность $(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \rightarrow y = x$
 Значит в R лежат только пары вида $(x, x) \Rightarrow$ транзитивно

§ 3.9

Условие Доказать, что отношение R на множестве a одновременно эквивалентностью и частичным порядком тогда и только тогда, когда $R = i_a$

Решение Если $R = i_a$, то очевидно выполнены рефлексивность, симметричность, антисимметричность и транзитивность.

Обратно:

Рефлексивность $\Rightarrow \forall x \in a (x, x) \in R \Rightarrow i_a \in R$

Симметричность и антисимметричность $x = y \Rightarrow R \in i_a$

§ 3.11

Условие a - множество всех прямых в \mathbb{R}^2 , являются ли эквивалентностями следующие отношения? а) параллельность б) перпендикулярность

Решение а) является $a \parallel x$

$x \parallel y \rightarrow y \parallel x$

$x \parallel y \wedge y \parallel z \rightarrow x \parallel z$

б) нет $\neg x \perp x$

§ 3.12

Условие Определим на \mathbb{R} отношение

$a \text{ r } b \leftrightarrow (a - b) \in \mathbb{Q}$

Доказать, что r - эквивалентность

Решение $a - a = 0 \in \mathbb{Q}$

$a - b \in \mathbb{Q} \rightarrow (b - a) = -(a - b) \in \mathbb{Q}$

$(a - b) \in \mathbb{Q} (b - c) \in \mathbb{Q} \rightarrow (a - c) = (a - b) + (b - c) \in \mathbb{Q}$

§ 3.17

Условие Доказать, что существуют взаимнооднозначные соответствия между классом всех разбиений множества a и семейством всех отношений эквивалентности на a

Доказательство разбиение $\{a_i\}_{i \in I}$ ставит в соответствие $(x, y) \in r \leftrightarrow \exists i : x \in a_i, y \in a_i$

§ 3.19

Условие

Решение

§ 3.20

Условие

Решение

5 Упорядоченные множества и ординальные числа

§ 3.30

Условие а) Доказать, что всякое частично упорядоченное множество содержит не более одного наибольшего элемента. б) Доказать, что наибольший (наименьший) элемент частично упорядоченного множества является единственным максимальным (минимальным) элементом. в) Построить пример частично упорядоченного множества, имеющего точно один минимальный элемент, но не имеющего наименьшего элемента.

Решение а) и б) доказываются от противного. в) Возьмем множество всех целых чисел, где нет наименьшего и минимального элемента и добавим к этому множеству элемент a , который ни с одним из остальных не сравним, что делает его минимальным, но не наименьшим. Получаем множество с 1 минимальным и без наименьших.

§ 3.39

Условие Доказать, что любое частично упорядоченное множество A изоморфно некоторой системе подмножеств A , упорядоченной включением \subseteq .

Решение Докажем по построению. Построим систему подмножеств начиная с минимальных и наименьших элементов. Построим из них множества из 1-го элемента, дальше, возьмем элементы которые сравнимы с ними и прибавим к ним эти элементы. И опять найдем наименьшие и минимальных, убрав предыдущие.

§ 3.42

Условие Построить линейный порядок на множестве:

а) \mathcal{N}^2

б) $\mathcal{N} \cup \mathcal{N}^2 \cup \dots \cup \mathcal{N}^n \cup$

в) \mathcal{B} комплексных чисел

Решение

§ 3.49

Условие

Решение

§ 3.54

Условие Доказать, что любое подмножество множества $P(A)$, частично упорядоченное по включению, имеет точную верхнюю грань и точную нижнюю грань.

Решение

§ 5.13

Условие

Решение

§ 5.14

Условие

Решение

§ 5.38

Условие

Решение

§ 5.46

Условие

Решение

§ 5.47

Условие

Решение

§ 5.48

Условие

Решение

§ 5.50

Условие

Решение

§ 5.51

Условие

Решение

§ 5.66

Условие

