

Semaine 19 - Équations Différentielles

PSI

Contents

1	Soit (E) $xy' - 2y = x^4$. Résoudre (E) sur \mathbb{R}_+^* et \mathbb{R}_-^* . Existe-t-il des solutions sur \mathbb{R} ?	2
2	Soit $a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue et intégrable. Établir que les solutions de l'équation différentielle $y' - a(t)y = 0$ sont bornées sur \mathbb{R}_+	4
3	Résoudre $y'' + 4y = 2 \sin^2(x)$	5
4	Résoudre $y'' + xy' + y = 0$ en cherchant des solutions développables en série entière.	6
5	Résoudre (E) $x^2y'' + y = 0$ sur \mathbb{R}_+^* en utilisant le changement de variable $t = \ln(x)$	8
6	Résoudre le système : $\begin{cases} x' = -x + 3y + 1 \\ y' = -2x + 4y \end{cases}$	9

**1 Soit (E) $xy' - 2y = x^4$. Résoudre (E) sur \mathbb{R}_+^* et \mathbb{R}_-^* .
Existe-t-il des solutions sur \mathbb{R} ?**

→ On normalise :

$$\text{Sur } I_1 = \mathbb{R}_+^* \quad y' = \frac{2}{x}y + x^3$$

$$\text{Sur } I_2 = \mathbb{R}_-^* \quad y' = \frac{2}{x}y + x^3$$

→ Résolution sur I_1 :

$$(E_H) \quad y' = \frac{2}{x}y$$

$$\text{Posons } \varphi_0 : x \mapsto \exp(2 \ln |x|) = |x|^2 = x^2$$

(φ_0) base de $\text{Sol}_{I_1}(E_H)$

Sol particulière (Méthode de variation de la constante) :

$$\varphi_p : x \mapsto \lambda(x)\varphi_0(x) \quad \text{Avec } \lambda \text{ dérivable}$$

$$\varphi_p \text{ sol de } (E) \Rightarrow \forall x > 0, \quad \lambda'(x)\varphi_0(x) = x^3$$

$$\Rightarrow \forall x > 0, \quad \lambda'(x) = \frac{x^3}{x^2} = x$$

$$\Rightarrow \lambda(x) = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\text{On choisit } C = 0. \text{ Donc } \varphi_p(x) = \frac{x^2}{2}x^2 = \frac{x^4}{2}$$

$$\text{Donc } \text{Sol}_{I_1}(E) = \left\{ x \mapsto \lambda x^2 + \frac{x^4}{2}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{De même } \text{Sol}_{I_2}(E) = \left\{ x \mapsto \alpha x^2 + \frac{x^4}{2}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

*** Trouvons les solutions sur \mathbb{R} .**

Analyse

Soit φ solution de (E) sur \mathbb{R} .

Donc $\varphi|_{\mathbb{R}_+^*}$ sol sur \mathbb{R}_+^* et $\varphi|_{\mathbb{R}_-^*}$ sol sur \mathbb{R}_-^*

$$\text{Donc } \exists(\lambda, \alpha) \in \mathbb{R}^2 \text{ tq } x \mapsto \begin{cases} \lambda x^2 + \frac{x^4}{2} & \text{si } x > 0 \\ \alpha x^2 + \frac{x^4}{2} & \text{si } x < 0 \\ \varphi(0) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Or φ est continue en 0

$$\varphi(0) = \lim_{0+} \varphi = \lim_{0-} \varphi = 0$$

On sait aussi que φ dérivable en 0

MAIS donne aucune information sur α et λ .

$$\begin{cases} \forall x > 0, \quad \varphi'(x) = 2\lambda x + 2x^3 \xrightarrow{0} 0 \\ \forall x < 0, \quad \varphi'(x) = 2\alpha x + 2x^3 \xrightarrow{0} 0 \end{cases}$$

Synthèse

$$\text{Posons } \varphi : x \mapsto \begin{cases} \lambda x^2 + \frac{x^4}{2} & \text{si } x > 0 \\ \alpha x^2 + \frac{x^4}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \lambda, \alpha \in \mathbb{R}$$

→ φ est bien continue et dérivable sur \mathbb{R} .

(pas de problème en 0 pour la continuité)

($\lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) = 0$ théo sur la limite des dérivées)

$\rightarrow \varphi$ est solution de (E) sur \mathbb{R}_+^* et sur \mathbb{R}_-^*

\rightarrow en $x = 0$

$$0 \times \varphi'(0) - 2\varphi(0) = 0$$

Donc $\varphi \in \text{Sol}_{\mathbb{R}}(E)$

$$\text{Sol}_{\mathbb{R}}(E) = \left\{ x \mapsto \begin{cases} \lambda x^2 + \frac{x^4}{2} & \text{si } x \geq 0 \\ \alpha x^2 + \frac{x^4}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}, (\lambda, \alpha) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

2 Soit $a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue et intégrable.

Établir que les solutions de l'équation différentielle $y' - a(t)y = 0$ sont bornées sur \mathbb{R}_+ .

$$\varphi_0 : t \longmapsto \exp \left(\int_0^t a(x) dx \right)$$

(E) est une équation différentielle linéaire du 1er ordre homogène

Donc (φ_0) est une base de $Sol_{\mathbb{R}_+}(E)$

Soit $f \in Sol_{\mathbb{R}_+}(E)$

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad f = \lambda \varphi_0$$

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}_+, \quad |f(t)| &= \left| \lambda \exp \left(\int_0^t a(x) dx \right) \right| \\ &= |\lambda| \exp \left(\int_0^t a(x) dx \right) \end{aligned}$$

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad \int_0^t a(x) dx \leq \int_0^t |a(x)| dx \leq \int_0^{+\infty} |a(x)| dx$$

car a est intégrable sur \mathbb{R}_+

Donc $\int_0^{+\infty} |a(x)| dx$ CV

Or l'exponentielle est croissante sur \mathbb{R}

$$\text{Donc } \exp \left(\int_0^t a(x) dx \right) \leq \underbrace{\exp \left(\int_0^{+\infty} |a(x)| dx \right)}_{=cst}$$

Donc f est bornée sur \mathbb{R}

3 Résoudre $y'' + 4y = 2 \sin^2(x)$.

On sait que $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x)$

Donc $2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x)$

$$(E) \quad y'' + 4y = 1 - \cos(2x)$$

$$(E_H) \quad y'' + 4y = 0$$

$$(*) \quad r^2 + 4 = 0 \iff r = \pm 2i$$

$$\text{Sol}(E_H) = \text{Vect}(x \mapsto \cos(2x), x \mapsto \sin(2x))$$

*** Solution particulière**

$$\text{Posons } (E_1) \quad y'' + 4y = 1$$

$$(E_2) \quad y'' + 4y = -\cos(2x)$$

→ Solution particulière de (E_1)

$$\psi_1 : x \mapsto \frac{1}{4} \text{ sol part évidente}$$

→ Sol part de (E_2)

$$\text{On pose } E_{\mathbb{C}} : z'' + 4z = -e^{2ix}$$

$$\text{Sol}_{E_{\mathbb{C},H}} = \text{Vect}(x \mapsto e^{2ix}, x \mapsto e^{-2ix})$$

$$\psi_2(x) = \lambda x e^{2ix}$$

ψ_2 est solution de $E_{\mathbb{C}}$

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad \psi_2'(x) &= \lambda e^{2ix}(1 + 2ix) \\ \psi_2''(x) &= \lambda e^{2ix}(2i + 2i(1 + 2ix)) \\ &= \lambda e^{2ix}(4i - 4x) \end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda e^{2ix}(4i - 4x) + 4\lambda x e^{2ix} = -e^{2ix}$$

$$\iff 4i\lambda = -1$$

$$\iff \lambda = \frac{-1}{4i} \iff \lambda = \frac{i}{4}$$

$$\Rightarrow \psi_2(x) = \frac{ix}{4} e^{2ix}$$

Donc $\text{Re}(\psi_2)$ est sol part de (E_2) .

$$g_2 : x \mapsto -\frac{x}{4} \sin(2x)$$

Donc d'après le principe de superposition :

$$\psi_p : x \mapsto \frac{1}{4} - \frac{x}{4} \sin(2x) \text{ est sol part de } E$$

$\text{Sol}_{\mathbb{R}}(E) = \left\{ x \mapsto \left(A - \frac{x}{4} \right) \sin(2x) + B \cos(2x) + \frac{1}{4}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$

4 Résoudre $y'' + xy' + y = 0$ en cherchant des solutions développables en série entière.

$$(E) \quad y'' + xy' + y = 0$$

On pose $y(x) = \sum a_n x^n$ avec $R > 0$.

y solution de (E) sur $] -R, R[$

$$\iff \forall x \in] -R, R[, \quad \sum_{n=2}^{+\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{+\infty} a_n n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0$$

$$\iff \forall x \in] -R, R[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0$$

$\iff \forall n \in \mathbb{N}$, par unicité des coefficients d'une série entière :

$$a_{n+2}(n+2)(n+1) + n a_n + a_n = 0$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+2} = -\frac{(n+1)}{(n+2)(n+1)} a_n$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+2} = -\frac{a_n}{n+2} \quad (*)$$

Analyse : Si y sol de (E)

Si $n = 2p$,

$$\begin{aligned} a_{2p} &= -\frac{a_{2p-2}}{2p} = \frac{-1}{2p} \times \frac{-1}{2(p-1)} a_{2(p-1)} \\ &= \frac{-1}{2p} \times \frac{-1}{2(p-1)} \times \frac{-1}{2(p-2)} \times \cdots \times \frac{-1}{2 \times 1} a_0 \end{aligned}$$

$$\boxed{a_{2p} = \frac{(-1)^p}{2^p p!} a_0}$$

Si $n = 2p + 1$,

$$a_{2p+1} = \frac{-a_{2p-1}}{2p+1} = \frac{-1}{2p+1} \times \frac{-1}{2p-1} \times \cdots \times \frac{-1}{3} a_1$$

$$a_{2p+1} = \frac{(-1)^p}{(2p+1)(2p-1)\dots 1} a_1$$

$$\boxed{a_{2p+1} = \frac{(-1)^p 2^p p!}{(2p+1)!} a_1}$$

$$\text{Donc } y(x) = a_0 \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{2^p p!} x^{2p} \right) + a_1 \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p 2^p p!}{(2p+1)!} x^{2p+1} \right)$$

y solution de (E) sur $] -R, R[$ avec les coefficients vérifiant $(*)$.

Rayon de convergence ?

- $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{2^p p!} x^{2p} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{p!} \left(\frac{-x^2}{2} \right)^p = e^{-x^2/2}$

Série exp, CV $\forall x \in \mathbb{R}$.

$$R_1 = +\infty.$$

- $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p 2^p p!}{(2p+1)!} x^{2p+1}$

Posons $u_p = \left| \frac{(-1)^p 2^p p!}{(2p+1)!} x^{2p+1} \right| = \frac{2^p p! |x|^{2p+1}}{(2p+1)!} > 0$ si $x \neq 0$

$$\frac{u_{p+1}}{u_p} = \frac{2(p+1)|x|^2}{(2p+3)(2p+2)} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$$

D'après la règle de d'Alembert, la série converge $\forall x \in \mathbb{R}$.

Donc $R_2 = +\infty$.

Donc il y a un Rayon de convergence $R = +\infty$.

Posons $\varphi_1 : x \mapsto e^{-x^2/2}$
 $\varphi_2 : x \mapsto \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p 2^p p!}{(2p+1)!} x^{2p+1}$

- φ_1, φ_2 sont sol de E sur \mathbb{R} .
- (φ_1, φ_2) famille libre car φ_1 paire et φ_2 impaire.
- (E) est une EDL du 2^{nd} ordre homogène, normalisée à coefficients continus sur \mathbb{R} .
Donc $\text{sol}_{\mathbb{R}}(E)$ est un \mathbb{R} -ev de dim 2.

Donc $\boxed{\text{sol}_{\mathbb{R}}(E) = \text{Vect}(\varphi_1, \varphi_2)}$

5 Résoudre (E) $x^2 y'' + y = 0$ sur \mathbb{R}_+^* en utilisant le changement de variable $t = \ln(x)$.

Posons $t = \ln(x)$ ($\Rightarrow e^t = x$)

$$y(x) = y(e^t)$$

$$z(t) = z(\ln(x))$$

y 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^* \Rightarrow z$ 2 fois dérivable $\Rightarrow y$ 2 fois dérivable

Comme y sol de E sur $\mathbb{R}_+^* \iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^2 y''(x) + y(x) = 0$

Or $x \mapsto e^x$ bijection de \mathbb{R} sur \mathbb{R}_+^*

$$\Rightarrow \forall t \in \mathbb{R}, (e^t)^2 y''(e^t) + y(e^t) = 0 \text{ or } z(t) = y(e^t)$$

$$\text{Donc } z'(t) = e^t y'(e^t) \quad z''(t) = e^t y'(e^t) + (e^t)^2 y''(e^t)$$

$$\text{Donc } (\iff) \forall t \in \mathbb{R}, z''(t) - z'(t) + z(t) = 0 \quad (F) \quad (\iff z \text{ sol de } (F) \quad z'' - z' + z = 0)$$

$$(*) \quad r^2 - r + 1 = 0 \quad \Delta = -3 = (i\sqrt{3})^2 \quad r = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Sol}(F) = \left\{ x \mapsto e^{\frac{1}{2}x} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right), (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$z \in \text{Sol}(F) \Rightarrow \exists (A, B) \in \mathbb{R}^2, z : t \mapsto e^{\frac{1}{2}t} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right)$$

$$\Rightarrow \exists (A, B) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } y(x) = z(\ln(x)) \quad y : x \mapsto e^{\frac{1}{2}\ln(x)} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln(x)\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln(x)\right) \right)$$

$$\text{Donc } \boxed{\text{Sol}_{\mathbb{R}_+^*}(E) = \left\{ x \mapsto \sqrt{x} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln x\right) \right), (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}}$$

6 Résoudre le système : $\begin{cases} x' = -x + 3y + 1 \\ y' = -2x + 4y \end{cases}$

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$X \text{ sol de } (S) \iff \forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = AX(t) + B$$

- $\chi_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A)$
 $= X^2 - 3X + 2$

Donc $Sp(A) = \{1, 2\}$

A est une matrice de taille 2, elle a 2 vap différentes.

Donc A est diagonalisable.

Cherchons une base de \mathbb{R}^2 formée de vecteurs propres.

$$E_1(A) = \text{Ker}(A - I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}. \text{ On a } u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \in E_1(A)$$

$$E_2(A) = \text{Ker}(A - 2I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}. \text{ On a } u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in E_2(A)$$

$\mathcal{B} = (u_1, u_2)$ Base de \mathbb{R}^2 formée de vep.

$$P = \text{Pass}_{\mathcal{B} \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

On a $P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$X \text{ sol de } (S) \iff X = PY \iff Y' = DY + P^{-1}B$$

Or $P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

$$P^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Sol de } (S) \iff \begin{cases} y_1' = y_1 + 1 \\ y_2' = 2y_2 - 2 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y_1(t) = C_1 e^t - 1 \\ y_2(t) = C_2 e^{2t} + 1 \end{cases} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$\iff X(t) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 e^t - 1 \\ C_2 e^{2t} + 1 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(C_1 e^t - 1) + (C_2 e^{2t} + 1) \\ 2(C_1 e^t - 1) + (C_2 e^{2t} + 1) \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3C_1 e^t + C_2 e^{2t} - 3 + 1 \\ 2C_1 e^t + C_2 e^{2t} - 2 + 1 \end{pmatrix}$$

Donc
$$\boxed{\begin{cases} x(t) = 3C_1e^t + C_2e^{2t} - 2 \\ y(t) = 2C_1e^t + C_2e^{2t} - 1 \end{cases} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}}$$