Extinción, Persistencia y Comportamiento Umbral en Modelos Compartimentales Estocásticmente Perturbados

UNAM, Juriquilla, Queretaro
2 de diciembre de 2018.

Saúl Díaz Infante Velasco

CONACYT-Universidad de Sonora
sau.diazinfante@gmail.com   https://sauldiazinfantevelasco.wordpress.com

Introducción

Para fijar ideas

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t)$$

$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t)$$

$$\dot{R}(t) = \gamma I(t) - \mu R(t) + \delta S(t)$$

Para fijar ideas

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t)$$

$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t)$$

$$\dot{R}(t) = \gamma I(t) - \mu R(t) + \delta S(t)$$

Umbral determinista

$$\mathscr{R}_0 = \frac{\beta \Lambda}{(\mu + \gamma + \varepsilon)(\mu + \delta)}$$

$$\mathscr{R}_0 < 1 \;\Rightarrow\; \text{FDE} : \; \text{(g.a.s)}$$

$$\mathscr{R}_0 > 1 \;\Rightarrow\; \text{EE} : \;\; \text{(g.a.s)}$$

Para fijar ideas

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t)$$
$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t)$$

Umbral determinista

$$\mathscr{R}_0 = \frac{\beta \Lambda}{(\mu + \gamma + \varepsilon)(\mu + \delta)}$$

$\mathscr{R}_0 < 1 \ \Rightarrow \ FDE : \ (\text{g.a.s})$

$\mathscr{R}_0 > 1 \ \Rightarrow \ EE : \quad (\text{g.a.s})$

Para fijar ideas

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t)$$

$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t)$$

Umbral determinista

$$\mathscr{R}_0 = \frac{\beta \Lambda}{(\mu + \gamma + \varepsilon)(\mu + \delta)}$$

$$\mathscr{R}_0 < 1 \;\Rightarrow\; FDE : \text{(g.a.s)}$$

$$\mathscr{R}_0 > 1 \;\Rightarrow\; EE : \quad \text{(g.a.s)}$$

Para fijar ideas

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t)$$
$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t)$$

$$\beta\,dt \rightsquigarrow \beta\,dt + \sigma\,dB_t$$

Umbral determinista

$$\mathscr{R}_0 = \frac{\beta\Lambda}{(\mu + \gamma + \varepsilon)(\mu + \delta)}$$

$$\mathscr{R}_0 < 1 \;\Rightarrow\; FDE:\; \text{(g.a.s)}$$

$$\mathscr{R}_0 > 1 \;\Rightarrow\; EE:\quad \text{(g.a.s)}$$

Para fijar ideas

mm ──── 40 ──── 60 ──── 80 ──── 100 ──── 120

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t)$$
$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t)$$

$$\boxed{\beta dt \rightsquigarrow \beta dt + \sigma dB_t}$$

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t) - \sigma S(t)I(t)dB_t$$
$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t) + \sigma S(t)I(t)dB_t$$

Umbral determinista

$$\mathscr{R}_0 = \frac{\beta \Lambda}{(\mu + \gamma + \varepsilon)(\mu + \delta)}$$

$$\mathscr{R}_0 < 1 \implies FDE : \text{(g.a.s)}$$

$$\mathscr{R}_0 > 1 \implies EE : \text{(g.a.s)}$$

Para fijar ideas

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t)$$
$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t)$$

$$\beta dt \rightsquigarrow \beta dt + \sigma dB_t$$

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t) - \sigma S(t)I(t)dB_t$$
$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t) + \sigma S(t)I(t)dB_t$$

Umbral determinista

$$\mathscr{R}_0 = \frac{\beta \Lambda}{(\mu + \gamma + \varepsilon)(\mu + \delta)}$$

$\mathscr{R}_0 < 1 \Rightarrow FDE : \text{(g.a.s)}$

$\mathscr{R}_0 > 1 \Rightarrow EE : \text{(g.a.s)}$

Umbral estocástico

$\mathscr{R}_0^S = ?$

$\mathscr{R}_0^S < 1 \Rightarrow \text{extinción}$

$\mathscr{R}_0^S > 1 \Rightarrow \text{persistencia}$

Para fijar ideas

mm

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t)$$
$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t)$$

$$\beta dt \rightsquigarrow \beta dt + \sigma dB_t$$

$$\dot{S}(t) = \Lambda - \mu S(t) - \beta S(t)I(t) - \delta S(t) - \sigma S(t)I(t)dB_t$$
$$\dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \gamma + \varepsilon)I(t) + \sigma S(t)I(t)dB_t$$

Ver:

📄 Zhang, Y., Li, Y., Zhang, Q., and Li, A. (2018).
Behavior of a stochastic SIR epidemic model
with saturated incidence and vaccination rules.
*Physica A: Statistical Mechanics and its
Applications*, 501:178–187.

¿Cuando considerar Modelos Estocásticos?

Sean importantes

- Poblaciones pequeñas
- Variabilidad demográfica
- Variabilidad ambiental

Según:

Allen, L. J. (2017). A primer on stochastic epidemic models: Formulation, numerical simulation, and analysis. *Infectious Disease Modelling*, 2(2):128–142.

¿Cuando considerar Modelos Estocásticos?

Sean importantes

- Poblaciones pequeñas
- Variabilidad demográfica
- Variabilidad ambiental

Ejemplo

Transmisión, recuperación, nacimientos, muertes.

¿Cuando considerar Modelos Estocásticos?

| mm | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |

Sean importantes

- Poblaciones pequeñas
- Variabilidad demográfica
- Variabilidad ambiental

Ejemplo

Transmisión, recuperación, nacimientos, muertes.

- -

Condiciones territoriales, acuáticas: enfermedades vectoriales, zoonóticas transmitidas por alimentos.

80

Alternativas

Modelos

- (D/C)–TMCs
- Perturbación de parámetros
  - Procesos reversibles en media
  - $\beta_t^H\ H \in (0.5, 1)$
- Random Diff. Eq.

MC + ME → SDE

📄 L. J. Allen.
A primer on stochastic epidemic models: Formulation, numerical simulation, and analysis.
Infectious Disease Modelling, 2(2):128–142, may 2017.

Herramientas

- Gillespie
- Kloeden-Methods
- Hermite-PC

Alternativas

Modelos

- (D/C)–TMCs
- Perturbación de parámetros
  - Procesos reversibles en media
  - β_t^H $H \in (0.5, 1)$
- Random Diff. Eq.

$$\varphi dt \rightsquigarrow \varphi dt + \sigma dB_t$$

Gray, A., Greenhalgh, D., Hu, L., Mao, X., and Pan, J. (2011). A Stochastic Differential Equation SIS Epidemic Model. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 71(3):876–902.

Herramientas

- Gillespie
- Kloeden-Methods
- Hermite-PC

Alternativas

Modelos

- (D/C)–TMCs
- **Perturbación de parámetros**
  - Procesos reversibles en media
  - $\beta_t^H \; H \in (0.5, 1)$
- Random Diff. Eq.

Herramientas

- Gillespie
- Kloeden-Methods
- Hermite-PC

$\varphi dt \rightsquigarrow \varphi dt + F(x)dB_t$

📄 Schurz, H. and Tosun, K. (2015).
Stochastic Asymptotic Stability of SIR Model with Variable Diffusion Rates.
Journal of Dynamics and Differential Equations, 27(1):69–82.

Alternativas

Modelos

- (D/C)–TMCs
- **Perturbación de parámetros**
  - Procesos reversibles en media
  - β_t^H $H \in (0.5, 1)$
- Random Diff. Eq.

Herramientas

- Gillespie
- Kloeden-Methods
- Hermite-PC

$$d\varphi_t = (\varphi_e - \varphi_t)dt + \sigma_\varphi dBt$$

📄 Allen, E. (2016). Environmental variability and mean-reverting processes. *Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B*, 21(7):2073–2089.

Alternativas

Modelos

- (D/C)–TMCs
- **Perturbación de parámetros**
  - Procesos reversibles en media
  - β_t^H $H \in (0.5, 1)$
- Random Diff. Eq.

Herramientas

- Gillespie
- Kloeden-Methods
- Hermite-PC

$$d\varphi_t = (\varphi_e - \varphi_t)dt + \sigma_\varphi dBt$$

📄 Ma, Y., Zhang, Q., and Ye, M. (2017).
Mean-square dissipativity of numerical methods for a class of resource-competition models with fractional brownian motion.
Systems Science & Control Engineering, 5(1):268–277.

Alternativas

Modelos

- (D/C)–TMCs
- Perturbación de parámetros
  - Procesos reversibles en media
 - $\beta_t^H \ H \in (0.5, 1)$
- Random Diff. Eq.

Herramientas

- Gillespie
- Kloeden-Methods
- Hermite-PC

parametros son v.a.

📄 Chen-Charpentier, B.-M., Cortés, J.-C., Licea, J.-A., Romero, J.-V, Roselló, M.-D., Santonja, F.-J., and Villanueva, R.-J. (2015). Constructing adaptive generalized polynomial chaos method to measure the uncertainty in continuous models: A computational approach. *Mathematics and Computers in Simulation*, 109:113 – 129.

Alternativas

Modelos

- (D/C)–TMCs
- **Perturbación de parámetros**
  - Procesos reversibles en media
  - $\beta_t^H \ H \in (0.5, 1)$
- Random Diff. Eq.

Herramientas

- Gillespie
- Kloeden-Methods
- Hermite-PC

$\varphi dt \rightsquigarrow \varphi dt + \sigma dB_t$

Gray, A., Greenhalgh, D., Hu, L., Mao, X., and Pan, J. (2011). A Stochastic Differential Equation SIS Epidemic Model. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 71(3):876–902.

Objetivo

Ilustrar las ideas de $\varphi dt \rightsquigarrow \varphi dt + \sigma dB_t$

- Modelación
- Análisis y Simulación
- Perspectivas

Esquema de Charla

1. Introducción

2. Perturbación con MB

3. Propiedades del proceso soulución

4. Umbral: $\mathscr{R}_0^S := \mathscr{R}_0^D - f(\text{noise})$

Perturbación con MB

SDE

Propiedades del proceso soulución

Umbral: $\mathcal{R}_0^S := \mathcal{R}_0^D - f(\text{noise})$