AGROINDUSTRIAL TIVAN S.A.C.
CALIDAD PARA TUS CULTIVOS

CRECIFÁCIL TRIHORMONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este fitorregulador hormonal de crecimiento está compuesto por tres de las principales hormonas vegetales (giberelinas, auxinas y citoquininas), cuyo balance optimiza su interacción para un desarrollo más eficaz y eficiente de las plantas, además de contener microelementos esenciales. Cuando las plantas se encuentran bajo estrés debido a condiciones adversas como temperatura o falta de agua, su capacidad para sintetizar hormonas naturales se ve afectada, lo que impacta negativamente en el rendimiento y la calidad de las cosechas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

La aplicación de este producto ayuda a restablecer la fisiología normal de la planta, promoviendo un crecimiento vigoroso y equilibrando los procesos hormonales necesarios para la diferenciación celular, la formación de órganos, la fecundación y el cuajado de frutos, lo que resulta en cosechas más abundantes y de mejor calidad.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de **CRECIFÁCIL TRIHORMONAL** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Vid, palto, cítricos, arándano	0.25 – 0.5	1. Inicio de floración 2. Después del cuajado
Herbáceos frutales: Fresa	0.25 – 0.5	1. 30 días después del trasplante 2. 15 días después de la primera aplicación
Hortalizas de hoja: Lechuga	0.25 – 0.5	1. Después del brotamiento o trasplante 2. 15 días después de la primera aplicación
Hortalizas de fruto: Pimiento, tomate, zapallo, pepinillo, sandia	0.25 – 0.5	1. 30 días después del trasplante 2. Inicio de floración 3. Después del cuajado
Hortalizas de tallo: Papa, apio	0.25 – 0.5	1. 20 después del brotamiento o trasplante
Hortalizas de bulbo: Cebolla	0.25 – 0.5	1. 20 días después del trasplante 2. 30 días después de la primera aplicación
Hortalizas de vaina: Holantao	0.25 – 0.5	1. Antes de floración 2. 20 días después de la primera aplicación
Cereales: Maíz	0.25 – 0.5	1. Después del brotamiento 2. Antes de la floración 3. Llenado de grano

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos disponibles en el mercado. Se debe evitar su mezcla con productos altamente ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de proceder con cualquier mezcla.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.