AGROINDUSTRIAL TIVAN S.A.C.
CALIDAD PARA TUS CULTIVOS

GREEN POWER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este fertilizante foliar líquido contiene nitrógeno en sus tres formas asimilables (ureico, nítrico y amoniacal) y microelementos quelatizados.
Su formulación balanceada y soluble lo hace ideal para ser utilizado en cualquier etapa fenológica, mejorando la calidad de los productos cosechados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Está diseñado para mejorar el contenido de clorofila y proporcionar un color verde más intenso a las hojas, promoviendo así un crecimiento rápido y vigoroso. Al aumentar el contenido de clorofila, se optimiza la fotosíntesis, lo que incrementa la producción de fotosintatos necesarios para el desarrollo óptimo del cultivo. Además, el nitrógeno en sus diferentes formas permite prevenir y corregir deficiencias de manera eficiente y equilibrada, estimulando el crecimiento vegetativo y mejorando los rendimientos de la cosecha.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de **"GREEN POWER"** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS 1L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Vid, palto, cítricos, arándano	0.5 – 1	1. Después del brotamiento. 2. Antes de floración.
Herbáceos frutales: Fresa	0.5 – 1	1. Después del trasplante. 2. Antes de floración.
Hortalizas de hoja: Lechuga	0.5 – 1	3. Después del brotamiento. 4. 20 a 30 días después de la aplicación anterior.
Hortalizas de fruto: Pimiento, tomate, zapallo, pepinillo, sandia	0.5 – 1	1. Después del trasplante. 2. Antes de la floración.
Hortalizas de tallo: Papa, apio	0.5 – 1	1. 20 después del brotamiento o trasplante.
Hortalizas de bulbo: Cebolla	0.5 – 1	1. 20 días después del trasplante. 2. 20 a 30 días después de la aplicación anterior.
Hortalizas de vaina: Holantao, vainita	0.5 – 1	1. Después del brotamiento. 2. Antes de floración.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos disponibles en el mercado. Se debe evitar su mezcla con productos altamente ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de proceder con cualquier mezcla.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.