AGROINDUSTRIAL TIVAN S.A.C.
CALIDAD PARA TUS CULTIVOS

ECOPOWER 20-20-20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un fertilizante foliar líquido con alto contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, enriquecido con un paquete de microelementos quelatizados necesarios para el desarrollo de los cultivos.
Su formulación balanceada y soluble lo hace ideal para ser utilizado en cualquier etapa fenológica, mejorando la calidad de los productos cosechados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se recomienda iniciar las aplicaciones cuando la planta tenga suficiente follaje y continuar cada 20 días, según sea necesario, durante la etapa de desarrollo vegetativo. Aporta Nitrógeno, que promueve un crecimiento vigoroso, mientras que el Fósforo y el Potasio son esenciales para la formación de nuevas raíces y la calidad de flores y frutos.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de **ECOPOWER 20-20-20** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Palto, cítricos, mango	1 – 2	1. Antes de la floración 2. Después del cuajado de frutos.
Arbusto: Algodón	1 – 2	1. Después del desahije. 2. Antes de la floración 3. Después del cuajado de bellotas
Herbáceos frutales: Fresa	1 – 2	1. Antes de la floración 2. Después del cuajado de frutos
Hortalizas de hoja: Albahaca, espinaca	1 – 2	1. 20 días después de brotamiento 2. 20 a 30 días después de la primera aplicación
Hortalizas de fruto: Ají, paprika, piquillo, tomate	1 – 2	1. 20 días después de brotamiento o trasplante 2. Antes de la floración 3. Después del cuajado de frutos.
Hortalizas de bulbo: Cebolla, ajo	1 – 2	1. Después del trasplante 2. Inicios de la bulbificación
Hortalizas de tallo: Espárrago, papa	1 – 2	Esparrago: 1. 20 días después del trasplante. 2. Repetir cada 20 días hasta la cosecha. Papa: 1. 20 días después del brotamiento 2. 20 a 30 días después de la primera aplicación
Hortalizas de vaina: Frijol, arveja	1 – 2	1. Antes de la floración 2. Después del cuajado de vainas
Cereales: Maíz, arroz	1 – 2	1. Antes de la floración. 2. En llenado de granos, 10 días después de la floración.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.