AGROINDUSTRIAL TIVAN S.A.C.
CALIDAD PARA TUS CULTIVOS

ECOPOWER AMARRE Ca B Zn

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este fertilizante foliar con efecto bioestimulante está formulado con una alta concentración de calcio (10%), boro (1%) y zinc (3.5%), en combinación óptima con aminoácidos libres. Su aplicación maximiza el cuajado de flores y el amarre de frutos, previniendo su caída y corrigiendo deficiencias de estos nutrientes durante la etapa productiva. Además, estimula la producción de hormonas vegetales naturales, promoviendo el desarrollo de brotes, hojas y frutos, lo que resulta en un mejor crecimiento radicular, una floración más eficiente, y frutos de mayor peso, calibre y vida postcosecha.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Fertilizante foliar diseñado para corregir deficiencias de Calcio, boro y zinc, que son clave en la síntesis de la pared celular, la prevención de la caída de órganos productivos, la activación de procesos enzimáticos, la formación de hormonas vegetales y el crecimiento del tubo polínico.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de "**ECOPOWER AMARRE Ca B Zn"** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Vid, palto, cítricos	0.5 – 1	1. Antes de floración 2. Después del cuajado 3. 20 días después de la aplicación anterior
Herbáceos frutales: Fresa	0.5 – 1	1. Antes de floración 2. Después del cuajado 3. 15 días después de la aplicación anterior
Hortalizas de hoja: Lechuga, espinaca	0.5 – 1	1. 15 días después del brotamiento o trasplante 2. 15 o 20 días después de la primera aplicación
Hortalizas de fruto: Ají, paprika, piquillo, tomate, pepinillo, sandia, zapallo	0.5 – 1	1. Antes de la floración 2. Después del cuajado
Hortalizas de bulbo: Cebolla, ajo	0.5 – 1	1. Inicio de bulbificacion 2. 15 días después de la aplicación anterior (1 o 2 veces)
Hortalizas de vaina: Frijol, arveja	0.5 – 1	1. Antes de la floración 2. Después del cuajado de vainas
Hortalizas de tallo: Espárrago	0.5 – 1	1. Después del brotamiento 2. 15 días después de la primera aplicación
Cereales: Arroz	0.5 – 1	1. Antes de floración 2. Llenado de grano

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.