ECOPOWER FÓSFORO P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este fertilizante contiene un alto porcentaje de fósforo, equilibrado con nitrógeno, potasio y microelementos quelatizados como magnesio, zinc, hierro, cobre y manganeso, además de precursores hormonales. Proporciona todos los macro y micronutrientes necesarios para la adecuada nutrición de los cultivos, es 100% soluble en agua y puede aplicarse de forma foliar o a través de sistemas de riego tecnificado en cualquier tipo de suelo y cultivos, ya sean anuales, perennes, hortícolas, frutales, plantas de invernadero u ornamentales. Su alto contenido de fósforo está formulado para asegurar un rápido desarrollo radicular, mejorar la floración y fructificación, y aumentar la producción de azúcares en las plantas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Gracias a su alta concentración de fósforo, este fertilizante es esencial para la formación de la molécula de ATP, encargada de suministrar energía a todos los procesos metabólicos de la planta. Además, el fósforo interviene en la síntesis de nucleoproteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos, elementos clave para el crecimiento y desarrollo celular. También desempeña un papel crucial en la producción y transporte de azúcares, grasas y proteínas, optimizando así la eficiencia metabólica de la planta.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de "**ECOPOWER FÓSFORO P"** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Vid, palto, cítricos	0.5 – 1	1. Inicio del brotamiento 2. Después del cuajado 3. 20 días después de la aplicación anterior
Herbáceos frutales: Fresa	0.5 – 1	1. Inicio de floración 2. Después del cuajado 3. 15 días después de la aplicación anterior
Hortalizas de hoja: Lechuga, espinaca	0.5 – 1	1. 15 días después del brotamiento o trasplante 2. 15 o 20 días después de la primera aplicación
Hortalizas de fruto: Ají, paprika, piquillo, tomate, pepinillo, sandia, zapallo	0.5 – 1	1. 20 o 30 días después del brotamiento o trasplante 2. Inicio de floración 3. 15 días después de la aplicación anterior
Hortalizas de bulbo: Cebolla, ajo	0.5 – 1	1. 20 días después del brotamiento o trasplante 2. Inicio de bulbificación 3. 15 días después de la aplicación anterior (1 o 2 veces)
Hortalizas de vaina: Frijol, arveja	0.5 – 1	1. Inicio de floración 2. Después del cuajado de vainas 3. 15 días después de la aplicación anterior

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.