ECOPOWER HUMIK

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un fertilizante foliar líquido constituido por ácidos húmicos, fúlvicos y micronutrientes que mejoran la fertilidad del suelo, incrementan la actividad microbiana, favorecen la absorción de nutrientes por las plantas y las hacen más resistentes a condiciones adversas y plagas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Los ácidos húmicos y fúlvicos juegan un papel clave en la nutrición de las plantas al mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, favoreciendo el intercambio catiónico, la solubilidad de nutrientes y la retención de agua. Estos ácidos aumentan la absorción de nutrientes por las raíces, mejoran el desarrollo radicular y la calidad de los cultivos, influyendo en la distribución de azúcares y promoviendo la resistencia al marchitamiento. Además, optimizan la estructura del suelo, desbloquean nutrientes no asimilables y potencian la eficacia de los agroquímicos aplicados.
Se recomienda iniciar las aplicaciones cuando la planta tenga suficiente follaje y continuar cada 20 días, según sea necesario, durante la etapa de desarrollo vegetativo.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de "**ECOPOWER HUMIK"** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Vid, palto, cítricos	1 – 2	1. Después del brotamiento 2. Antes de floración
Herbáceos frutales: Fresa	1 – 2	1. Después del brotamiento 2. Antes de floración
Hortalizas de hoja: Albahaca, espinaca	1 – 2	1. Después del brotamiento 2. 20 a 30 días después de la primera aplicación
Hortalizas de fruto: Ají, paprika, piquillo, tomate, pepinillo, sandia, zapallo	1 – 2	1. Después de brotamiento o trasplante 2. Antes de la floración
Hortalizas de bulbo: Cebolla, ajo	1 – 2	1. Después del trasplante 2. Inicios de la bulbificación
Hortalizas de vaina: Frijol, arveja	1 – 2	1. Después del brotamiento 2. Antes de floración

Las aplicaciones vía fertirriego se deben de fraccionar en dosis de 5 – 10L/ha hasta completar 20 – 30L/Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos disponibles en el mercado. Se debe evitar su mezcla con productos altamente ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de proceder con cualquier mezcla.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.