AGROINDUSTRIAL TIVAN S.A.C.
CALIDAD PARA TUS CULTIVOS

ECOPOWER MICRO MIX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un fertilizante líquido, completamente soluble, que contiene micronutrientes equilibrados y quelatados con aminoácidos. Su composición balanceada de micronutrientes lo convierte en una opción ideal para complementar la nutrición y prevenir deficiencias en los cultivos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se trata de un corrector diseñado específicamente para mitigar el estrés multicarencial, causado por la deficiencia simultánea de varios nutrientes, lo que genera un marcado desequilibrio fisiológico en las plantas. Su formulación incluye una gama completa y equilibrada de micronutrientes quelatados, que se caracterizan por su alta solubilidad y eficacia.
Debe aplicarse en las etapas de mayor requerimiento de estos nutrientes. Puede utilizarse solo o en combinación con plaguicidas y otros fertilizantes foliares.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de **"ECOPOWER MICRO MIX"** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Vid, palto, cítricos	0.25 – 0.5	1° Antes de la 1ra. floración 2° Inmediato después del cuajo de los frutos.
Herbáceos frutales: Fresa	0.5 – 1	1° Antes de la floración 2° Después del cuajado de frutos
Hortalizas de hoja: Albahaca, espinaca	0.25 – 0.5	1° 20 días después de brotamiento 2° 15 días después de la primera aplicación
Hortalizas de fruto: Ají, paprika, piquillo, tomate	0.5 – 1	1° Antes de la floración 2° Inmediato después del cuajo de los frutos.
Hortalizas de bulbo: Cebolla, ajo	0.25 – 0.5	1° Después del trasplante 2° Al inicio de la bulbificación
Hortalizas de tallo: Espárrago	0.5 – 1	En Almácigo: 1° A los 60 días de siembra 2° A los 30 días después de la primera. Después del trasplante y cada cosecha: 1° Antes del inicio de la floración 2° A los 30 a 35 días de la 1ra. aplicación.
Hortalizas de vaina: Frijol, arveja	0.5 – 1	1° Antes de la floración 2° Inmediato después del cuajo de las vainas.
Cereales: Arroz	0.5 – 1	1° Antes de la floración 1-2 veces cada 10 días

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos disponibles en el mercado. Se debe evitar su mezcla con productos altamente ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de proceder con cualquier mezcla.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.