ECOPOWER POTASIO K50

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto está desarrollado como una fuente de potasio para prevenir y corregir deficiencias nutricionales o desequilibrios en su asimilación. Su uso incrementa el rendimiento y la calidad de los órganos cosechados, mejorando los niveles de azúcares, grasas, color, sabor y tamaño, al tiempo que prolonga la vida útil de los frutos almacenados en frío, cumpliendo con las exigencias del mercado de exportación. Además, mejora la tolerancia de la planta a situaciones de estrés como heladas, sequías y enfermedades, gracias a su capacidad para regular rápidamente la presión osmótica y mantener la turgencia celular.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El potasio desempeña un papel clave en la regulación de la síntesis, movimiento y acumulación de carbohidratos en los órganos de reserva de la planta, favoreciendo además la coloración de los frutos y la acumulación de azúcares.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de **"ECOPOWER POTASIO K50"** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Vid, palto, cítricos, arándano	0.5 – 1	1. Después del cuajado 2. 20 días después de la primera aplicación (1 o 2 veces)
Herbáceos frutales: Fresa	0.5 – 1	1. Después del cuajado 2. 15 días después de la primera aplicación (1 o 2 veces)
Hortalizas de fruto: Pimiento, tomate, zapallo, pepinillo, sandia	0.5 – 1	1. Después del cuajado 2. 15 días después de la primera aplicación (1 o 2 veces)
Hortalizas de tallo: Papa	0.5 – 1	1. Inicio de tuberización 2. 15 días después de la primera aplicación (1 o 2 veces)
Hortalizas de vaina: Holantao, vainita	0.5 – 1	1. Después del cuajado de vainas 2. 15 días después de la primera aplicación (1 o 2 veces)
Cereales: Maíz, choclo	0.5 - 1	1. Inicio del llenado de granos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO

No existe ninguna restricción

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos disponibles en el mercado. Se debe evitar su mezcla con productos altamente ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de proceder con cualquier mezcla.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.