AGROINDUSTRIAL TIVAN S.A.C.
CALIDAD PARA TUS CULTIVOS

ECO - COBRE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un fungicida preventivo y curativo del grupo químico de los cúpricos, con acción sistémica en toda la planta y un mecanismo de acción multisitio que afecta las proteínas de las membranas celulares de los hongos. El ion cúprico (Cu+2), al ser absorbido por las células fúngicas, inhibe la germinación, el crecimiento y la instalación de sus esporas en el tejido vegetal. Esta formulación está diseñada para ofrecer mejor adherencia y dispersión, además de actuar de forma rápida, siendo absorbida eficientemente por los distintos órganos de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se utiliza como fertilizante foliar, aportando este nutriente esencial y actuando como protector contra hongos fitopatógenos. Puede aplicarse de manera foliar, mediante riego al suelo (drench) o a través de sistemas de fertiirrigación.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de **ECO - COBRE** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arándano	Podredumbre radicular	*Phytophthora cinnamomi*	1	N.A.	N.A.
Vid	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.5	21	50
Palto	Pudrición	*Phytophthora cinnamomi*	0.5	14	20
Esparrago	Fusariosis del espárrago	*Fusarium oxysporum f. sp. asparagi*	1	3	5

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) N.A.: No aplica

Dosis vía fertirriego: 3 – 4 L/HA

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación después de evaluar la presencia de la plaga y bajo condiciones ambientales favorables para su desarrollo. Se recomienda un máximo de dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año. La dosis máxima es de 2.5 L/ha, utilizando hasta 5 cilindros de agua como máximo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos disponibles en el mercado. Se debe evitar su mezcla con productos altamente ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de proceder con cualquier mezcla.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe reutilizarse. Después de usar el contenido, realice el triple lavado y posteriormente inutilice el envase perforándolo. Entregue o deposite el frasco en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Evite contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con residuos o envases vacíos.
- No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o excedentes del producto.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.