AGROINDUSTRIAL TIVAN S.A.C.
CALIDAD PARA TUS CULTIVOS

ECO - INDUCTOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este fertilizante foliar, formulado a base de fosfito de potasio, ofrece un alto contenido de fósforo y potasio, proporcionando dos beneficios clave. En primer lugar, promueve la síntesis de fitoalexinas y otras sustancias de defensa natural de las plantas, mejorando su resistencia frente a enfermedades fúngicas y bacterianas. En segundo lugar, es una fuente nutricional de fósforo que estimula la formación de raíces fuertes, la floración y el desarrollo de frutos, mejorando su calidad, color y grados Brix. Este equilibrio nutricional y defensivo asegura un mejor crecimiento y salud de las plantas en las primeras etapas del cultivo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Este fertilizante foliar ofrece dos beneficios principales: primero, promueve e induce la síntesis de fitoalexinas y otras sustancias de defensa natural en las plantas, confiriendo resistencia y tolerancia frente a enfermedades causadas por Oomicetes, como Phytophthora, Pythium, Peronospora, Plasmopara, Bremia, entre otros, y enfermedades bacterianas, como las causadas por Pseudomonas, Ralstonia, Erwinia y Xanthomonas; segundo, actúa como una fuente nutricional de fósforo, favoreciendo la formación de raíces fuertes, la floración y la fructificación. La sal fosfito tiene una doble acción: su movilidad a través del xilema y floema permite un aporte eficiente de potasio, y al disociarse en ácido fosforoso (H_3PO_3) y K^+, activa los mecanismos de defensa de la planta. El ácido fosforoso es reconocido como un metabolito patógeno, lo que estimula la producción de fitoalexinas, conocidas por sus propiedades para combatir enfermedades fúngicas y bacterianas.
Para su preparación, se recomienda ajustar el pH del agua al nivel adecuado para la aplicación. Luego, añada la cantidad necesaria de **ECO - INDUCTOR** a la mitad del agua a utilizar, agite bien hasta obtener una mezcla homogénea y complete con el agua restante hasta alcanzar el volumen deseado.
Si se utiliza un surfactante no iónico, agréguelo al final y vuelva a agitar antes de aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Árboles frutales: Vid, palto, cítricos	0.5 - 1	1. Antes de floración 2. Después del cuajado hasta la cosecha
Herbáceos frutales: Fresa	0.5 - 1	1. 10 días después del trasplante 2. Antes de floración 3. Después del cuajado
Hortalizas de hoja: Lechuga, espinaca	0.5 – 1	1. 10 días después del brotamiento o trasplante 2. 15 o 20 días después de la primera aplicación
Hortalizas de fruto: Ají, paprika, piquillo, tomate, pepinillo, sandia	0.5 - 1	1. 10 días después del brotamiento o trasplante 2. Antes de la floración 3. Después del cuajado
Hortalizas de bulbo: Cebolla, ajo	0-5 - 1	1. 10 días después del trasplante 2. Inicio de bulbificación
Hortalizas de vaina: Frijol, arveja	0.5 - 1	1. 10 días después del brotamiento 2. Antes de la floración 3. Después del cuajado de vainas
Hortalizas de tallo: Espárrago	0.5 - 1	1. Después del brotamiento 2. 15 días después de la primera aplicación

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se sugiere utilizarlo siguiendo las indicaciones proporcionadas en la etiqueta del producto.

NOTA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. No nos hacemos responsables por fallas causadas por el mal uso o manipulación indebida por parte del cliente.