



Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, salut pública

Codi procés 631

Lliure accés

Segon exercici: Supòsit pràctic, tipus test

8 de juliol de 2023

El 4 de juliol de 2022, el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Vallès Oriental rep una notificació telefònica des del centre d'atenció primària (CAP) La Garriga, on comuniquen la sospita d'una toxiinfecció alimentària (TIA) entre les persones assistents a un dinar en un restaurant de la localitat. Totes elles eren treballadores d'una empresa que celebraven el comiat d'un company.

Es va celebrar el 3 de juliol a les 15 hores, i van assistir-hi 100 comensals. A les poques hores del dinar 76 comensals van iniciar un quadre de gastroenteritis lleu, amb predomini de nàusees i vòmits. La simptomatologia presentada en tots els casos va autolimitar-se i solament en dues persones va requerir d'assistència mèdica, però sense ingrés hospitalari. El quadre es va resoldre en menys de 24 hores.

El menú va consistir en el següent:

- Paella o fideuada amb allioli.
- Cabrit al forn amb patates fregides o daurada al forn amb patates fregides.
- Crema catalana o pinya natural.

Del menú es podien escollir una de les dues opcions de cada plat.

El Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Vallès Oriental informa de la notificació als serveis centrals de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

Es constitueix un equip de treball format per professionals del Servei de Vigilància Epidemiològica i del Servei de salut pública del territori i, immediatament, s'inicia la investigació del brot amb la finalitat de descriure'n la situació, conèixer el probable agent causal i adoptar-ne les mesures de control.

El primer cas va tenir símptomes de vòmits i diarrees no sanguinolentes el mateix dia a les 17 hores, mentre que els darrers casos es van notificar el mateix dia a les 19:30 hores (vegeu la corba epidèmica).


Per obtenir informació de les persones exposades, es van entrevistar a totes les persones que van assistir al dinar, fent ús d'una enquesta epidemiològica, mitjançant contacte telefònic o presencialment en el CAP La Garriga.

Per a l'estudi higienicosanitari, els tècnics de salut pública del territori van inspeccionar el restaurant seguint els protocols establerts. Es van detectar algunes deficiències higienicosanitàries.

Tabla 1. Distribució de les persones afectades, segons l'edat i sexe

	Afectats	Exposats
Homes		
24-29 anys	4	6
30-35 anys	29	41
Total	33	47
Dones		
24-29 anys	19	23
30-35 anys	24	30
Total	43	53

Gràfic 1. Corba temporal epidèmica realitzada segons el període d'incubació



Taula 2. Càlcul de l'aliment implicat

	EXPOSATS		NO EXPOSATS		TA _E ¹ (%)	RR ²	IC 95%	Valor-p
	malalts	no malalts	malalts	no malalts				
Paella	30	10	46	14	75,0%		0,44-2,16	p = 0,5
Fideuada	46	14	30	10	76,6%		0,47-2,22	p = 0,5
Cabrit al forn	23	11	53	13	67,6%	0,84	0,63-1,13	p < 0,5
Daurada al forn	53	12	27	8	81,5%		0,68-1,64	p = 0,5
Crema catalana	73	14	1	12	83,9%		4,66-25,57	p < 0,01
Pinya natural	2	13	72	13	13,3%	0,16	0,08-0,31	p < 0,01

¹TA_E: Taxa d'atac dels exposats; ²RR: Risc relatiu

En relació amb la situació plantejada, responeu les preguntes següents:

1. Quina de les finalitats següents dels estudis de toxiinfeccions no és certa?

- Fer una recerca etiològica per identificar l'agent causal, l'aliment implicat, les fonts d'infecció i els factors coadjuvants.
- Sancionar als establiments responsables pels efectes nocius per a la salut causats.
- Ajudar a dirimir els conflictes legals que es puguin generar entre determinats establiments i les persones afectades.
- Contribuir a la vigilància i l'anàlisi epidemiològica que ha de permetre iniciar programes de control adequats.



- 2. En relació amb les mesures de control d'una toxiinfecció alimentària, quina és la resposta errònia.**
- a) Cal evitar la producció de l'aliment sospitós.
 - b) Cal modificar els menús i evitar els aliments que l'anàlisi epidemiològica ha identificat com d'alt risc.
 - c) Es poden dur a terme suspensions cautelars.
 - d) Les suspensions provisionals no es poden eliminar durant la investigació de la toxiinfecció.
- 3. En relació amb la corba temporal epidèmica d'aquest supòsit pràctic, quina és la resposta falsa?**
- a) Està construïda sobre un eix d'abscisses i un eix d'ordenades. El primer assenyala el temps que ha transcorregut des del moment de la ingesta fins a l'inici de símptomes i el segon indica el nombre de casos en cada interval de temps.
 - b) Mostra un tipus de corba típica de les epidèmies per vehicle comú i font única.
 - c) El 90% dels casos o més se situen entre el període d'incubació mínim i el màxim teòric de la malaltia que se sospita.
 - d) Mostra un tipus de corba de font comuna amb exposició propagativa.
- 4. Quina és la taxa d'atac global?**
- a) 76,0 %.
 - b) 7,6 %.
 - c) 2,6 %.
 - d) 90,0 %.



5. **Un cop calculats els valors de risc relatiu (RR) que manquen a la taula 2, quin aliment tindria una probabilitat més alta d'estar implicat en l'aparició de la malaltia?**
- a) Paella.
 - b) Fideuada.
 - c) Daurada al forn.
 - d) Crema catalana.
6. **Amb la informació exposada, quina és la mitjana del període d'incubació de l'agent causal d'aquest supòsit pràctic?**
- a) 3 hores.
 - b) 4 hores.
 - c) 4,5 hores.
 - d) 3,5 hores.
7. **Segons el període d'incubació de la malaltia i els seus símptomes, quin podria ser l'agent etiològic més probable?**
- a) *Staphylococcus aureus*.
 - b) *Clostridium perfringens*.
 - c) Escombrotòxina.
 - d) Norovirus.
8. **Per arribar a extreure conclusions adequades sobre l'etiologia i el vehicle de transmissió, cal tenir en compte els factors següents. Quina resposta és incorrecta?**
- a) El risc relatiu i la simptomatologia de les persones afectades.
 - b) Els resultats de la inspecció al restaurant, que per si sols permeten extreure'n conclusions.
 - c) Tots els elements relacionats amb l'etiologia i els factors causants.
 - d) Les dades obtingudes sobre el procés de manipulació i les pràctiques de les persones manipuladores dels aliments.



- 9. Per a aquesta investigació, quin tipus d'estudi s'ha de dur a terme?**
- a) Casos i controls.
 - b) Cohorts retrospectives.
 - c) Cohorts prospectives.
 - d) Experiment
- 10. Quin dels sistemes de control següents no és adient en relació amb el microorganisme causant d'aquesta toxiinfecció alimentària?**
- a) Reescalfar el producte contaminat amb aquest microorganisme.
 - b) Refrigerar ràpidament els aliments cuinats (un màxim de dues hores) si no es consumeixen de manera immediata.
 - c) Triar un tractament amb un pH inferior a 5 per detenir el creixement dels bacteris.
 - d) Netejar i desinfectar els equips i les instal·lacions, especialment les superfícies.



PREGUNTES DE RESERVA

- 1. Quina és la principal font de contaminació dels aliments en brots de TIA ocasionats pel microorganisme que podria haver ocasionat aquest brot?**
 - a) La utilització d'aigua contaminada.
 - b) Les persones portadores que manipulen els aliments.
 - c) La utilització d'aliments d'origen animal.
 - d) La utilització d'aliments d'origen vegetal.

- 2. Quina mesura expressa la proporció de la malaltia que s'explica pel consum d'un determinat aliment?**
 - a) Risc relatiu.
 - b) Risc atribuïble.
 - c) Taxa d'atac de l'aliment.
 - d) Interval de confiança.

