



Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, salut pública

Codi procés 819
Promoció interna especial

Segon exercici: Supòsit pràctic

25 de maig de 2024

Supòsit pràctic

Heu començat a treballar com a tècnic/a superior en salut pública en un equip territorial de salut pública que dona servei a un territori en què s'ubica el col·legi Sant Martí de Cerdanya. Aquest col·legi està format per dos edificis. En l'edifici A s'ubica l'alumnat d'educació infantil (P3, P4 i P5) i d'educació primària (de primer a sisè). En l'edifici B és on fan les classes l'alumnat d'educació secundària (de primer a quart) i l'alumnat de batxillerat (primer i segon). Cada edifici té el seu propi funcionament i cadascun té una cuina i un menjador propis de manera que el personal que treballa tant a la cuina com al menjador és diferent d'un edifici a un altre. L'alumnat dels dos edificis no estan mai en contacte dins el complex escolar. Els fets que es relaten a continuació succeeixen en aquest col·legi durant el mes de febrer.

El 8 de febrer es realitza una campanya de vacunació en l'edifici A i una campanya de vacunació en l'edifici B. Durant aquesta campanya de vacunació són cridats a vacunar les nenes i els nens de 6 anys que fan educació primària i les nenes i els nens de 14 anys d'educació secundària.

El 15 de febrer es realitza un estudi sobre els hàbits tabàquics de l'alumnat de tercer i quart d'educació secundària, i primer i segon de batxillerat. Les dades obtingudes es mostren a la taula següent:

Grup	Nombre d'alumnes	Fumadors habituals	Fumadors ocasionals	No fumadors
3r ESO	68	34	15	19
4t ESO	70	28	20	22
1r batxillerat	90	49	21	20
2n batxillerat	85	31	12	42

El 18 de febrer es notifica que un nen d'educació primària té simptomatologia compatible amb una malaltia meningocòccica (febre, cefalea intensa i rigidesa de nuca). Aquest nen viu amb els pares i no té germans ni germanes.

El 22 de febrer es notifica que una noia de segon de batxillerat ha estat diagnosticada de malaltia gonocòccica. La noia explica que la seva parella sexual és un company de classe i que no té relacions sexuals amb cap altra persona. No obstant això, es du a terme un estudi de contactes.

El 26 de febrer es notifica que hi ha una toxiinfecció alimentària entre els alumnes d'educació infantil. Hi ha 15 persones afectades per un quadre de gastroenteritis aguda amb febre elevada. Els afectats tenen en comú haver dinat en el menjador de l'edifici A i haver consumit pastís de nata i xocolata. El 27 de febrer els inspectors del Servei de Salut Pública territorial realitzen una inspecció. Dies després es conclou que la causa és un norovirus transmès per un cuiner que estava malalt.



1. En relació amb la campanya de vacunació de l'edifici A, quina vacuna estan rebent les nenes i els nens d'educació primària convocats?

- a) La segona dosi de la vacuna de l'hepatitis A.
- b) La primera dosi de la vacuna de l'hepatitis A.
- c) La primera dosi de la vacuna hexavalent.
- d) La segona dosi de la vacuna hexavalent.

2. En relació amb la campanya de vacunació de l'edifici B, quina vacuna estan rebent les nenes i els nens d'educació secundària convocats?

- a) La vacuna contra el meningococ B.
- b) La vacuna triple vírica.
- c) La vacuna contra el tètanus i la diftèria.
- d) La vacuna contra l'herpes zòster.

3. En quin grup hi ha una major prevalença d'alumnes que fumen, segons l'estudi de tabaquisme realitzat?

- a) A tercer d'ESO.
- b) A quart d'ESO.
- c) A primer de batxillerat.
- d) A segon de batxillerat.

4. En relació amb l'estudi del tabaquisme, quina de les respostes següents és certa?

- a) Hi ha més alumnat fumador a batxillerat que a secundària.
- b) Quan més edat té l'alumnat major prevalença de fumadors.
- c) El grup que té un nombre major de fumadors habituals és el que té menys fumadors ocasionals.
- d) Hi ha un major nombre d'alumnat no fumador a batxillerat que a secundària.



5. En relació amb el cas amb simptomatologia compatible amb malaltia meningocòccica, quina de les actuacions següents és correcta?

- a) Cal mantenir la vigilància dels contactes almenys durant 10 dies, encara que s'hagi administrat quimioprofilaxi.
- b) No cal vigilar els pacients a qui s'ha administrat quimioprofilaxi.
- c) Cal subministrar quimioprofilaxi a l'alumnat de l'edifici A i de l'edifici B.
- d) Totes les actuacions plantejades en els punts a), b) i c) són errònies.

6. En relació amb la malaltia meningocòccica, quina de les respostes següents és falsa?

- a) El microorganisme es transmet de persona a persona mitjançant les secrecions faríngies i nasals.
- b) Una altra via de transmissió habitual és per via fecal.
- c) La quimioprofilaxi d'aquesta malaltia és el tractament amb antibiòtics.
- d) Cal vacunar els contactes que van rebre la quimioprofilaxi prèviament quan no hagin rebut la vacuna.

7. En el cas de la noia amb malaltia gonocòccica, quina de les respostes següents és correcta en relació amb la malaltia?

- a) No és una malaltia venèria.
- b) Només afecta els òrgans genitals.
- c) Està causada per un virus.
- d) Totes les opcions anteriors són falses.

8. En relació amb l'estudi de contactes en el cas de la noia amb malaltia gonocòccica, quina de les respostes següents és correcta?

- a) La noia es considera el cas índex de l'estudi de contactes.
- b) Cal identificar els contactes de la seva parella sexual per tal d'esbrinar el cas índex.
- c) No caldria realitzar l'estudi de contactes.
- d) La noia no és un contacte de risc per a la seva parella sexual.



9. Quina de les actuacions següents és correcta per part dels inspectors que realitzen la inspecció en el cas de la toxiinfecció alimentària?

- a) Inspeccionar la cuina dels dos edificis.
- b) Inspeccionar la cuina de l'edifici A.
- c) Inspeccionar la cuina de l'edifici B.
- d) Inspeccionar la cuina i els menjadors dels dos edificis.

10. Quina de les actuacions següents no és una mesura correcta de prevenció en el cas de la transmissió alimentària per norovirus?

- a) Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
- b) Netejar i desinfectar les superfícies de la cuina freqüentment, amb un producte a base de clor o d'un altre desinfectant.
- c) Evitar assistir a l'escola fins almenys 48 hores després de finalitzar els símptomes.
- d) Espolsar la roba que s'ha pogut embrutar amb vòmits o diarrea i rentar-la amb aigua freda.



PREGUNTES DE RESERVA

1. En relació amb la campanya de vacunació de l'edifici A, si en comptes de vacunar l'alumnat de primer de primària, s'hagués vacunat l'alumnat de sisè de primària (11-12 anys), quina vacuna haurien rebut?

- a) La vacuna contra el meningococ B.
- b) La vacuna contra el virus del papil·loma humà.
- c) La vacuna triple vírica.
- d) La vacuna contra l'herpes zòster.

2. Quin és el tractament quimioprofilàctic d'elecció en la malaltia meningocòccica?

- a) Rifampicina.
- b) Vancomicina.
- c) Amoxicil·lina.
- d) Amoxicil·lina + àcid clavulànic.