



Нейрон типлириниң һәрқайсисиға тәриплимә бериңлар.




Сүрәттә 1дин 8гичә көрситилгән нейрон қисимлирини атаңлар.



Жәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

Нейрон органоидлириниң хизмити

Органоид	Атқуридиған хизмити
Гольджи жиғиндиси	
Митохондриялә	
Лизосомилар	
Нейронәйчиләр	



Билгәнгә — маржән!

Адәмниң мейиси тәвлүгигә ишләп чиқиридиған электр импульслири пүткүл әләмниң телефонлири биллә ишләп чиқиридиған электр импульслиридин көп болиду. Адәм мейисидә бир секундта 100 000 химиялик реакция маңиду.

Һәрбир минутта мейә томурлири арқилиқ $\frac{3}{4}$ л қан өтиду, икки йерим шарниң барлиқ қан томурлирини қошқанда узунлуғи 560 км болиду.

§ 101. МЕМБРАНИЛИҚ ИҚТИДАР. ҺӘРИКӘТ ИҚТИДАРИ

Бу дәристә:

- мембрана иқтидарини вә һәрикәт иқтидарини окуп үгинисиләр.


Силәр биләмсиләр?

- Һәрикәт иқтидари дегән немә? Һәрикәт иқтидари өз көрсәткүчлири бойичә қандақ әжритилиду? Һәрикәт иқтидари қандақ һадисә асасида шәкиллиниду? Һүжәйрә мембраниси қандақ шараитта өзиниң өткүзгүчлүгини өзгәртиду?

Тирәк чүшәнчиләр:

- Һәрикәт иқтидари
- предспайк
- чоққа иқтидари яки спайк
- сәлбий иқтидари
- ижабий иқтидари
- тиничлиқ иқтидари

Һәрикәт иқтидари — жанлиқ һүжәйриниң мембраниси бойи билән қозғаш тәшвишини бериш жәрияни вақтида тарилидиған қозғилиш долқуни. Һәқиқәттә, у электр разрядини көрситиду, һәрикәтләнгән һүжәйрә (нейрон, булжуң гөш талчиғи яки бәз һүжәйрилири) мембранисиниң кичигирәк бөлигидики иқтидарниң илдам вә қисқа



170-сүрәт. Һәрикәттики һүжәйрә мембранисиниң һәрхил тәрәплиригә зарядләрниң тарилиш схемиси:

А — теч вақтида, Ә — һәрикәт иқтидари пәйда болған вақитта

вақитлиқ өзгириши нәтижисидә бу бөләкниң сиртқи йеқи мембраниниң хошна бөләклиригә қариганда сәлбий зарядләнгән болиду, униң ички тәрипи болса, ижабий зарядләнгән болиду (170-сүрәт). Һәрикәт иқтидари сигналлиқ (рәтлигүчи) роль атқуридиған әсәб яки булжуң импульслириниң физикилиқ асаси болуп һесаплиниду.

Һәрикәт иқтидари әзиниң параметри бойичә һүжәйрә типлириға вә қандақту бир һүжәйрә мембранисиниң һәрхил бөләклиригә бағлиқ һәртүрлүк болуши мүмкин. Жүрәк булжуңиниң һәрикәт иқтидари вә башқа көпчилик нейронларниң һәрикәт иқтидари буниң ярқин мисалидур. Шундиму, удул кәлгән һәрикәт иқтидариниң асасида мундақ һадисиләр байқилиду:

1. Жанлиқ һүжәйрә мембраниси полярләнгән (қариму-қаршилиқ) — униң ички бети сиртқисиға қариганда сәлбий зарядләнгән, сәвәви униң сиртқи бетиниң йенидики еритиндидә көп мөлчәрдә ижабий зарядләнгән бөләкләр (катионлар) болиду, ички бетиниң йенида көп мөлчәрдә сәлбий зарядләнгән бөләкләр (анионлар) орунлишиду.

2. Мембраниға таллап өткүзгүчлүк хас — униң һәрхил бөләкләр (атомлар яки молекулилар) үчүн өткүзгүчлүги маддиларниң мөлчәригә, электрлиқ зарядиға вә химиявий хусусийәтлиригә бағлиқ.

3. Һәрикәттики һүжәйриниң мембраниси әзиниң өткүзгүчлүгини тез арида өзгәртишкә қабилийәтлик. Бу әһвал ениқ бир катион түрлиридә, ижабий зарядниң мембраниниң сиртқи тәрипиниң униң ички тәрипингә өтүши вақтида көрүниду.

Мошу аталған мембрана хусусийәтлириниң жуқуридики иккиси барлиқ жанлиқ һүжәйриләргә хас. Үчинчиси болса һәрикәттики тоқулма һүжәйрилириниң алаһидиликлиригә бағлиқ болиду, шуниң билән биллә уларниң мембранилири һәрикәт иқтидарини ишләп чиқиришқа вә өткүзүшкә қабилийәтлик болуп келиду.

Һәрикәт иқтидариниң басқучлири:



1. Предспайк — мембраниниң алмишип туридиған (критический) дәрижисигичә аста деполяризациялиниш жәрияни (йетәрлик һәрикәтлиниш, шу йәрдин жавап қайтуруш).

2. Үдәш иқтидари яки спайк кәтирилиш бөлигин (мембрана деполяризацияси) вә төвән чүшидиған бөләктин (мембрана реполяризацияси) тәркип тапиду.

3. Әкси излик иқтидар — мембрана деполяризациясиниң алмишип туридиған вақтидин поляризацияниң дәсләпки басқучиғичә (излик деполяризация).

4. Ижабий излик иқтидар — мембранилик иқтидариниң улғийиши вә униң бир таллап дәсләпки мөлчәригә қайтиши (излик гиперполяризация) (171-сүрәт).

Жанлиқ һүжәйрә мембранисиниң поляризацияси униң ички вә сиртқи тәрипиниң ионлуқ тәркивиниң пәрқигә бағлинишлиқ болиду. Һүжәйрә теч һаләттә (һәрикәткә кәлмигән вақти) мембраниниң икки йеқидики ионлар иқтидариниң турақлиқ пәрқини сақлайду, уни *тиничлиқ иқтидари* дөп атайду. Әгәр жанлиқ һүжәйриниң ичигә электрод киргүзүп, мембранилик тиничлиқ иқтидарини өлчәйдиған болса, у сәлбий мәнә көрситиду (-70 , -90 мВ). Буниң сәвәви мембраниниң



171-сүрәт. Һүжәйрә мембранисидики биозлектрлик иқтидарлар

икки тәрипидә катионларниңму, анионларниңму болушиға қаримай, ички тәрипидики зарядләр жиғиндиси сиртқисиғи қариганда хелила аз болиду. Сиртқи мембранида натрий, кальций вә хлор ионлири хелила көп, ичкисидә болса калий ионлири вә сәлбий зарядләнгән белок молекулилири, аминокислоталар, органикилик кислоталар, фосфатлар билән сульфатлар көпирәк. Ундақ болса, мембраниниң ички вә сиртқи йотилиридики муһит бетәрәп зарядләнгән дейишкә болиду. Һәрхил стимулларниң һәрикитигә бағлиқ мембрана иқтидари өзгириши мүмкин. Сүнъий стимул ретидә мембраниниң ички вә сиртқи тәрәплиригә берилидиған электр токини елишқа болиду. Тәбийи шарайтта көпинчә хошна һүжәйриләрдин синапс арқилиқ

яки *һүжәйрә* арилиқ муһиттин диффузия йоли билән берилидиған химиявий төшвишләр (думбақлар) стимул болалайду. Мембранилиқ иқтидарниң орун алмаштуруши сәлбий (гиперполяризация) яки сәлбий (деполяризация) тәрипигә қарап йөнилиши мүмкин. Әсәб тоқулмисида һәрикәт иқтидар, адәттә деполяризация вақтида пәйда болиду — әгәр нейрон мембранисиниң деполяризацияси жуқарқи чәк дәрижисигә йәтсә яки униңдин ешип кәтсә, *һүжәйридә* һәрикәт пәйда болуп, униң тәнчисидин аксонлар билән дендритларға электр төшвишиниң долқуни тарилиду. (Нәқ шараитта нейрон тәнчисидә, адәттә, постсинапслиқ иқтидарилар пәйда болиду, улар тәбиити бойичә һәрикәт иқтидарииндин интайин пәриқ қилиду. Бу иқтидарлар мембраниниң мәхсус қисмида — аксон томпиғида һәрикәт иқтидариға өзгириду, шуңлашқа һәрикәт иқтидар дендритларға таралмайду). Буниң сәвәви *һүжәйрә* мембранисида йочуқ түзидиған ионлуқ ғоллар — белоклуқ молекулилар болиду. Мошу йочуқлар арқилиқ ионлар мембраниниң ички тәрипидин сиртқи тәрипигә яки әксинчә йөнилиштә болиду. Көпчилик йочуқлар пәқәт нәқ ионларниң түрини өткүзүшкә қабилийәтлик, мәсилән, натрийлиқ ғол пәқәт натрий ионлирини өткүзүп, башқилирини өткүзмәйду (бу һадисә селективлиқ дәп атилиду). Һәрикәттики тоқулма *һүжәйрилириниң* мембранилирида (әсәб вә булжун) көп мөлчәрдә *иқтидар-беқинда* ионлуқ ғоллар болиду, улар мембранилиқ иқтидарниң орнини алмаштурушиға бағлиқ илдам һәрикәтлинишкә қабил келиду. Мембраниниң деполяризацияси, әң алди билән, иқтидарға беқинда натрийлиқ ғолларниң ечилишиға тәсир қилиду. Көплигән натрийлиқ ғоллар бир вақитта ечилғанда ижабий зарядләнгән натрий ионлири мошу ғоллар арқилиқ мембраниниң ички тәрипигә қарап интилиду. Бу һәрикәтниң қозғигучи күчи концентрация градиенти вә мембраниниң ички тәрипини сәлбий заряд билән тәминләйду. Натрий ионлириниң еқими мембранилиқ иқтидарниң кәң мөлчәрдә вә интайин илдам өзгиришигә елип келиду, буни *һәрикәт иқтидари* (I_P) дәп атайду.

“**Һәммиси яки һечқайсиси**” қануниға мас һәрикәттики тоқума *һүжәйрисиниң* мембраниси стимулға йә тамамән жавап бәрмәйду, йә күч билән интайин жуқури дәрижидә жавап бериду. Әгәр стимул интайин һалсиз болуп, керәклик өлчәмгә (порог) йәтмисә, һәрикәт иқтидари тамамән пәйда болмайду; шу вақитта өлчәм (пороговий) стимули амплитудиси жуқури дәрижидики стимулға охшаш һәрикәт иқтидарини пәйда қилиду. Бу һәрикәт иқтидариниң амплитудиси һәрқачан бирхил әмәс, мембраниниң шу бир бөлиги һәрхил шараитларда түрлүк амплитудидики һәрикәт иқтидарини ишләп чиқиралайду. Нейрон һәрикәттин кейин бираз вақит абсолютлуқ рефрактерлиқ һаләттә болиду, бу вақитта һечқандақ төшвиш уни қайтидин һәрикәтлөндүрәлмәйду, шуниңдин кейин селиштурма рефрактерлиқ мәзгилгә өтиду, әнди у алаһидә күчлүк төшвишләрниң тәсиридин һәрикәтлиниш шараитиға келиду (бу вақитта һәрикәт иқтидариниң амплитудиси адәттикидин төвән болиду).

Рефрактерлік мәзгил чапсан натрийлік токның инактивацияси, йәни натрийлік ғолларның инактивациясиниң тәсиридин пәйда болиду.

Һәрикәт иқтидариини **бир тәрәплик** өткүзүш натрийлик ғолларның хусусийәтлири билән тәминлиниду — улар ечилғандин кейин бирәз вақит активлиғини йоқ қилип, мембранилик иқтидарның һечқандақ шараитидиму ечилмайду. Шунлашқа һүжәйрә тәнчисигә йеқин бөлигидә, йәни һәрикәт иқтидари “өткән” йәрдә у әнди пәйда болмайду.

Мошунуңға охшаш шараитларда һәрикәт иқтидарииниң аксон бойи билән тарилиши әсәб талчиғиниң диаметри кәң болғансири илдамирақ маңиду. Кальмарның йоған аксонлири бойи билән һәрикәт иқтидарииниң тарилиш илдамлиғи омуртқилиқларның миелинләнгән талчиқлириниң бойи билән тарилиш илдамлиғиға мас келиду (100 м/с-қа йеқин).



Билимиңларни тәкшүрүңлар:




1. Һәрикәт иқтидари — бу
2. Һәрикәт иқтидарииниң асасиға қандақ шараитлар ятиду?
3. Һәрикәт иқтидарииниң басқучлирини атаңлар вә уни параграфтики сүрәт бойичә чүшәндүрүңлар.



Тиничлик иқтидари — бу



Графикта немә көрситилгән? Чүшәндүрүңлар.



Әсәб талчиқлириниң миелинлиниши немә үчүн шунчилик әһмийәтлик? Һәрикәт иқтидари нәдә пәйда болиду?



Тиничлик иқтидарииниң айримиси қайси мәзгилдә пәйда болиду?



Параграф мавзуси бойичә хәвәрлимә тәйярлаңлар.

§ 102. ҺӘРИКӘТ ИҚТИДАРИНИҢ ИНИЦИАЦИЯСИ БИЛӘН ТРАНСМИССИЯСИ. НЕЙРОН АКСОНИНИҢ БОЙИ БИЛӘН ҺӘРИКӘТНИҢ БЕРИЛИШИ

Бу дәристә:

- Мембрана иқтидарини, һәрикәт иқтидарини оқуп үгинисиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Һәрикәт иқтидари дегән немә? Һәрикәт иқтидари өз көрсәткүчлири бойичә қандақ ажритилиду? Һәрикәт иқтидари қандақ һадисә асасида шәкиллиниду? Һүжәйрә мембраниси қандақ шараитта өзиниң өткүзгүчлүгини өзгәртиду?


Әсәб системиси аксониниң бойи билән тәшвиш башқа нейронларға берилиду. Аксонниң учи бирнәччә қетим тармақлиниду вә мошу әң ушшақ путақчиларниң һәрқайсиси новәттики нейрон билән бағлинишқа қабилиһәтлик болиду (172-сүрәт).

Аксонниң сиртқи қатлимида көплигән молекулилардин түзүлгән вә ғолларниң ролини атқуридиған мурәккәп қурулма орунлашқан, уларниң бойи билән ионлар Һүжәйриниң ичигиму, тешиғиму өтәләйду. Бу молекулиларниң бир учи бир тәрипигә қийсийип, **объект-атомға** четилиду. Мошуниндин кейин Һүжәйриниң башқа бөләклириниң энергияси бу атомни Һүжәйрә чекидин сирт чиқирип, ташлашқа ишлитилиду, әкси йөнилиштә һәрикәтлинидиған жәриян Һүжәйрә ичигә башқа молекулиларни киргүзиду. Әң әһмийәтлиги — молекулилик натрий-калий шориғучиси натрий ионлирини Һүжәйридин сиртқа чиқирип, калий ионлирини ичкә киргүзиду (173-сүрәт).


Һүжәйрә теч шараитта болуп, әсәб импульслирини өткүзмигән мәзгилдә натрий-калий шориғучиси калий ионлирини Һүжәйрә ичигә өткүзиду, натрий ионлирини сиртқа чиқириду (тәркивидә ичимлик су бар Һүжәйрини тузлуқ сулуқ муһитта дөп көз алдиңларға кәлтүрүңлар).

Тирәк чүшәнчиләр:

- натрий-калий шориғучиси
- нейромедиаторлар
- синапс



172-сүрәт. Шванн һүжәйрисиниң аксони




173-сүрәт. Натрий-калий шориғучиси

Мошундақ тәңпуңлуқниң (балансниң) мас әмәслигидин аксон мембранисидики иқтидарлар пәрқи 70мВ-ға йетиду (адәттики АА батареякиси қувитиниң 5% -ға тәң). Шундиму һүжәйриниң һалити өзгәргән мәзгилдә вә аксонға электрлиқ импульс билән тәсир қилғанда мембранидики тәңпуңлуқ өзгириду, нәтижидә натрий-калий шориғучиси аз вақитқа әкси йөнилиштә ишләшкә башлайду. Ижабий зарядләнгән натрий ионлири аксонниң ичигә қарап кириду, калий ионлири болса, сиртқа чиқирилиду. Мәзгилгә аксонниң ички муһити ижабий зарядлиниду. Бу вақитта натрий-калий шориғучиси бузулуп, натрийниң униңдин нери киришигә тосалғу болиду, калий ионлири болса, сиртқа чиқирилиши давамлишиду, нәтижидә дәсләпки иқтидарлар пәрқи өз қелипиға келиду. Мошу вақитта натрий ионлири аксон ичигә баричә тарилип, аксонниң төвәнки қисмида мембранини өзгәртиду вә импульсниң нери қарап тарилишиға мүмкинчилик бериду. Натрий вә калий ионлириниң жуқури сүрәттә орун алмаштурушидин болған толтурулушиниң өзгиришини һәрикәт иқтидари дәп атайду. Һәрикәт иқтидари аксонниң нәқ бир чекити арқилиқ өткән вақитта шориғучилар ишқа қошулиду вә тиничлиқ шараити өз қелипиға келиду.

Һәрикәт иқтидари хелила аста тарилиду — секундиға дюймниң бир бөлигичилик. Импульсниң берилиш илдамлиғини арттуруш үчүн (мейидин чиққан тәшвиш, қолумизға бир минуттин кейин кәлгини, әлвәттә, яримайду) аксонлар миелинлиқ қап билән қоршалған, у қап калий вә натрийниң ичкә киришигә вә чиқирилишиға тосалғу болиду. Миелинлиқ қап бирхил туташ әмәс, нәқ бир арилиқта миелини йоқ очуқ йәрләр қалиду. Әсәб импульси мошундақ очуқ йәрләрниң биридин иккинчисигә сәкрәп өтүш мабайинида униң берилиш илдамлиғи ашиду. Импульс аксон тениниң асасий қисминиң учиға йәткәндә, уни төвәнирәк орунлашқан новәттики нейронға бериш керәк яки бу мейә нейрони тоғрилиқ болса, у вақитта көплигән путақчилириниң бойи билән көплигән башқа нейронларға берилиду. Һәрбир нейрон өзиниң хошна нейронидин синапс дәп атилидиған кичигирәк йочуқ билән бөлүнгән.

Һәрикәт иқтидари мундақ йочуктин сәкрәп өтәлмәйду, шуңлашқа импульсни новәттики нейронға бериш үчүн башқа усулни пайдилиниш һажәт. Һәрбир өсүндиңиң учидә көвүкчиләр (пресинапслик) дөп атилидиған кичиккинә қапчилар болиду. Уларниң һәрқайсисида — нейромедиаторлар орунлашқан. Һәрикәт иқтидари чүшкән вақитта мошу қапчилардин нейромедиатор молекулилири бошап чиқип, синапсни



174-сүрәт. Синапс

кесип өтидудә, төвөндә орунлашқан нейрон мембарнисидики мөхсүс молекулилик рецепторларға бағлинишиду. **Нейромедиаторлар** четилған мәзгилдә нейрон мембарнисидики тәңпунлуқ бузулиду. Тәңпунлуқниң мошундақ бузулуши пәйтидә йеңи һәрикәт иқтидари пәйда болидиған яки болмайдиганлиғиға нейрофизиологлар бүгүнки күнгичә жавап издәшни давамлаштурмақта (174-сүрәт).

Нейромедиаторлар әсәб импульсини бир нейрондин новәттики нейронға бәргәндин кейин улар диффузиялиниш яки химиявий парчилинишқа учриши яки өз көвүкчилиригә қайтип келиши мүмкин (бу жәриян қайта тартип елиш дөп атилиду). XX әсирниң ахирида ечилған һәйран қаларлиқ илмий йеңилиқ бойичә нейромедиаторларниң чиқирилип ташлинишиға вә қайта тартип елинишиға тәсир қилидиған дорилар адәмниң психикилик һалитини пүтүнләй өзгәртәләйдекән. Прозак препарати вә униңға охшаш антидеприсантлар серотонин нейромедиаторини қайта тартип елишни тохтитиду. Мошу турғидин Паркинсон ағриғи мейидики допамин нейромедиаториниң йәткүлүксизлиги билән өз ара бағлинишлиқ дегән пикир туғулиду. Психиатрия саһасидики тәтқиқатчилар мошу қошулушларниң адәмниң әқил-есигә қандақ тәсир қилидиғанлиғини чүшинишкә тиришмақта.

Нейрофизиологларниң кәспий тили билән ейтқанда, “нейрон ишиниң механизми” һелиму йешилишини тапмиған асасий соалларниң бири. Болупму миңлиған хошна нейронлар әвәткән нейромедиаторларни қобул қилидиған мейә нейронлириниң иши алимларниң қаттиқ қизиқишини туғдурмақта. Бу мәсилә бойичә көплигән тәтқиқатчи топлар иш жүргүзиватқанлиғи билән импульсларниң қайта ишлиниши билән интеграцияси тоғрилиқ һечқандақ мәлумат йоқ. Бизгә мәлум болғини пәкәт нейронда униңға келип чүшкән импульсларниң интеграция жәрияни маңиду вә һәрикәт иқтидариини инициацияләш билән импульсни нери тәрәпкә маңғузуш керәк яки керәк әмәслиги тоғрилиқ қарар чиқирилиду. Бу мурәккәп жәриян пүткүл мейиниң хизмитини башқуриду. Тәбиәтниң әһмийити интайин чоң мошу тепишмиғи илимпән үчүнму бүгүнки күндә жаваби тепилмиған тепишмақтәк қалмақта.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:




1. Қандақ қурулумларниң бойи билән ионлар һүжәйрә ичигә чүшиду вә чиқирилиду?
2. У қурулумлар немидин түзилиду?
3. Бу йәрдә натрий-калий шориғучиси қандақ роль атқуриду?
4. Нейрон башқа нейрондин қандақ алаһидиләнгән?
5. Пресинапслиқ көвүкчиләрниң һәрикити қандақ?



1. Нейромедиатор — бу
2. Әсәб импульсини бәргәндин кейинки нейромедиаторниң әһвали қандақ болиду?



Сүрәтни пайдилинип, аксондин нейронға импульсниң берилишини чүшәндүрүп бериңлар.



Параграф мавзусиға хәвәрлимә тәйярлаңлар.

§ 103. РЕФРАКТЕРЛИҚ МӘЗГИЛ ВӘ УНИҢ РОЛИ

Бу дәристә:

- Рефрактерлиқ мәзгил вә униң роли тоғрилиқ оқуп үгинисиләр;
- Рефрактерлиқ мәзгилниң әһмийитини чүшәндүрәләйдиған болисиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Рефрактерлиқ мәзгил дегән немә? Әсәб вә булжун гөш һүжәйрилириниң қайсисида рефрактерлиқ мәзгил узақ болиду? Бу һадисини қандақ чүшәндүрүшкә болиду?

Тирәк чүшәнчиләр:

- рефрактерлиқ мәзгил
- рефрактерлиқ мәзгилниң роли
- изотоникилик қисқираш
- изометриялик қисқираш
- тетаникилик (чоң) қисқираш
- булжун тетаникилик тармуши (контрактуриси)

Рефрактерлиқ мәзгил (физиологиядә, неврологиядә) — әсәб һүжәйрисини яки булжун талчиқлириниң һәрикәт иқтидариниң пәйда болушидин кейин мутлақ һәрикәт болмиған шараити, қандақ тәсир қилғучи тәсир қилсиму һәрикәтнин пәйда болмаслиғи (абсолют рефрактерлиқ мәзгил). Бу мәзгилдә адәттики тәсир қилғучи һүжәйридә һәрикәт пәйда қилалмайду, у поляризацияниң қайта өз қелипиға келишигә — реполяризациягә

учрайду. Мошуниндин кейин селиштурма рефрактерлик мәзгил башлиниду, уинда күчлүк полярсизландуруш (деполяризация) йоли билән қандақла болмисун һәрикәт иқтидарини пәйда қилишқа болиду.

Булжун тоқулмисиниң рефрактерлик мәзгили әсәб тоқулмисиниң рефрактерлик мәзгилигә қариғанда узағирақ болиду. Әсәбниң рефрактерлик мәзгилиниң узақлиғи — 14 мс, тоғра ала-була булжунда 35 мс-чә.

Булжун тоқулмисиниң лабильлиғи әсәб тоқулмисиниң лабильлиғиға қариғанда хелила төвән болиду. Һәқиқитидә, пақиниң пақалчәк булжуңи 1 с-та 200—250, ямпаш әсәб системиси 500—1000 һәрикәт долқунини ясайду.

Булжун талчиқлириниң қисқириниңи тәсир қилишниң чәклик күчигә жавап ретидә өз узунлуғини вә күч селиш дәрижисини өзгәртиш дәп чүшиниш керәк. Изотоникилик қисқираш мәзгилидә (булжунға күч чүшириш өзгиришсиз болғанда), асасән, булжун талчиғиниң узунлуғи өзгириду. Униң күч чүшириш дәрижиси көплигән өзгиришләргә төзмәйду. Изометриялик қисқираш мәзгилидә (күч чүшириш ашқанда, узунлуқ өзгәрмигән шараитта булжунниң қисқириниңи көрситиш) булжун талчиқлириға күч чүшүш (тиришиш) хелила ашиду, бирақ уларниң узунлуқлири әмәлиятта өзгәрмәйду.

Биртуташ организмда булжунниң қисқирини таза изотоникилик яки таза изометриялик болмайду, мәсилән, аяқ-қол боғумлирини пүккәндә, булжунлар қисқирайду, шунин билән биллә улар өзиниң күч чүшириш дәрижисини өзгәртиду.

Шәхсийләнгән булжунларниң қисқирини, униң фазилири. Скелет булжунниң қисқираш характери қоздурушниң чапсанлиғиға бағлинишлик болиду (яки әсәб импульслириниң чүшүш чапсанлиғиға бағлинишлик). Булжунниң қисқираш *айрим қисқираш* вә *созулма қисқираш* дәп иккигә бөлүниду.

Булжунниң қоздурулуши яки униң қозғилиш әсәбини айрим стимул билән иннервацияләш айрим булжун қисқирини пәйда қилиду.

Айрим булжун қисқириниңиң әгир сизик кимограф тасмисида (пленкисида) әмәлгә ашурулиду. Булжунниң қисқирини қоздуручи (возбудитель) тәсир қилғандила башланмайду, мәлум бир вақиттин кейин башлиниду, уни һәрикәткә кәлтүрүшниң латентлик яки йошурун мәзгили дәп атайду. Шунлашқа латентлик мәзгил — қоздурғучи тәсир қилғандин булжунниң реакцияси башланған вақитқичә болған мәзгил. Пақиниң пақалчәк булжунниң айримлиған қисқириниңиң латентлик мәзгили 0,01 с болиду. Қисқираш фазиси 0,04 с қа созулиду, бошаш мәзгили қисқирашқа қариғанда хелила узағирақ вә у 0,05 с болиду. Пақа пақалчәк булжуниниң барлиқ айрим булжуниниң қисқираш узақлиғи 0,1—0,12 с болиду.

Булжұң қисқыришиниң жиғиндиси, чишлиқ вә тәкши тетанус. Тәбийи шараитта булжұң талчықлириға айримлиған әмәс, бирқатар әсәб импульслири чүшиду, уларға булжұң узақ қисқыраш арқылық жавап бериду. Булжұңниң узақ вә бириккән қисқыриши тетаникилық қисқыраш яки тетанус дегән намға егә болған. Тетаникилық қисқырашқа пәқәт скелет булжұңлири қабилыйәтлик. Рефрактерлик мәзгилниң узақ болушиға бағлиқ бирхил саһалиқ булжұңлар билән жүрәкниң тоғра ала-була булжұңлири тетаникилық қисқырашқа қабилыйәтсиз.


Тетанус булжұңларниң айримлиған қисқыришиниң жиғиндиси нәтижисидә пәйда болиду. Тетанус пәйда болуши үчүн булжұңға айримлиған қисқыраш аяқлашмай туруп, йәнә қайта тәсир қилғучи (яки әсәб импульслири) тәсир қилиши керәк.

Әгәр тәсир қилғучи импульслар араси йеқин болса вә уларниң һәрқайсиси булжұң йеңидин бошашқа башлиғанда, бирақ теһи толуқ бошаш меңип үлгәрмигән мәзгилдә тәсир қилса, чишлиқ қисқыраш типи пәйда болиду, у толуқ әмәс, йетилмигән тетанус (клонус-жалақлиғуч) дөп атилиду.

Әгәр тәсир қилғучи импульслар араси интайин йеқин, йәни алдинқи қоздуруштин кейин булжұң бошиши башланмай туруп кейинқи қоздурғучи тәсир қилғанда, йәни қисқыраш жуқури дәрижидә болғанда узақ тохталсиз қисқыраш пәйда болиду, уни тәкши, йетилгән тетанус дөп атайду (175-сүрәт).

Йетилгән тетанус — 1 с-та 40—50 кичә илдамлиқта әсәб импульслири тәсиридин болидиған скелет булжұңиниң турақлиқ ишлиши. Чишлиқ тетанус 1 с-та 30 ғичә илдамлиқтики әсәб импульслири вақтида пәйда болиду. Әгәр булжұң 1 с-та 10—20 әсәб импульсини алса, у вақитта улар булжұң тонуси шараитида, йәни күч селиш дәрижиси бирхил болиду.

Скелет булжұңиниң тетаникилық қисқыришиниң айримлиған қисқыраштин алаһидилиги — у күчлүгирәк вә узаққа созулиду, бу тәнниң мәлум бир қелипини сақлашқа мүмкинчилик бериду, жүкни тутушқа в.б.



175-сүрәт. Һәртүрлүк илдамлиқта пақиниң пақалчәк булжұңиниң қисқыриши:

1 — айримлиған қисқыраш; 2 — чишлиқ тетанус;
3 — тәкши тетанус; 4 — қоздурушниң бөлгүси

Тетаникилік қисқираш башқа булжуң йәнә бир узақ қисқириши учришиду, у созулма тармуш дөп атилиду. Созулма (боғум һәрикитиниң чөклинип қетип қелиши) тәсир қилғучиниң тәсири тохтиғандин кейинму давамлишиду. Булжуңниң созулма тармуши мадда алмишиш бузулған вақитта яки булжуң тоқумисиниң қисқираш белогиниң хусусийити өзгәргәндин кейин башлиниду.

Тетаникилік қисқираш адәмниң әмгәк паалийитидики әһмийити интайин зор, уни тонулған физиолог А.Ф.Самойловниң сөзи тәстиқләйду: “Индустриядики вә сәнъәттики бизниң бар байлиғимизни тәшкил қилидиған, адәм “қоли билән” ясалғанниң һәммиси булжуңниң тетаникилік қисқириши арқилиқ ясалған, тетанус булжуңи биз үчүн хизмәт қилиду: тетанус — бу булжуңниң миссияси”.

Булжуңниң қисқириши вақтидики химиявий айлиним. Булжуңниң қисқириши асасий химиявий механикилік энергиягә айлинишида туриду. Булжуңларда әмәлгә ашидиған химиявий жәриянлар кислородниң қатнишисиз вә униң қатнишиши биләнму меңиши мүмкин.

Кислородлуқ (аэроблуқ фаза) химиявий айлиним сүт кислотасиниң углекислород гази билән суғичә оксидлиниши жәрияни билән бағлинишлиқ. Бу шараитта пәқәт сүт кислотаси парчилиниду. Бөлүнгән энергия сүт кислотасиниң қалған қисминиң глюкоза вә униңдин кейин гликогенғичә айлиниши үчүн ишлитилиду. Шуңлашқа мурәккәп химиявий айланма тизмисиға қаримастин, организм булжуң қисқиришиниң ахирида гликогенниң йеримини йоқитиду. Қисқириши вақтида барлиқ химиявий энергия механикилік энергиягә айланмайду, униң 40% иссиқлиққа айлиниду.

Силиқ вә тоғра йоллуқ булжуңларниң физиологиялик алаһидликлири. Силиқ булжуң ички әзалар билән қан томурлири қәвитини (булжуң қатлимини) түзиду.

Силиқ вә тоғра ала-була булжуңларниң микроскопиялик түзүлүши һәрхил болиду. Силиқ булжуңларниң миофибриллаларида тоғра сизиклири болмайду. Бу силиқ булжуңлар талчиклирида қисқираш белокларниң рәтсиз орунлишишиға бағлиқ. Силиқ талчиклири селиштурма түрдә қисқа — 50 тин 200 мкм-ғичә.

Силиқ физиологиялик хусусийәтлири уларниң түзүлүш алаһидликлири билән алмишиш жәрияниниң дәрижисигичә бағлинишлиқ тоғра ала-була булжуңларниң физиологиялик хусусийәтлиридин хелила пәриқлиниду.

Бирхил бағланған булжуңниң қозғиғучилири тоғра йоллуқ булжуңлардин төвәнирәк. Қозғилиш уларда 2—15 см/с аз илдамлиқ билән тарайду. Әсәб талчиклири билән тоғра йоллуқ булжуң талчиклириға қариғанда бирхил бағланған булжуңда қозғилиши бир талчиктин иккинчисигә берилиду. Силиқ булжуңниң қисқириши аста һәм узаққа созулиду. Шунин билән тошқанниң үчийиниң бирхил бағланған булжуңиниң қисқириши 5 с созулиду, бошиши униңдинму аста маңиду.

Силик булжуңларниң қисқираш һәрикити узаққа созулушиға бағлиқ һәтта тәсир қилғучиларниң аз тәсириниң өзидә узақ қисқираш һәлитигә көчүши мүмкин, у скелет булжуңиниң әвришимлиги әскә чүшириду. Бирхил бағланған булжуңға шундақла узақ тоникилик қисқираш хас.

Бирхил бағланған булжуңда рефрактерлиқ мәзгил скелет булжуңлириға (бирнәччә секундқичә) қариганда узағирақ болиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Организм рәтлинишиниң рефрактерлиқ принципиниң әһмийити немидә?
2. Булжуңниң изотоникилик қисқирашиниң роли қандақ? Дәлилләңлар.
3. Әвришимлик қисқираш дегән немә? Буниң қандақ умумий бәлгүси болиду?
4. Қандақ токулминиң рефрактерлиқ мәзгили узаққа созулиду?
5. Булжуңниң әвришим тармуши дегән немини билдүриду, дәлилләңлар..



Булжуңниң изометриялик қисқирашиниң роли қандақ? Тәрипләңлар.



Қелин қәғәзгә һәрхил рәндики қериндашлар билән йетилгән, чшилиқ вә бирхил әвришимлиги ясаңлар.



Булжуң вә әсәб һүжәйрилириниң рефрактерлиқ мәзгилигә қандақ чүшәнчә беришкә болиду?



1. Абсолютлиқ рефрактерлиқ мәзгил — тәсир қилғучи күч қанчилик күчлүк болсиму қозғиғучи тоқума қайтидин һәрикәт иқтидарини пәйда қилалмайдигән вақит арилиғи. Бу вақитта һүжәйриләрниң мембранилирида немә болидиғанлиғини тәрипләңлар.
2. Селиштурма рефрактерлиқ мәзгил — қозғиғучи токулминиң һәрикәт иқтидарини шәкилләндүрүшини аста өз қелипиға кәлтүрүш хусусийитигә бир таллап кетидигән вақит арилиғи. Селиштурма рефрактерлиқ мәзгил вақтида биринчи һП пәйда қилғандинму артуқ тәсирләр, қайтидин һП шәкилләндүрүшкә елип келиши мүмкин. Бу шараитта мембраниларда немә болиду?

§ 104. МИЕЛИНЛӘНМИГӘН НЕЙРОНЛАРНИҢ АРТУҚЧИЛИҒИ

Бу дәристә:

- Миелинләнмигән нейронларниң артуқчилиғини, миелинлиқ вә миелинсиз нейронларни оқуп үгинисиләр;
- Миелинлиқ қапларниң әһмийитини чүшәндүрәләйсиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Миелинлиқ қап дегән немә? Миелинлиқ қап аксон чөрисидә қандақ түрдә шәкиллиниду? Икки Шванн һүжәйрилириниң арилиғи немә дәп атилиду? Миелинлиқ аксон бойи билән әсәб импульслири бирхил өтүши мүмкинму?

Миелинлиқ қап аксонни айлинип орунлашқан Шванн һүжәйрилиридин шәкиллиниду. Шванн һүжәйрисиниң мембраниси алди билән аксонни қаттиқ орап, шуниндин кейин аксонни бирнәччә қетим айлинип

ораш вақтида тәркивидә липидлик мадда — **сфингомиелин** бар көплигән мембранилик қәвәтләр түзидү. Сфингомиелин интайин яхши чәтлигүчи болуп һесаплиниду, у аксон мембраниси арқилиқ ионлуқ токни 5000 һәссигә төвәнлтиду. Аксонниң бойи билән қатар орунлашқан һәрбир икки Шванн һүжәйрисиниң арисидә кичиккинә — узунлуғи бари-йәқи 2—3 мкм жирақлашмиған орун қалиду. Мошу арилиқтики аксон мембраниси арқилиқ һүжәйрә сиртидики суюқлуқтин ионлар һүжәйрә ичилиқ муһитқа вә әкси йәнилиштә әркин әтәләйду. Бу орунни **Ранвье сегменти** дөп атайду (176-сүрәт).

Тирәк чүшәнчиләр:


- Миелинлик қап
- Шванн һүжәйриси
- сфингомиелин

Сальтаторлуқ өткүзүш — бу қепи электр токиға бираз күчлүк тосалғу болидиған миелинләнмигән әсәбләрниң бойи билән әсәб импульслирини сәкримә һалитидә өткүзидү. Әсәбниң узун бойида системилик түрдә (1—2 мм арилиқта) миелинлик қапниң микроскопиялик дефекти — Ранвье сегменти орунлишиду. Әсәб импульслири сегмент арилиқ бөләкләрниң бойи билән электротоникилик тарилиду, униң тохтилишини миелинниң йәккүлигүч хусусийәтлири төвәнлтиду. Бир Ранвье сегментидин новәттики сегментқа йәткәндә тәшвиш стандартлик дәрижигичә күчийиду (һәрикәт иқтидариниң ишләп чиқиришиға бағлиқ). Шундақ қилип, әсәб талчиғиниң бойи билән импульсниң ишәшлиқ вә үнүмлүк өткүзүлүши тәминлиниду: импульс чоң илдамлик билән бир Ранвье сегментидин новәттики сегментқа “сәкрәп өткән” охшаш болуп көрүниду.


Әсәб импульсини өткүзүш. Миелинләнгән әсәб талчиғида қозғилишниң бир сегменттин новәттики сегментқа сальтаторлуқ тарилиши (стрелкилар билән қозғалған (А) вә теч һаләттики (Б) сегментлири арисидә пәйда болған токниң йәнилиши) көрситилгән (177-сүрәт).

Ранвье сегментида натрий вә калий ғоллириниң жуқури зичлиғи байқилиду.

Ионлар, адәттә, талчиқларниң қелин миелинләнгән қаплиридин әтәлмәйду, бирақ улар Ранвье сегменти арқилиқ оңай диффузиялиниду.



176-сүрәт. Ранвье сегменти көрсәткүчлири билән миелинләнгән нейрон аксони



177-сүрәт. Миелинләнгән әсәб талчиғи бойи билән қозғилишниң өтүши — “сальтаторлук” — қозғалған бөләктин қозғалмиған бөләккә сәкрәп өтүш

Ундақ болғанда, һәрикәт иқтидари пәқәт сегментларда пәйда болуп, сегменттин сегментқа (176-сүрәт). Миелинләнгән әсәб талчиғи бойи билән қозғилишниң өтүши — “сальтаторлук” — қозғалған бөләктин қозғалмиған бөләккә сәкрәп өтүш өткүзүлиду, буни сальтаторлук өткүзүш (сәкримә) дөп атайду. Бу шараитта электр токи миелин қепиниң сиртидин һүжәйрә сирти суюқлуғи арқилиқ ақиду, шуниң билән қатар аксон ичидики аксоплазма арқилиқ сегменттин сегментқа өтүш вақтида уларни биридин кейин бирини қозғайду. Шундақ қилип, әсәб импульси талчиқ бойи билән сәкригән һаләттә тарилиду, мошу қозғилишниң асасида “сальтаторлук өткүзүш” аталғуси пәйда болди (177-сүрәт).

Сальтаторлук өткүзүшниң икки артуқчилиғи бар. Биринчидин, аксонниң бойи билән чоң арилиқлар арқилиқ “сәкрәш” механизми импульсниң миелинләнгән талчиқларда өтүш илдамлиғини 5—50 һәссә ашуриду.

Иккинчидин, сальтаторлук өткүзүш аксон үчүн энергияни сақлайду, сәвәви пәқәт сегментларла деполяризациялиниду, бу башқа шараитлар билән селиштүрғанда ионларни йоқитишни тәхминән 100 һәссигә төвәнлитишкә мүмкинчилик бериду. Мошуниңға бағлиқ топлима (сериялик) әсәб импульслиридин кейинки натрий вә калий ионлири концентрациясиниң трансмембранилик пәрқини өз қелипиға кәлтүрүшкә керәк энергияни ишлитиш азийиду.

Йоған миелинләнгән талчиқларда сальтаторлук өткүзүшниң башқиму алаһидиликлири бар: миелинлик қап билән тәминлинидиған интайин яхши чәтнәштүргүч мембранилик сиғишниң 50 һәссигичә



178-сүрәт. Ранвье сегменти арқилиқ қозғилишниң өтүши

төвөнлиши интайин аз мөлчәрдики ионларниң орун алмаштуруши арқилиқ реполяризацияни әмәлгә ашуруш мүмкинчилигини бериду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Әсәб системисиниң миелинлиқ қепи немидин түзүлгән?
2. Мембранилиқ қәвәтләрниң тәркивидә қандақ липидлиқ мадда болиду?
3. Ранвье сегменти дегән немә вә әсәб импульсини өткүзүштә униң роли қандақ?
4. Әсәб импульсиниң сәкримә тарилиши қандақ маңиду?
5. Һәрикәт иқтидари миелинләнмигән талчиқлар арқилиқ қандақ тарилиду?



Миелинләнгән талчиқларниң бойи билән әсәб импульслириниң өтүш илдамлиғи немә сәвәптин жуқурилайду? Мавзу сүрәтлирини пайдилинип чүшәндүрүңлар.



Шванн һүжәйрисини вә қозғилишниң миелин талчиқлири арқилиқ берилишини сүрәт билән яки тапшурма билән көрситиңлар.



Энергиялиқ һесаптин сальтаторлуқ өткүзүш немә сәвәптин бираз болсиму пайдилиқ?



Сальтаторлуқ өткүзүшниң пайдилиқлиғини баһалаңлар.

§ 105. МИЕЛИНЛӘНГӘН ВӘ МИЕЛИНЛӘНМИГӘН НЕЙРОНЛАРНИ СЕЛИШТУРУШ

Бу дәристә:

- миелинләнгән вә миелинләнмигән нейронларни селиштурушни үгинисиләр;
- рефрактерлиқ мәзгил билән миелин қепиниң әһмийитини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.


Силәр биләмсиләр?

- Һәрикәт иқтидари миелинләнмигән талчиқларниң бойи билән қандақ тарилиду? Миелинләнгән талчиқларниң бойи биләнчу?

Һәрикәт иқтидариниң миелинләнмигән талчиқларниң бойи билән тарилиши. Миелинләнмигән талчиқларниң бойи билән Һәрикәт иқтидари үзлүксиз тарилиду. Әсәб импульсини өткүзүш электрлиқ мәйданниң тарилиши билән башлиниду. Электрлиқ мәйданниң һесавиға пәйда болған Һәрикәт иқтидари хошна бөләкниң мембранисини алмишиш дәрижисигичә деполяризацияләшкә қабилиһәтлик, нәтижидә мошу хошна бөләктә йеңи Һәрикәт иқтидарлири ишләп чиқирилиду. Һәрикәт иқтидарлири орун алмаштурмайду, улар шу пәйда болған йеридә йоқ болиду. Йеңи Һәрикәт иқтидариниң пәйда болушида дәсләпкиси асасий роль атқуриду (179—180-сүрәтләр).


Тирәк чүшәнчиләр:

- миелинләнмигән талчиқлар
- Һәрикәт иқтидари
- миелинләнгән талчиқлар



179-сүрәт. Миелинләнмигән әсәб талчиқлири бойи билән һәрикәтнің өтүши — “эстафетиси”

Миелинләнгән талчиқларның бойи билән һәрикәт иқтидариниң тарилиши. Һәрикәт иқтидари миелинләнгән талчиқларның бойи билән сәкримә түридә (сальтаторлуқ өткүзүш) тарилиду. Миелинләнмигән талчиқларға пәқәт Ранвье сегменти бар җайлардики ионлуқ ғолларға бағлинишлиқ иқтидарлар концентрацияси хас. Бу йәрдә уларның зичлиғи миелинләнмигән талчиқларның мембранилири билән селиштүрғанда 100 һәссә жуқури. Миелинлиқ давамлаштүрғучилар җайида иқтидар бағлинишлиқ ионлуқ ғоллар мутлақ болмайду. Бир ранвье сегментида пәйда болған һәрикәт иқтидари электрлиқ мәйданның һесавиға хошна сегментларның мембранисини алмишиш дәриҗисигичә деполяризацияләйду, бу йеңи һәрикәт иқтидариниң



180-сүрәт. Миелинләнмигән вә миелинләнгән аксонларның бойи билән һәрикәт иқтидариниң тарилиш илдамлиғи

пәйда болушиға елип келиду, йәни һәрикәт сәкримә тәхлитидә бир сегменттин кейинки сегментқа өтиду. Ранвье сегментиниң бири зәх-миләнгән шараитта һәрикәт иқтидари 2, 3, 4, һәтта 5 сегментни һәрикәткә кәлтүриду, сәвәви миелинлиқ давамлаштурғучилар билән түзүлгән электр айриғуч электрлиқ мәйданниң күчини һалсиритиду. Бу миелинләнмигән талчиқлар билән селиштурғанда миелинлән-гән талчиқларниң бойи билән һәрикәт иқтидариниң тарилиш илдамлиғини арттуриду. Шунинң билән биллә миелинләнгән талчиқлар йоғанирақ болиду, йоған талчиқларниң электрлиқ тосалғуси төвән, шунинң үчүн мошу алаһидиликму миелинләнгән талчиқларниң бойи билән импульсларниң өтүш илдамлиғини жуқурилитиду. Сәкримә өткүзгүчниң новәттики артуқчилиғи — энергетикилиқ турғуда униң ихтисатлиғи, сәвәви мембраниниң 1%-ға йеқин қисмини алидиған Ранвье сегментила қозғилиду. Мошу сәвәптин әсәб талчиғи бойи билән маңидиған разрядләрниң жуқури зичлиғида әһмийити болуши мүмкин һәрикәт иқтидариниң пәйда болуши нәтижисидә ишлитилидиған Na^+ вә K^+ трансмембранилиқ градиентларни өз қелипиға кәлтүрүш үчүн аз энергия һажәт болиду.

Миелинләнгән қапниң һесавиға импульсниң өтүш илдамлиғи қанчилиқ әһмийәтлик екәнлиғини билиш үчүн адәмниң әсәб систе-мисиниң миелинләнмигән вә миелинләнгән қисимлириниң бойи билән импульсниң тарилиш илдамлиғини селиштуруш йетәрлик болиду. Әсәб талчиғиниң диаметри 2 мкм-ға йеқин вә миелинлиқ қапчиси болмиған һаләттә импульсни өткүзүш илдамлиғи — 1 м/с-ни тәшкил қилиду, диаметри дәл мошундақ, һәтта һалсиз миелинләнгән қапчә вақтида илдамлиқ 15—20 м/с-қа тәң келиду. Диаметри йоған, қовурғиси қелин миелинлиқ қаплиқ талчиқларниң бойи билән импульсниң өтүш илдамлиғи 120 м/с-қичә жуқурилайду.

Һәрикәт иқтидариниң мембрана бойи билән тарилиш илдамлиғи алаһидә бир әсәб талчиғи үчүн турақлиқ көрсәткүч әмәс — һәрхил шараитларға бағлиқ бу илдамлиқ интайин төвәнләп кетиши яки қайтидин жуқурилап, дәсләпки һалитигә келиши мүмкин.

Ундақ болса, һәрикәт иқтидариниң миелинләнгән талчиқлири-ниң бойи билән тарилиш илдамлиғи миелинләнмигәнләр билән се-лиштурғанда хелила жуқури болиду. Нәқ бир вақит арилиғида һәрикәт иқтидари “ялиңач” аксонниң өзи билән қатар орунлашқан қисминила һәрикәткә кәлтүриду, миелинләнгән талчиқтики һәрикәт иқтидари бирнәччә Ранвье сегментини төминләйдиғандәк орунда биридин-биригә сәкрәп һәрикәтлиниш пәйда қилиду.

Һәрхил миелинләнгән талчиқлардики һәрикәт иқтидариниң бери-лиш илдамлиғиниң диапазони интайин кәң: секундиға бирнәччә мет-рдин “дуния рекордиғичә” өзгириду. Мәсилән, креветкида һәрикәтни өткүзүш илдамлиғи 200 м/с-тин ешип чүшиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Һәрикәт иқтидари миелинләнмигән талчиқлар бойи билән қандақ тарилиду?
2. Әсәб импульсиниң тарилиши немидин башлиниду?
3. Қандақ шараитта йеңи иқтидар һәрикити ишләп чиқирилиду?
4. Йеңи иқтидар һәрикитиниң пәйда болушида асасий роль немигә тегишлик?
5. Әгәр һүжәйрәичилик электрод билән аксонниң оттура қисмиға тәсир йәткүзсә, у вақитта һәркәт иқтидари қандақ тарилиду?
6. Миелинләнгән талчиқларниң бойи билән һәрикәт иқтидари қандақ тарилиду?
7. Миелинләнгән вә миелинләнмигән әсәб талчиқлирида һәрикәт иқтидариниң тарилиш илдамлиғини селиштуруңлар.
8. Ранвье сегментиниң бири жараһәтләнгән шараитта немә болиду?



Миелинләнгән әсәб талчиқлири бойи билән берилидиған һәрикәт иқтидариниң артуқчилиғини тәрипләңлар.



Жәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

Миелинләнгән вә миелинләнмигән нейронларниң һәрикитини селиштуруш

Нейронлар	Әсәб импульсини өткүзүш
Миелинләнгән	
Миелинләнмигән	

§ 106. МӘРКИЗИЙ ӘСӘБ СИСТЕМИСИНИҢ ТҮЗҮЛҮШИ

Бу дәристә:

- Мәркизий әсәб системисиниң түзүлүшини оқуп үгинисиләр;
- Әсәб системисиниң қисимлири тоғрилиқ билисиләр

Силәр биләмсиләр?

- Организмниң биртуташлиғи неминиң ярдими билән әмәләгә ашиду? Адәм организми сиртқи муһитниң үзлүксиз өзгиришлиригә немә арқилиқ маслишиду? Мәркизий әсәб системиси қандақ қисимлардин туриду?

Организм — өзлүгини рәтлинидиған, һүжәйриләрдин, тоқулмилардин, әзалардин тәркип тапқан мурәккәп система. Улар өз новитидә бирхил комплекслиқ хизмәт атқуридиған (мәсилән, нәпәс елиш системиси) физиологиялик системиларни тәшкил қилиду.

Физиологиялик системилар ирсийәтлинду. Бу системиларниң барлиқ әзалирида биртуташ рәтләш механизми болиду. Рәтләш механизми уларниң һәрикитини бағлаштуруп (координацияләп), физиологиялик системилар ишини бир-бири билән маслаштуриду. Организм хизмәтлирини рәтләш билән униң биртуташлиғини тәминләштә әсәб системиси

Тирәк чүшәнчиләр:

- мәркизий әсәб системиси
- мейә
- жулун
- баш сүйәк-мейә системиси
- жулун системилари


асасий роль ойнайду. Ретлинишниц бу механизми хелила йетилгән, биринчидин, химиявий тәсиргә қариганда тәсир қилиш хелила илдамирақ маңиду. Шуңлашқа организм әсәб системиси арқилиқ тәсир қилғучиларниц тәсиридин илдам жавап қайтурушни әмәлгә ашуриду. Әсәб импульслирини хелила илдам өткүзүшигә бағлиқ организм қисимлири арисидики өз ара һәрикәтлиниш еһтияжіға мас илдам маңиду.

Мәркизий әсәб системисиға мейә билән жулун ятиду. Мәркизий әсәб системисиниң асасий вә мәхсус хизмити — әмәлиятта бизниң һәммә һәрикитимизгә жавап қайтуруидиған рефлексларни әмәлгә ашуруш. Мәркизий әсәб системиси барлиқ қалған әзалар вә системилар билән чәтки әсәб системиси арқилиқ бағлинишиду, уларға баш сүйәк-мейә әсәблири (12 жүп) вә жулун әсәблири ятиду (181-сүрәт).

Шуниң билән биллә мәркизий әсәб системиси: *көрүш, аңлаш, тегишни сезиш, пурақ сезиш охшаш сезиш әзалириға, шундақла сезимгә (эмоциягә), ойға, әстә сақлашқа жавапкәр.*

Мейә юмшақ кавак тәхлит әсәб һүжәйрилири — нейронлардин тәркип тапиду. Чоң адәмниң мейиси 1200—1500 г болиду. Мейә үч асасий бөлүмдин — йерим шарлардин (оң вә сол), кичик мейә вә мейә ғолидин тәркип тапиду. Мейә ғоли бир таллап жулун ғолиға орунлишидиған жулунға четилиду. Бу ғол омуртқа тени билән доғисидин түзүлиду.

Һәммимизгә мейиниң ақ вә сур маддиси дегән чүшәнчә тонуш. Улар немини билдүриду? Ақ мадда — бу әсәб йоллирини түзүп, нейронлар тенини бағлаштуридиған әсәб талчиқлири. Мейиниң сур маддиси нейронлар тенидин тәркип тапиду.



181-сүрәт. Адәмниң әсәб системиси

Оң вә сол тәрәп мейә йерим шарлири мейиниң асасий хизмитигә — әхбаратни елиш, қайта ишләш вә сақлашқа җавапкәр. Мейидики әсәб талчиқлириниң кирикиши арқилиқ оң тәрәп йерим шарлири тәнниң сол тәрәп йеримиға, сол тәрәп йерим шарлири болса оң тәрәп йеримиға җавапкәр болиду.

Кичик мейиниң арқа тәрипигә орунлишиду. У қозғилишқа (координациясигә) җавап бериду. Кичик мейиниң арқисида биз маңимиз, қол билән нәрсиләрни туталаймиз в.б.

Мейә ғоли — мейә билән жулунниң арасида орунлашқан мейә қисми. У қосақ ечиш, шундақла жүрәкниң соқуши, нәпәс елиш вә тәнниң температуриси охшаш аддий хизмәтләргә җавапкәр. Мейини сиртқи муһитниң тәсиридин өзи орунлашқан баш устихини қоғдайду. Шуниң билән биллә у алаһидә суюқлуқ — жулун суюқлуғи (ликвор билән) билән жуюлиду. Жулун суюқлуғи баш устихининиң ойман йеридә мәлум бир қисимда болиду. Жулун суюқлуғиниң мейигә чүширидиған қисими *баш устихини ичидики қисим* дәп атилиду. Мейә сирт тәрипидин юмшақ вә қаттиқ қәвәтләр билән қапланған. Уларға соғ тегишидин менингит тәрәққий етиду (латинчә *meninx* — мейә қепи).

Мейә йерим шарлири икки қисимға бөлүниду. Мейиниң йерим шарлириниң һәрқайсиси алтә қисимға бөлүниду: маңлай қисми, чоққа қисми, чеккә қисми, йәлкә қисми, мәркизий қисим вә лимбикилик қисим. Мейиниң һәрбир қисми бир хизмәткә җавап бериду: мәсилән, маңлай қисми сөzlәш охшаш асасий хизмәткә җавап бериду, чеккә қисми тавуш тәсирлирини қобул қилишқа җавапкәр.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Организм хизмәтлирини рәтләштә асасий роль атқуридиған система қайсиси?
2. Организм еһтияҗиға мас қисимлири арасида тез арида бағлиниш қандақ шәкиллиниду?
3. Мәркизий әсәб системисидин немидин туриду?
4. Мәркизий әсәб системисиниң асасий мәхсус хизмити немә?
5. Мейә билән жулун өз ара қандақ бағлинишқан?
6. Мейидин нәччә жүп баш сүйәк-мейә әсәблири тарайду?



1. Сол вә оң тәрәп мейә йерим шарлириниң хизмитигә қисқичә обзор бериңлар.
2. Мейә қандақ қоғдилидиғанлиғиға қисқичә обзор бериңлар.




Сүрәттә 1 вә 2 санлири билән немә көрситилгән? һәрбир қисимға қисқичә тәрип-лимә бериңлар.



Жүмлиләрни толуктуруп дәптәргә көчирип йезиңлар.


1. Әсәб системиси ... бөлүниду.



2. Әсәб системисиниң қатнишиши билән организмниң рецепторларға тәсир қилишиға жавап реакцияси ... дәп атилиду.
3. Әсәб һүжәйрилири тәнчилириниң мәркизий әсәб системисидин сирт жиғилиши ...
4. Ёлинған әхбаратни тәһлил қилиш билән синтезлашни әмәлгә ашуридиған чоң йеримшар қепиниң бәлгүлүк бир орни ...



Дәптәргә сизип, “Адәмниң әсәб системисиниң қисимлири” сизмисини толтуруңлар.



Немишкә организмниң координациялик вә регуляциялик иш-һәрикитидә әсәб системиси йетәкчи орун алиду? Баһалаңлар.

§ 107. МЕЙИНИҢ ТҮЗҮЛҮШИ ВӘ ХИЗМӘТЛИРИ

Бу дәристә:

- мейиниң түзүлүши билән хизмитини оқуп үгинисиләр.
- мейиниң түзүлүши билән хизмитини тәрипләшни билидиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?


- Мейә қандақ қисимлардин туриду? Жутуш, чүшкөрүш, шөлгәй бөлүш рефлекслири мейиниң қайсу қисмида әмәлгә ашиду? Мәркизий мейә қандақ рефлексларни әмәлгә ашуриду? Һәрикәт координациясини мейиниң қайсу қисми башқуриду? Униң түзүлүш алаһидиликлири қандақ? Арилиқ мейиниң хизмити немә?

Адәмниң мәркизий әсәб системисини мейә вә жулун төшкил қилиду.

Мейә ғолидин (униң филогенетикилик интайин бурунқи мәркәзлири сопақ мейидә, мәркизий вә арилиқ мейидә орунлашқан), мейичидин вә чоң мейә йочуқлиридин тәркип тапиду, униң сүр маддиси, йәни чоң мейә йочуқлириниң қәвити эволюциялик турғида мейиниң әң яш қисми болуп һесаплиниду (182-сүрәт).

Тирәк чүшәнчиләр:

- кичик мейә
- мейә ғоли
- созунчақ мейә
- көрүк
- мәркизий мейә
- арилиқ мейә
- чоң мейә йочуқлири



182-сүрәт. Мейиниң кесилип көрситилгән асасий қисимлири

Кичик мейә өткүзгүч йоллири арқилиқ әсәб системисиниң барлиқ қисимлири билән бағлинишиду. Униң асасий хизмити — һәрикәтни йетилдуруш, тәңпуңлуқни сақлаш вә булжуң тонусини турақлиқ дәрижидә тутуш. Һайванатларда кичик мейә елип ташлаш яки униң зәхмилинишиниң ақивити мундақ болиду: а) булжуң тонуси бирдин төвәнләп, улар һалсизлиниду; ә) һәрикәтлиниш вақтида чапсан һерип қалиду; б) һәрикәт-қозғилиши бузулуп, тәңпуңлуқни сақлаш мүмкин болмайду; в) аяқ-қолниң вә башниң титириши байқилиду.

Созунчақ мейә билән униңға яндишип орунлашқан көрүктә нәпәс елиш, чайнаш вә жутуш һәрикәтлириниң, жүрәкниң иш-һәрикитини, мадда алмишишни рәтләшниң мәркәзлири, шундақла бирқатар қоғдиниш рефлекслириниң — чүшкүрүш, йетилиш, көз һәрикити, көздин яшниң бөлүнүши, қарчуқлириниң йоғириши билән кичиклиши, тәнни у яқ-бу яққа бураш, һошиярлиқ, шунин билән биллә вестибула апаратиниң һәрикәтлинишигә вә боюн булжуңлири тонусиниң өзгиришигә бағлиқ болидиған тән һалитиниң рефлекслириниң мәркәзлиригә орунлашқан.

Оттура мейә төрт әгилмә вә мейә айиғидин ибарәт, бу йәрдики қизил ядролар билән қара маддида сезимтал вә һәрикәт мәркәзлири орунлашқан. Оттура мейиниң хизмити — булжуң тонусиниң бирхил тарилишини тәминләш, статикилиқ рефлекслар (тәнниң түз турушиниң, түз һәрикәт қилишиниң рефлекслири) вә статокинетикилиқ рефлекслар: тәнниң илдам түз сизиклиқ яки айлинип һәрикәтлиниши, башни тез бурап қараш, йорук вә тавуш тәсиригә тәйярлаш, туюқсиз пәйда болған йорукқа вә туюқсиз чиққан тавушқа һошиярлиқ билән қараш рефлекслири в.б.

Арилиқ мейиниң түзүлүши бираз мурәккәп, униңда көрүш әгилмилири, һалсиз тән вә әчилмиасти орни орунлашқан. Арилиқ мейә мурәккәп болуп яралған маслашқан һәрикәтләрниң (шәртсиз рефлексларниң вә сезишниң) әзаси болуп һесаплиниду.

Көрүш әгилмисигә мәркәзгә интилғучи, йәни сезимтал нейронлар келип, барлиқ рецепторлардин һәрикәтни йәткүзиду. Мәхсус талчиқларниң ярдими билән улар мейә қәвити билән бағлинишиду. Мейә қәвитигә келидиған барлиқ сезимтал нейронлар мәжбурий түрдә көрүш әгилмилири арқилиқ өтиду. Көрүш әгилмисиниң зәхмилиниши

сезимталлиқниң бузулушиға, һәтта толуги билән йоқ болушиға елип келиду.


Һалсиз тән һәрхил һәрикәтләрни башқуридиған барлиқ һәрикәтләндүргүч мәркәзлириниң жиғиндиси болуп һесаплиниду. Бу йәрдин көплигән мәркәздин интилғучи, йәни һәрикәтләндүргүчи нейронлар чиқип, һәрхил булжуң топлириға йөнилиш алиду. Һалсиз тәнниң зәхмилиниши бирмунчә һәрикәтләрниң бузулушиға, һәтта паләч ағриғиға елип келиду.

Һалсиз тән бағлаштурғуч талчиқлар арқилиқ көрүш әгилмиси билән бағлиншиду, нәтижисидә рефлекслиқ доғиларниң көпчилиги мейә қәвити арқилиқ өтмәй, арилиқ мейидә тохтап қалиду: сезимтал әсәб импульслири көрүш томпиғидин удул Һалсиз тәнниң һәрикәтләндүргүчи мәркәзлиригә берип, организмниң мошунинға мувапиқ реакцияси ишқа ашурулиду. Мәсилән, меңиш, жүгрәш вақтидики яки тамақлиниш пәйтидики автоматлиқ түрдики мувапиқ һәрикәтләр вә ш.о.


Әгилмә асти орун вегетативлиқ әсәб системисиниң жуқури әзаси болуп һесаплиниду. Бу йәрдә организмдики мадда алмишишниң, томур һәрикәтлириниң мәркизи, иссилиқни рәтләш, тән температури-сини турақлиқ сақлаш мәркизи в.б. топланған. Әгилмә асти орунниң ярдимидә арилиқ мейә түрлүк (сезиш шараитлириға бағлиқ) нәпәс елиш вә жүрәкниң соқушиниң илдамлиғиниң өзгириши, үзниң қизириши яки һал болуши, ички секреция бәзлири ишиниң өзгириши охшаш вегетативлиқ һәрикәтләрни әмәлгә ашуриду.

Чоң мейә йерим шарлири. Икки чоң мейә йочуқлириниң һәрқайсиси өзлириниң алайтән хизмитигә жавапкәр. Мәсилән, адәмниң мейә йочуқлириниң сол тәрипиниң хизмити бесим болса, у оңхай, оң тәрипи бесим болса, у адәм солихай. Мейиниң сол тәрәп қисми бизниң мәнтиқий (һесап чиқариш, һесаплаш) ойлаш қабилийтимизгә жавапкәр. Оң тәрәп қисми ижадий йөнилишкә, мәсилән, музыка, сүрәт селишқа қабил, шундақла һесап чиқаришқа қабилийәтлик, бирақ адәттики әмәс, башқа алаһидә усуллар билән чиқаришқа қабилийәтлигигә жавапкәр. Әгәр мошу икки қисимниң ойлаш типлирини ажратсақ, у вақитта сол қисмиға абстрактикилик-мәнтиқий, оң қисмиға болса бошлуқ-тәсвирий ойлаш типи хас екәнлиги ениқланди. Чоң мейиниң йочуқлири көплигән башқиму һәрикәтләрни башқуриду, мәсилән жутуш, чүшкүрүш, йөтилиш в.б.

Мейә йочуқлири бирнәччә қисимларға бөлүниду. Һәрбир қисимниң атқуридиған өзиниң хизмити бар (183-сүрәт).



183-сүрәт. Чоң мейә йерим шарлири



184-сүрөт. Мейө қатлиминиң ойманлири вө қисимлири

Чоң мейө йочуқлириниң түзүлүши (184-сүрөт). Мейө йочуқлириниң һәрқайсиси йоған ойманлар билән бирнөччө қисимларға бөлүниду. Ойманларниң асасий үч түри бар:

- мәркизий ойман, маңлай қисмини чоққа қисмидин ажритиду;
- биқин оймини, чеккө вө чоққа қисимларни ажритиду;
- чоққа — йөлкө арилиқ ойман, чоққа вө гөжгө қисимлирини бир-биридин ажритиду.

Қәвәт турақлиқ һаятликни тәминләйдиған барлиқ һәрикәтләрни рәтләш вө йетилдурушта интайин әһмийәтлик роль атқуриду. Мейө йочуқлириниң умумий мөлчәриниң 45% -и қатлам үлүшигә тегишлик.

Шуниң билән биллә мейө қатлими мәркизий әсәб системисиниң ишлирини рәтләйду. Қатламниң қисимлири пәқәт өз ара бағлинишипла қалмай, қатлам асти тәркиплири биләнму бағлинишиду. Пәқәт адәмниң мейисиниң қатлимила тәрәққиятниң әң жуқури дәрижисигә йәткән.

Маңлай қисми мейө йочуқлириниң алдинқи тәрипини толуғи билән елип ятиду. У чоққа қисмидин мәркизий, чеккө қисмидин биқин ойманлири арқилиқ чәклиниду. У йәрдә төрт азгалчө бар, салмиғи тәхминән 500 г-ни тәшкил қилиду. Маңлай қисминиң атқуридиған хизмити:

- әркин һәрикәтләрни йетилдүрүш;
- сөzlәш аппаратини рәтләш;
- ойлаш һәрикәтлирини рәтләш.

Маңлай қисмидики мәркизий азгалчө мәркизий йетилдүргүч болуп һесаплиниду, әркин һәрикәтләрниң рәтлигүчиси. Мошу азгалчидики қатламниң чоңқурлуғи пирамидилиқ йолниң башланмиси болуп, мошуниң арқилиқ импульсларниң шәкиллиниши вө берилиши маңиду. Униң жуқарқи арқа жайида иш-һәрикәт мәркизи орунлашқан. Мошу мәркәз әркин һәрикәтниң әмәлгә ашурулушиға, булжуң тонусини вө тән тәңпуңлуғини сақлашқа мүмкинчилик бериду.

Адамның мейісі біртұташ һәрикәт қилиду вә психикилик хизмитиниң материаллик асаси болуп һесаплиниду. Яд, сөzlәш, ойлаш, ижадий жәриялар, шәхсниң сапалиқ алаһидиликлири охшаш мөхсүс психикилик һәрикәтләр чоң мейә йочуқлири билән бағлинишлиқ.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:




1. Мейиниң қисимлирини атаңлар.
2. Созумчақ мейиниң хизмити қандақ?
3. Мәркизий мейә қандақ хизмәт атқуриду?
4. Арилиқ мейиниң хизмити қандақ?
5. Кичик мейә қандақ хизмәт атқуриду?
6. Чоң мейә шарлириниң түзүлүши қандақ?
7. Мейә қатлими қандақ хизмәт атқуриду?
8. Чоң мейә қандақ қисимлардин туриду?



Чоң мейә йочуқлириниң қисимлиридики орунларниң хизмитини атап бериңлар.



Мейиниң түзүлүшигә тәриплимә бериңлар.



1. Әмәлий иш мабайинида созунчақ мейиниң хизмитини ениқлаңлар. Созунчақ мейиниң шәртсиз рефлексил тилниң томури, мошу рефлексниң рефлексогенлик орниға тәсир йәткүзмәй әмәлгә ашурулмайдиганлиғини дәлилләңлар. Қатаридин бирнәччә қетим жутуш һәрикитини ясаңлар. Силәр немә байқидиңлар? Шөлгәйсиз жутуш һәрикити мүмкинму? Немишкә?
2. Әмәлий иш мабайинида мейичә хизмитини ениқлаңлар.
А. (бармақ-бурун билән синаш) Көзни жумуңлар, оң қолниң көрсәткүч бармиғиниң учини бурунниң учиға тәккүзүңлар, қалған бармақлириңлар болса муштумға жиғилған болсун. Силәрниң қолуңлардин кәлдимү?
Ә. Жүплүк иш өткүзүңлар. Бири (тәтқиқат жүргәзгүчи) жәйнәктин қолини пүкиду. Иккинчиси (тәжрибә ясиғучи) биринчисиниң қолини биләккә йеқин тутуп алиду вә тәтқиқат жүргәзгүчигә тосалғуға қаримай қолини өзигә қаритип тартишни тәклип қилиду. Шуниндин кейин тәжрибә ясиғучи туюқсиз тәтқиқат ясиғучиниң қолини қоюп бериду. Қоли немә болди?



Әмәлий иш мабайинида мәркизий мейиниң хизмитини ениқлаңлар. Тәжрибә ясиғучи тәтқиқат жүргәзгүчигә халиған мәтинни аста оқушни тәклип қилиду. У оқушқа киришкәндин кейин қаттиқ чавак чалиду. Немә болуватиду? Немишкә оқуғучи китаптин бешини көтирип, көзини саңа қаратти?



Әмәлий иш мабайинида арилиқ мейә хизмитини ениқлаңлар. Синипдашлар билән ишләңлар. Тәтқиқат жүргәзгүчиләргә қушларниң учушини яки уссул ойнап, қоли билән аста һәрикәт қилиш тәклип қилиниду. Тәжрибә ясиғучи туюқсиздин “қетип қал” командисини бериду. Мошу вақитта “қетип қал” командиси һәрикәтниң тохтап қелишини пәйда қилиду вә мәлум бир тән һалити туруп қалиду. Булжуңларниң бир вақитта сиқилип қелиши немигә бағлиқ мүмкин болиду?

Билгәнгә маржән!

Әқил-ой иши билән шуғуллинидиған адәмләр мейә ағриқлириға селиштурма түрдә аз учрайду. Бу мәлуматларни статистикилик топниң 100 000 адимигә тәһлил қилиш нәтижисидә британиялик алимлар 2015-жили алди. Шунинң билән биллә интеллектуаллар сәмирмәйду.

§ 108. ЖУЛУННИҢ ТҮЗҮЛҮШИ ВӘ ХИЗМИТИ

Бу дәристә:

- Жулунниң түзүлүши билән хизмитини оқуп үгинисиләр;
- Жулунниң түзүлүши билән хизмитини билидиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Жулун қандақ қоғдилиду? Жулун дегән немә? Жулундин нәччә жүп жулун әсәблири тарайду? Жулунниң ички түзүлүши қандақ? Қандақ нейронлар сезимталлиқ реакциясини тәминләйду? Һәрикәт реакцияси қайси нейронларға тәәллүк?


Тирәк чүшәнчиләр:

- жулун
- жулунниң қаплири
- жулун әсәблири
- қозғалтқучи йоллар
- марказгә тәпкүчи йоллар
- марказдин тәпкүчи йоллар
- рефлекс
- жулунниң хизмити

Жулун омуртқиларниң биқин өсүндилиридин түзүлгән омуртқа йотисиниң ғолида, йәни жулун каналида орунлашқан вә у үч түрлүк: юмшақ, торлуқ вә қаттиқ қаплар билән қапланған (185-сүрәт). Жулун мейә ғолиниң давами болғини билән униң түзүлүшидә өзигә хас алаһидиликлири бар. У узунлуғи 40—45 см, диаметри 1,5 см-ға йеқин ақ рәңлик йоған жип тәхлит болиду.


Жулунниң алдинқи вә артқи тәрәплиридә уни узунлуғи бойичә оң вә сол қисимларға

бөлүдиған ойманлар орунлашқан. Жулунниң түзүлүшидики алаһидилиги — сегментләнгән болуши. Сегментларниң сани — 31. Һәрбир сегменттин бир жүп қозғалтқучи (алдинқи) вә бир жүп сезимтал (артқи) томурлар чиқиду. Боюн қисминиң сегментлиридин 8 жүп, мәйидин 12 жүп, бөлдин 5 жүп, сәккизкөздин 5 жүп вә қуюмчақтин 1 жүп қозғалтқучи вә сезимтал жулун томурлири түзүлиду. Қозғалтқучи вә сезимтал томурла жулундин чиқип, омуртқа арилиқ төшүкләргә қарап маңиду, мошу йөрдә артқи сезимтал томурлардин жулун түгүчлири түзүлиду. Алдинқи вә артқи томурлар қошулуп, барлиғи 31 жүп арилаш




185-сүрәт. Жулун қепи

жұлун әсәблирини тәшкіл қилиду. Улар омуртқа арилиқ төшүкләрдин чиқидиған жайда боюн, мүрә, бәл-сәккизкөз өрүмлерини түзиду, улардин башлинидиған чәтки әсәбләр скелет булжуңлириға тарайду. Боюн-мүрә өрүмидин чиқидиған жәйнәк, қери илик, мәркизий әсәбләр қол булжуңлириниң иш-һәрикитини башқуриду. Бәл-сәккизкөз өрүмидин қуюмчақ, сәккизкөз, оттура илик вә башқа әсәбләр чиқип, пут булжуңлириниң иш-һәрикитини башқуриду. Жулунниң тик кесиндисигә диққәт қилип, униң ички қурулуши билән тонушушқа болиду (186-сүрәт). Жулун ақ вә сүр маддин туриду. Сүр мадда оттураиға орунлашқан, у латинниң *N* һәрипигә яки қанитини яйған кепинәккә охшайду. Сүр маддиниң оттурисидин узунлуғи бойичә жулун ғоли өтиду, у йәрдә жулун суюқлуғи болиду. Жулун ғоли мейигә йәткәндә кәңийип, мейә қеринчилирини түзиду. Сүр маддиниң алдинқи тәрипидики йоғанирақ, қисқа әсүндилири алдинқи мүнғүзлири, артқи узунирақ әсүндилири артқи мүнғүзлири дәп атилиду. Биқин әсүндилири биқин мүнғүзлирини тәшкіл қилиду. Артқи мүнғүзгә артқи сезимтал томурлар кириду, алдинқи мүнғүздин булжуңларға йол тутқан алдинқи қозғалтқучи томурлар чиқиду. Биқин мүнғүзлиридә вегетативлиқ әсәб системисиниң ядролири орунлашқан.



186-сүрәт. Жулунниң тик кесиндиси:

А. I — боюн қисми; II — артқи қисим; III — бәл қисми; IV — сәккизкөз қисми; V — қуюмчақ қисми.
Ә. Жулун вә униңдин тарайдиған жулун әсәблири билән жулун әсәб түгүчлири



187-сүрөт. Жулунниң боюн қисминин тоғра кесиндиси:


Кр — қан томурлири, артерияләр вә веналар; С_I — алдинқи мәркәздики йочуқ; I — алдинқи бағ; II — биқин бағ; III — кейини бағ; Б — Бурдах топи; Г — Голл топи; А.т. — алдинқи томурлар; Арт. т — артқи томурлар; Ю.к. — юмшақ қап; Θ — мәркәзий ғол; М_I — алдинқи мүнғүз; М_{II} — артқи мүнғүз; С_{II} — арқидики мәркәз йочуғи; С_{III} — арқидики арилиқ ойман

интилғучи (эфферентлик) өткүзгүчләр — қозғалтқучи импульсларни мейә ғолидин вә мейиниң башқа қисимлиридин жулунға йөткүзиду. Мәркәзгә тәпкүчи йоллар артқи вә биқинлик столбиклар билән өтиду, мәркәздин тәпкүчи йоллар алдинқи вә биқин столбиклири билән өтиду.

Сүр маддиниң хизмити — сезимтал импульсларни жулунниң қозғалтқучи рецепторлириға тошуйду. Мәсилән, сиртқи муһитниң тәсир қилиши териниң сезимтал рецепторлиридин сезимтал әсәбниң бойи билән омуртқаарилиқ түгүнгә, униңдин кейин жулунниң артқи томури арқилиқ артқи мүнғүзигә берилиду. Сезимтал импульслар нерисиға қозғалтқучиға (алдинқи мүнғүз) тоғра берилиши яки арилиқ нейронлар арқилиқ әмәлгә ашурулуши мүмкин. Сезимтал импульслар келип чүшкән вақитта қозғалтқучи импульслар пәйда болиду. Улар қозғалтқучи томурлар вә әсәбләр арқилиқ булжуңларға йөнилиш алиду, булжуңлар сиқилип, һәрхил қозғилишлар орунлиниду. Шунин билән жулун дәрижисидә аддий рефлекслик доға шәкиллиниду, бу жулун автоматизми түрлириниң бири болуп һесаплиниду (188-сүрөт).

Рефлекслик жәриянниң иккинчи көрүнүши жулунниң өткүзгүчлүк хизмити билән бағлиқ. Бу йәрдә сезимтал импульслар боғумлардин, бағламлардин, булжуңлардин нери қарап өрлимә (мәркәзгә тәпкүч) йоллар системиси арқилиқ қапасти түзүлүшләргә вә мейә қепиға берилиду. Мошундақ қапниң жуқури қисми чәтки орунниң һалити тоғрилиқ тәшвиш (сигнал) алиду.

Жулунниң боюн қисминин тоғра кесиндиси (187-сүрөт). Жулунниң сүр маддиси миелинлик талчиқлардин туридиған ақ мадда билән қоршалған. Миелинлик талчиқлар алаһидә топларға жиғилиду, уларни столбиклар дөп атайду. Ундақ болса, алдинқи мүнғүзләрниң арисидә алдинқи столбиклар, артқилириниң арисидә артқи столбиклар орунлашқан. Мошу столбиклар арқилиқ жулунни мейә билән бағлаштуруш хизмитини атқуридиған өткүзгүч әсәбләр өтиду. Өткүзгүчләрниң төвәндикичә түрлири бар: өрлимә яки мәркәзгә тәпкүчи өткүзгүчләр (афферентлик) — сезимтал импульсларни чәтки әзалардин мейигә йөткүзиду вә төвән чүшидиған яки мәркәздин



188-сүрәт. Теридин булжунларға жулун арқилиқ һәрикәт өткүзүшниң сизмиси (рефлекторлуқ доға):

- 1 — артқи томур; 2 — омуртқа арилиқ түгүн; 3 — қобул қилғучи нейрон тени; 4 — алдинқи томур; 5 — қозғалтқучи нейрон

Мейә қепи өз новитидә чәттики қозғалтқучи рецепторларға вә булжунларға йөнилиш алған төвән чүшидиған (мәркәздин тәпкүч) йоллар системиси арқилиқ жавап импульслирини әвәтиду, нәтижидә мувапиқ қозғилиш һәрикәтлириниң рәтлиниши әмәлгә ашиду. Жулунниң сұр маддисини бойлап асасий вегетативлиқ мәркәзләрниң қатарин орунлашқан. Атап ейтқанда, жуқарқи боюн сегментлирида диафрагмининиң ишини рәтләйдиған мәркәз, VIII сегментида қарчуқни көңәйтидиған мәркәз бар. Төвәнки қисимда (бәл-сәккизкәз) кавакниң вә тик үчәйниң, шунин билән биллә жинис әзалириниң һәрикитини рәтләйдиған вегетативлиқ мәркәзләр орунлашқан.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Жулун сиртидин қандақ қоғдалған?
2. Жулунниң һәрбир сегментидин қанчә жүп жулун әсәблири чиқиду?
3. Жулунниң алдинқи вә артқи томурлиридин түзүлгән өрүмләрни атаңлар.
4. Өрүмләрдин немә башлиниду?
5. Қандақ қурулумлар алдинқи вә артқи мүңгүз дәп атилиду?
6. Алдинқи вә артқи томурлар немидин түзүлгән?
7. Жулунниң хизмитини атаңлар.




Адәмниң рефлекслиқ һәрикәтлиригә толук тәриплимә бериңлар.




Сүрәтләрниң сан арқилиқ берилгән қисимлирини атаңлар.

А. 1 дин 9 ғичә.

Ә. 1 дин 10 ғичә.



А




Ә



Атқуридиған хизмитигә бағлиқ нейронлар _____ вә _____ нейронлар болуп бөлүниду. Әсәб системисиниң асасини _____ әсәб һүжәйрилири тәшкил қилиду. Әсәб һүжәйрилириниң тәнлири пичими бойичә һәртүрлүк болуп келиду, өсүндилири болса, һәртүрлүк узунлуқта болиду: қисқилири _____, узунлири болса _____ атилиду. Мәркизий әсәб системисиға _____ билән _____ ятиду, чәтки әсәб системисиға болса, _____ билән _____ ятиду. Шәртсиз рефлекслар әвлаттин-әвлатқа берилиду, шуңлашқа уларни _____ дәпму атайду. Әсәб импульсиниң өзи пәйда болған орундин ишчи әзағичә болған йоли _____ дәп атилиду.



1. Сүрәттә жулун ғоли _____ сани билән бәлгүләнгән, _____ толтурулған.
2. Жулунниң өткүзгүчлүк хизмитигә бағлиқ қатарни таллаңлар:
 - пут-қолларни сақайтиш;
 - жулундин мейигә әсәб импульслирини бериш;
 - қолни иссиқ маддидин тартип елиш;
 - тиз рефлекси;
 - мейидин булжуңға әсәб импульсиниң берилиши.



§ 109. МЕХАНОРЕЦЕПТОРЛАРНИҢ ТҮРЛИРИ. ПАЧИНИ ТӘНЧИСИ МИСАЛИДА ТӘСИР ЙӨТКҮЗГҮЧИЛӨРНИҢ ӨЗГИРИШИГӘ МЕХАНОРЕЦЕПТОРЛАРНИҢ РЕАКЦИЯСИ

Бу дәристә:

- Механорецепторларниң түрлирини вә Пачини тәнчиси мисалида тәсир йөткүзгүчиләрниң өзгиришигә механорецепторларниң реакциялирини окуп үгинисиләр;
- тәсир йөткүзгүчиләрниң өзгиришигә механорецепторларниң (Пачини тәнчиси) қандақ жавап қайтуридиғанлиғини тәрипләшни үгинисиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Рецептор дегән немә? Қандақ рецепторлар болиду?

Тирәк чүшәнчиләр:

- механорецепторлар
- Пачини тәнчиси
- илдам маслишидиған рецепторлар
- аста маслишидиған рецепторлар
- яндишиш рецепторлири
- барорецепторлар
- вестибулорецепторлар

Механорецепторлар (грекчә *mechanē* — құрал, латинчә *recipio* — елиш, қобул қилиш) — сезимтал әсәб талчиқлириниң учлиридики рецепторлар, һәрхил механикилик тәсир йөткүзгүчиләргә: яндишиш, қисим, созулуш, тәвренишләр в.б. сирттин яки организмниң ички өзалирида пәйда болған тәсирләргә жавап қайтуриду. Улар териниң һәрхил чоңқурлуғида вә һәрхил қурумилик түзүлүшлиридә орунлашқан. Бу рецепторларниң көпчилиги сезимтал

әсәбләрнің бош ятқан әсәб учлири болуп һесаплиниду. Уларның бира-зи һәрхил формидики капсулиларда орунлишиду. Адәмләрнің тәкши терисидә (йәни түклири йоқ терә) мошундақ рецепторларның төрт аса-сий типидә болиду: **Пачини тәнчиси, Мейснер тәнчиси, Меркель дискиси, Руффин тәнчиси вә Гольджи сиңирлиқ әзаси** (189-сүрәт).

Яндишишма (тактильлик) титиркәндүргүчиләргә (қоздурғучларға) жавап қайтуридиған механорецепторлар (теригә яндишиш яки қисимни сезиш) илдам вә аста маслишидиған болуп бөлүниду. Илдам маслишидиғанларға териниң түклүк бөләклиридики фолликулярлиқ түкләрнің рецепторлири, түксиз теридики Мейснер тәнчиси вә терә асти тоқулмисида орунлишидиған Пачини тәнчиси ятиду. Фолликулярлиқ түкләрнің рецепторлири билән Мейснер тәнчиси тәхминән 30—40 Гц илдамлиқтики, Пачини тәнчиси болса, тәхминән 250 Гц илдамлиқтики тәсир йәткүзгүчиләргә жавап қайтуриду.

Аста маслишидиған терә рецепторлириға **Меркель дискиси вә Руффин тәнчиси** ятиду. Меркель дискисиниң чекитлик рецепторлуқ мәйдани болиду, Руффин тәнчиси болса терә созулғанда активлинилиду, һәтта у рецептордин бираз арилиқта орунлишиду.

Механорецепторларның түрлири

Яндишиш механорецепторлири һайванатлар билән адәмләрнің сиртқи йепинчисидә орунлашқан, улар яндишишни, қисимни, созулушни, тәвренишләргә сезиду.

Механикилиқ тәсир йәткүзгүчиләрни икки типлиқ рецепторлар қобул қилиду: механорецепторлар, Пачини тәнчиси.

Барорецепторлар қан томурларда, жүрәктә, бирхил бағланған булжуңлуқ кавак әзаларда орунлишип, қан қисиминиң өзгириши вақтида қерин яки үчәйдә газ жиғилғандики созулушларға жавап қайтуриду.


Проприорецепторлар — булжуң-өгә аппаратида орунлашқан, скелет булжуңлириниң қисқириши яки бошиши вақтидики созулушларға жавап қайтуриду.

Вестибулорецепторлар (яки вестибулярлик аппаратниң механорецепторлири) тәнни яки башни егиш вақтидики илдамлиқ билән тәвренишләргә жавап қайтуриду.

Яндишиш механорецепторлири

Қисимни баһалайдиған механорецепторлар. Улар сиртқи тәсирләргә селиштурма түрдә аста маслишиду вә вақитни ажритишқа начар болуп санилиду.

Пачини тәнчиси пәйда болған мидирлашларға жавап қайтуриду. Пачини тәнчиси илдамлиғи бирнәччә йүзлигән герц болидиған тәвренишләрнің теригә тәсирини қобул қилиду. Шуниң билән биллә Пачини тәнчиси бармақ тамғилирини шәкилләндүридиған терә бәзлири билән комплекслиқ түрдә хизмәт атқуриду. Бу системилиқ орунлашқан



189-сүрәт. Механорецепторлар

гучи баш мейә мәркизидин тарайду. Тән иши башланған вақиттин башлап проприорецепторларниң активлиниши нәпәс елиш мәркизиниң активлиғиниң ешишиға вә өпкидики һава алмишишиниң илдамлишишиниң асасий сәвәви болуп һесаплиниду. Қовурға арилиқ булжунлар билән диафрагма проприорецепторлири созумчақ мейиниң нәпәс елиш мәркизиниң бирхил активлиғиға рефлекторлуқ жавап қайтуриду, у нәпәс елиш этапиниң һәрхил фазисидики мәйдә кавигиниң орунлишиш шараитиға, сегментлиқ дәрижидә нәпәс елиш булжунлириниң тонуси билән қисқираш күчигә бағлинишлиқ болиду.

Нәпәс елиш йоллириниң тоқулмилирида импульслири нәпәс елиш мәркәзлириниң нейронлириға йәткүзүлидиған механорецепторларниң икки асасий типни орунлашқан, улар: илдам маслишидиған рецепторлар вә созулуш рецепторлири.

Илдам маслишидиған рецепторлар жуқарқи нәпәс елиш йоллиринин башлап, альвеолағичә эпителийда вә субэпителий қәвитидә орунлашқан. Рецепторлар намаға мас тәсир йәткүзүш қисқа вақитта вә илдам тәсир қилғанда активлиғини төвәнлиту. Шунлашқа илдам маслишидиған рецепторлар тәсир йәткүзгүчиләр күчиниң өзгиришигә жавап қайтуриду. Бу рецепторлар пураш (чүшкүрүш) вә йөтилиш охшаш мурәккәп рефлексларниң башланмиси болуп һесаплиниду. Улар

бөдүрләр илдамлиқ сүзгүчи хизмитини атқуриду вә пәқәт пайдилиқ тәшвишләрни (сигналларни) таллашқа шараит яритиду, бу маддиларни сийпаш вақтида рельефни дәл ениқлашқа мүмкинчилик бериду.

Проприорецепторлар — булжун рецепторлири (мәсилән, булжун урчуғи билән сиңир рецепторлири — Гольджи өзаси). Бу рецепторлар мәхсус әмәс (пут-қол булжунлири билән сиңирлирида орунлашқан рецепторлар) вә мәхсус (нәпәс елиш булжунлирида орунлашқан рецепторлар) болуп бөлүниду.

Проприорецепторларниң импульслири көпинчә нәпәс елиш булжунлириниң көйни тәрипидики мәркизидә, шундақла скелет булжунлириниң тонусини назарәт қил

гекитөк билән бронхиның чаплашқақ қепаға механикилік яки химиявий тәсир йөткүзгүчиләрниң (чаң, тамака иси, аммиак, эфир охшаш оғилиқ маддиларның һори) чүшүши вақтида һәрикәтлиниду.

Аста маслишидиған рецепторлар өпкиниң созулуши вақтида асасий нәпәс елиш йоллиридики, йәни бронха тармақлиридики (бронха вә гекитөк) бирхил бағланған булжунларда чәклиниду (локализациялиниду) вә өпкиниң миқдариниң көпийиши (өпкигә һаваниң толүши) нәтижәсидә тәсирлиниду. Рецепторлар нәпәс елиш мәркизидики бош һәрикәтлинп жүргән әсәбниң миелинләштүрүлгән афферентлиқ талчиғиниң сиртқи нәпәс елиш нейронлириниң топлири билән бағлинишлиқ.

Бу рецепторларның стимули Геринг-Брейер рефлексини пәйда қилиду, у һайванатларда өпкигә һава толғанда нәпәс елиш фазиси нәпәс чиқариш фазисиға рефлекслиқ түрдә алмишишиға елип келишини байқилиду. Адәмниң сәгәк вақтида бу рефлексорлуқ эффект нәпәс елиш миқдариниң көпийишидә пәйда болиду, у нәпәс елишнинг бирхил миқдарини үч һәссигичә арттуриду. Ухлаш вақтида Геринг-Брейер рефлекси ярдими билән нәпәс елишнинг рефлексорлуқ тохтиши нәпәс елиш вақтиниң новәттики фазисиниң алмишишини тәминләйду.

Шуниң билән биллә өпкиниң J-рецепторлири альвеолиларның қовурғиси йенида капиллярлар билән яндашқан йәрләрдә орунлашқан вә улар өпкидинму, өпкә қан томурлири тәрипиниң кәлгәндиму тәсир йөткүзгүчиләргә жавап берәләйду. Рецепторлар нәпәс елиш мәркәзлири билән миелинсизләштүрүлгән афферентлиқ C-талчиқлири билән бағлинишқан. Бу рецепторлар өз активлиғини қан плазмисида водород ионлири концентрацияси ашқанда, өпкә тоқумилири қисилғанда яки өпкә көпкәндә ашуралайду. Өпкиниң J-рецепторлириниң әң чоң активлиғи тән һәрикити активлиғи ашқанда вә деңиз егизлигиниң интайин егиз кәтирилгәндә байқилиду. Бу шараитларда болидиған көрүнүсләр — кичик қан айлиниш чәмбиридики қан томурлири қисиминиң өзгириши, һәрхил дәрижидики өпкиниң көпиши. Мундақ шараитта J-рецепторлириниң тәсирлиниши пат-пат вә үстүн нәпәс елишни, рефлексорлуқ бронхоконструкциясини вә һасирашни пәйда қилиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Механорецепторлар — бу
2. Механорецепторларның төрт типини атаңлар.
3. Қайси механорецепторлар илдам маслишидиғанларға ятиду?
4. Аста маслишидиған механорецепторларни атаңлар.



1. Механорецепторларның қандақ түрлири болиду?

2. Проприорецепторларның роли қандақ?
3. Қайси механорецепторлар аста маслишидіғанларға ятиду?



1. Жәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

Механорецепторларның түрлири вә уларның хизмити

Механорецепторларның түрлири	Уларның хизмити

2. Жәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

Аста вә илдам маслишидіған рецепторларның әһмийити

Рецепторлар	Уларның хизмити
Илдам маслишидіған рецепторлар	
Аста маслишидіған рецепторлар	



1. Немә үчүн кичик мейә зәхмиләнгәндә адәм көзини жумуп һәрикәт қилалмайду?
2. Немә үчүн маддини яхши билиш үчүн адәм уни қол билән тутуп көрүши керәк?



“Механорецепторлар түрлири” мавзусиға дискуссия уюштуруңлар.

§ 110. ХОЛИНЕРГИЯЛИК СИНАПС ТҮЗҮЛҮШИ БИЛӘН ХИЗМИТИНИҢ БАҒЛИНИШИ

Бу дәристә:

- Холинергиялик синапсның түзүлүши билән хизмитиниң өз ара бағлинишини, холинергиялик синапс мисалида синапслиқ өткүзгүчлүк механизмини оқуп үгинисиләр;
- Холинергиялик синапсның түзүлүши билән хизмити арасида өз ара бағлиниш орниталайдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?


- Холинергиялик синапс дегән немә? Холинергиялик синапсның қандақ түрлири болиду? Холинергиялик синапсларда қандақ химиявий маддилар медиатор болуп һесаплиниду?

Тирәк чүшәнчиләр:

- холинергиялик синапслар
- медиатор
- ацетилхолин
- холинорецепторлар
- М-холинорецепторлар
- Н-холинорецепторлар

Холинергиялик синапслар икки нейронның яки нейрон билән тәшвиш қобул қилидиған эффе́кторлуқ һүжәйриләрның түгүлгән йери болуп һесаплиниду. Синапс икки мембранидин — синапс алди вә синапстин кейинки мембранидин вә синапслиқ кава́ктин ибарәт. Әсәб импульслири медиаторлар, йәни таратқучи маддилар арқилиқ

тәминлиниду. Бу рецепторлар билән медиаторларның синапстин кейинки мембраниға тәсир етиши нәтижисидә әмәлгә ашурулиду. Холинергиялик синапсның асасий хизмити мошу болуп һесаплиниду (190-сүрәт).



190-сүрәт. Холинергиялик синапс

Парасимпатиклиқ әсәб системиниң медиаторлири — **ацетилхолин** рецепторлири — икки түрлүк **холинорецепторлар**: Н (никотин) вә М (мускарин) болиду. М-холиномиметиклар — һәрикәтнің удул типига қабилыйәтлик, у синапстин кейинки мембрана рецепторлирини стимуляциялиши мүмкин.

Ацетилхолиннің синтезлиниши нейроннің холинергиялик учлиридики цитоплазмада әмәлгә ашиду. У холин билән келип чиқиши тәрипидин митохондриялик мадда ацетилкоэнзим-А-дин түзүлиду. Синтез цитоплазмилик энзим — холинацетилазиниң тәсиридин маңиду. Синапслиқ көвүкчиләрдә ацетилхолин сақлиниду. Һәрбир көвүкчидә бирнәччә миңға йеқин ацетилхолин молекулилири болуши мүмкин. Әсәб импульслири ацетилхолин молекулилириниң синапслиқ кавакқа бошап чиқишиға елип келиду. Мошуниндин кейин у холинорецепторлар билән өз ара һәрикәткә чүшиду.

Холинергиялик синапсның түзүлүши алаһидә. Биохимикларның мәлуматлири бойичә холинорецептор әсәб-булжуң синапси бәш белок суббирлигини қошуп алиду, улар ионлуқ ғолларни қоршайду вә липидлардин тәркип тапқан мембраниларның пүткүл қелинлигини тешип өтәләйду. Бу ионлуқ ғолларның ечилип, синапстин кейинки мембраниға берилишигә (деполяризациялиниду) елип келиду.

Холинергиялик синапсларның түрлири. Холинергиялик синапслар холинорецепторларның һәрхил жирақлишишиға (локализациялиниш) вә фармакологиялик маддиларның тәсиригә һәрхил дәрижидә сезимтал болушиға тәсир қилиду. Мошунинға бағлиқ төвәндикичә бөлүниду:

1) мускаринға сезимтал холинорецепторлар — М-холинорецепторлар. Мускарин алкалоид болуп һесаплиниду, у бирмунчә оғилиқ могуларға хас, мәсилән, мухоморға;

2) никотинға сезимтал холинорецепторлар — Н-холинорецепторлар. Никотин тамака йопурмиғиниң тәркивидики алкалоид болуп һесаплиниду.

Холинергиялик синапсларның орунлашқан йери. Биринчи эфферентлиқ әзаларның тәркивидики һүжәйриләрның синапстин кейинки мембранилирида орунлишиду. Улар парасимпатиклиқ талчиқларның ганглиядин кейинки учлирида орунлишиду. Шунин билән биллә вегетативлиқ ганглияләр билән мейә қепиниң нейрон

һүжәйрилиридә болиду. М-холинорецепторларның гетерогенлик локализациялиниши һәрхил, уныңға холинергиялик синапсларның тәбиитиниң фармакологиялик маддиларға сезимталлиғиниң һәрхил болуши сәвәпчи болидиғанлиғи ениқланған.

Холинергиялик синапсларның орунлишишиға бағлиқ түрлири. Биохимиклар М-холинорецепторларни орунлишишиға бағлиқ бирнәччә түргә бөлгән:

M_1 -холинорецепторлар — вегетативлик ганглияләр билән МНСда орунлашқан. Биринчилириниң алаһидиликлири синапстин сирт локализацияләнгән болуп һесаплиниду.

M_2 -холинорецепторлар — жүрәктә орунлашқан, уларниң бәзи бирлириниң ацетилхолинниң бошап чиқишини төвәнлитидиған хусусийити болиду.

M_3 -холинорецепторлар — бирхил бағланған булжунларда вә көп қисми эндокринлик бөзләрдә орунлишиду.

M_4 -холинорецепторлар — жүрәктә, өпкә альвеолилириниң қовурғисада, МНСда (ЦНС) орунлашқан.

M_5 -холинорецепторлар — МНСда, көзниң сиртки сүзүк қепада, шөлгәй бөзлиридә, моноклеарлик қан һүжәйрилиридә орунлишиду.

Холинорецепторларға тәсири. М — холинорецепторларға тәсир қилидиған тонулған фармакологиялик маддиларниң көрситидиған эффектиниң бесим қисми синапстин кейинки M_2 вә M_3 -холинорецепторларниң өз ара һәрикәтлири билән бағлинишлиқ (191—192-сүрәтләр).

Холинергиялик синапсларни стимуллиғучи қуралларниң бөлүнүши. Н-холинорецепторлар һәрбир ганглия алди талчиқлириниң учлиридики ганглия нейронлириниң синапстин кейинки мембранилирида (парасимпатикилиқ вә симпатикилиқ ганглияләрдә), синокаротидлик жайда, бөрәк үсти безиниң мейилик қәвитидә, нейрогипофизда, Реншоу һүжәйрилиридә, скелет булжунлирида орунлишиду. Һәрхил Н-холинорецепторларниң маддиларға сезимталлиғи бирдәк әмәс. Мәсилән, вегетативлик ганглия тәркивидики



191-сүрәт. Холинергиялик синапс түри



192-сүрәт. Холинергиялик синапсларниң орунлишиши

Н-холинорецепторлар (бетәрәп типидики рецепторлар) скелет булжуңидики Н-холинорецепторлиридин (булжуң типидики рецепторлар) хелила пәриқлиниду. Мошу алаһидиликлириниң арқисида улар мөхсус маддилар билән ганглияләрни таллап блоклайду. Мәсилән, кураре (булжуңни сал қилидиған өсүмлүк) тәхлит маддилар әсәб-булжуң өткүзгүчлүгини блоклашқа қабилыйәтлик.

Синапс алди холинорецепторлар билән аденорецепторлар тәбиити нейроэффекторлуқ синапслардин ацетилхолинниң бошап чиқиш жәриянини рәтләйду. Бу рецепторларниң һәрикәтлиниши ацетилхолинниң бошап чиқишиға шараит яритиду. Ацетилхолин Н-холинорецепторлар билән һәрикәтлинип, уларниң конформациясини өзгәртип, синапстин кейинки мембраниниң өткүзгүчлүк дәрижисини ашуриду. Ацетилхолин натрий ионлириға һәрикәтләндүргүч ретидә тәсир қилиду, нәтижисидә улар һүжәйрә ичигә кириду, у синапстин кейинки мембранида деполяризациялиниду. Алди билән йәрлик синапслиқ иқтидар пәйда болиду, у мөлүм бир мөлчәргә йәткәндә һәрикәт иқтидариниң генерациялиниши башлиниду. Мошуниндин кейин синапслиқ жайда чәкләнгән йәрлик һәрикәт һүжәйрә мембранисиниң барлиқ бетигә тарайду. Әгәр М-холинорецепторлири стимуляцияләнсә, тәшвишләрни өткүзүштә иккинчи рәтлик мессенджерлар билән G-белоклар әһмийәтлик роль ойнайду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Холинергиялик синапслар дегинимиз немә?
2. Медиатор өткүзгүчи маддиларниң роли қандақ?
3. Парасимпатикилик әсәб системисидики медиаторлар қандақ органикилик қошулмилардин туриду?
4. Парасимпатикилик әсәб системисиниң рецепторлири қандақ атилиду? Уларниң сани нәччә? Рецепторларниң түрлирини атаңлар.
5. Ацетилхолинниң синтези қайси йәрдә маңиду? Қандақ маңиду?
6. Мускарин билән никотин қандақ фармакологиялик маддиларниң тәркивигә кириду?
7. Холинорецепторлар қәйәргә орунлишиду?



Холинергиялик синапсларниң түзүлүши қандақ?



Жәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

Орунлишишиға бағлиқ холинорецепторларниң түрлири

Холинорецепторларниң түрлири	Уларниң орунлашқан йери



Параграф мавзусиға презентация тәйярлаңлар.



БАП БОЙИЧӘ БИЛИМНИ СИСТЕМИЛАШ ВӘ ЙӘКҮНЛӘШ СОАЛЛИРИ БИЛӘН ТАПШУРМИЛИРИ

1. Әсәб һүжәйрилириниң түзүлүш алаһидиликлири қандақ?
2. Миелинлик қап дегән немә?
3. Нейронәйчиләр қандақ хизмәт атқуриду?
4. Нейронларниң қандақ түрлири болиду?
5. Униполярлик нейронларниң хизмити қандақ?
6. Биполярлик нейронларниң хизмити қандақ?
7. Мультиполярлик нейронларниң түзүлүши билән хизмитиниң алаһидилиги қандақ?
8. Һәрикәт иқтидари — бу
9. Һәрқандақ Һәрикәт иқтидариниң асасида қандақ һадисә бар?
10. Һәрикәт иқтидариниң фазилирини атаңлар.
11. Һәрикәт иқтидариниң һәрбир фазисиға қисқичә тәриплимә бериңлар.
12. Һәрикәт иқтидариниң инициацияси билән трансмиссияси — бу
13. Нейронниң аксон бойи билән импульслириниң берилиши қандақ әмәлгә ашиду?
14. Нейромедиатор — бу
15. Рефрактерлик басқуч немини билдүриду?
16. У һүжәйриләрниң (әсәб, булжуң) қайсисида узағирақ болиду?
17. Нейронларниң миелинлинишиниң артуқчилиғи немидә?
18. Әсәб импульслириниң сальтаторлуқ өткүзүлүши — бу
19. Хизмити бойичә барлиқ әсәб системиси ... бөлүниду.
20. Жулунниң өткүзгүчи йоллири қәйәргә орунлашқан?
21. Қозғалтқучи нейронлар жулунниң қайси қисмида орунлишиду?
22. Хизмити бойичә жулун әсәблири қандақ бөлүниду?
23. Чоң мейә йочуқлириниң қайси қисмида сезимтал көрүш орни орунлишиду?
24. Рефлекс — бу
25. Организмдики хизмәтлириниң рәтлиниши ... әмәлгә ашиду?
26. Рефлекс доғисини дурус тәртип билән орунлаштуруңлар.
а) арилиқ нейрон; ә) рецептор; б) қозғалтқучи нейрон;
в) сезимтал нейрон; г) иш әзаси.
27. Орунлишишиға бағлиқ (анатомиялик) әсәб системисини ... қисимларға бөлиду.
28. Әсәб импульслириниң рецепторлардин иш әзалириға баридиған йоли ... дәп атилиду.
29. Нейронларниң қийилишидиған орнини ... дәп атайду.
30. Рецептор — бу
31. Мәркәздин чәткә қарап жулунниң түзүлүшини дурус тәртип билән орунлаштуруңлар.
1 — сүр мадда; 2 — ақ мадда; 3 — жулун ғоли.
32. Рефлекс доғиси — бу

ҺӘРИКӘТ

11

§ 111. ТОҒРА ЙОЛЛУҚ БУЛЖУҢ ТОҚУЛМИЛИРИНИҢ ТҮЗҮЛҮШИ. МИОФИБРИЛЛ ТҮЗҮЛҮШИ

Бу дәристә:

- тоғра йоллуқ булжуң тоқулмилириниң түзүлүшини, миофибрилларниң түзүлүшини оқуп үгинисиләр;
- тоғра йоллуқ булжуңларниң ультра түзүлүшини тәтқиқ қилалайдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Тоғра йоллуқ булжуңниң түзүлүши қандақ? Саркомер дегән немә? Қисқираш белоклириниң роли қандақ?


Булжуң тоқулмисини түзүлүшигә қарап бирхил бағланған, тоғра йоллуқ (скелет булжуңлири) вә жүрәк булжуңлири дөп бөлиду.

Тоғра йоллуқ булжуң көплигән функцио-
наллик бирликләрдин, йәни булжуң талчиқ-
лиридин яки булжуң һүжәйрилиридин тури-
ду. Улар бир-биригә параллель орунлашқан
цилиндр шәкиллик болуп келиду. Бу көп
ядролуқ һүжәйриләрниң диаметри — 0,01—0,1 мм, узунлуғи бирнәччә
сантиметрға йетиду. Талчиқта ядро униң үстки қәвитидә орунлишиду.
*Булжуң талчиқлириниң түгүнлири коллагенлик талчиқлар билән
вә қошқучи тоқулма билән айлинип қоршалған, талчиқлар арисиди-
му коллаген болиду. Булжуң учидә коллаген билән қошқучи тоқума
булжуңни скелетниң һәрхил қисимлири билән бириктүрүш хизмитини
атқуридиған сиңирни тәшкил қилиду. Һәрбир талчиқ мембранилик
сарколемма билән айлинип қоршалған, өзиниң түзүлүши бойичә
адәттики плазмилиқ мембрана билән охшаш болуп келиду. Сарко-
лемма — эластинлик һәрикәткә қабил мембрана, улар ион ғоллириниң
һәрикәтлиниш стимулиға жавап ретидә ечилип-йепилиш вә уларни
нерисиға Т-системисиға бериш хизмитини атқуриду.*

Булжуң талчиқлири тәркивидики қисқираш аппарати — *миофи-
бриллилар*, улар булжуңниң тоғра йоллуқлиғини түзәйду. Һәрбир
миофибрилла оттура һесапта 2500 протофибриллилардин түзүлиду.

Тирәк чүшәнчиләр:

- миофибрилла
- дискилар
- саркомер
- сарколемма
- Т-система
- актин
- миозин




193-сүрәт. Саркоплазмиқ ретикулум вә Т-система

Том протофибриллилар миозин белоклиридин, инчикилири болса, актин белогидин түзүлиду. Булжуң тәркивидә миозин мөлчәри интайин жуқури: 1 кг булжуңда тәхминән 200 г белок бар, уларниң 100 grammi миозин. Кейинки белок — актин аз мөлчәрдә учришиду — 1 кг булжуңда 30 г болиду.

Миофибриллилар арисида коплигән митохондрияләр (саркосомилар) орунлашқан. Булжуң талчиқлириниң цитоплазмиси саркоплазма дәп атилиду вә ички мембрана тармиғи саркоплазмиқ ретикулумни тәшkil қилиду. Талчиқларниң тоғрисиға вә миофибриллилар арисин нәйчиләр системиси өтиду, улар Т-система дәп атилиду. Бәзибир йөрләрдә Т-системилар нәйчилири икки саркоплазмиқ ретикулум цистернилири арисида орунлишилиду. Бир Т-система вә икки цистернидин түзүлгән комплекс триада дәп атилиду. Нәйчиләр вә цистернилар өз ара тоғрисиға мембранилиқ көрүкләр арқилиқ бағлинишқан. Цистернилар кальций ионлириниң тутулушиға вә бошап чиқишиға қатнишиду, уларниң концентрацияси саркоплазмада булжуң талчиқлириниң қисқираш хизмитигә тәсир қилиду (193-сүрәт).

Миофибриллилар дурус алмишип келидиған қисимларға (дискиларға) бөлүниду. Бу қисимларниң бириниң жүп нур чеқилиштуруш қабилийти бар. Адәттики йоруқта микроскоп билән қариғанда, улар гуңгут тәхлит болуп көрүниду. Булар — *анизотроплук* қисимлар А һәрипи билән бөлгүлиниду. Башқа қисимлири ақуч болуп көрүниду, уларниң жүп йоруқ чеқилиштуруш қабилийти йоқ. Бу изотроплук дискилар І һәрипи билән бөлгүлиниду. А дискиниң оттурисидин Н ала-була (полоса), І-дискисиниң оттурисидин гуңгут йоллук (полоса) Z өтиду, у йочуқлар арқилиқ миофибриллилар өтидиған непиз мембранидин туриду.

Икки Z тизмиси арасидики миофибриллар қисми *саркомерлар* дөп атилиду. Микроскопиялик саркомер алмишип келидиған ақуч вә гуңгут йоллуқлар билән сизиклардин туриду, том актин вә миозин инчикә жипчилири рәт билән орунлашқан. Саркомерлар узунлуғи теч һаләттә 2,0—2,2 мкм-ни төшкил қилиду. Шунинң билән актин жипчисини түзгүчи икки хошна орунлашқан саркомерларниң арасидики қисим I-диск дөп атилиду. Икки I-диск арасида миозин вә актиндин тәркип тапқан А-диск орунлашқан. Н-диск пәқәт миозиндин түзүлиду. Атин жипчилири қисқираш вақтида мәркәзгә миозин жипчисигә қарап силжійдудә, Н-диск йоқ болуп кетиду. Оттурисидин М сизиги өтүп, миозин жипчисини иккигә бөлиду вә тутуп туриду. Һәрбир миофибрилл рети билән орунлашқан бирнәччә саркомерлардин түзүлиду, у булжуң талчиқлириниң қисқираш элементлири болиду (194-сүрәт).



194-сүрәт. Булжуң талчиқлириниң түзүлүши

Актин — инчике филаментлар. Һәрбир актинлик жипче глобулилик молекула актинидин (G-актин), бир-биригә оралған қош ормдин түзүлгән. Филаментларниң бир учи Z-пластиниға бөкитилгән. Актинлик молекулиларниң барлиқ комплекси F-актин дөп атилиду, униңға АТФ молекулиси бөкитилгән. Актинға қошумчә тропомиозин жипчиси оралған вә бирдәк интервалларға үч суббирликтин тәркип тапқан тропонин молекулиси бөкитилиду:

Тп-С — кальций ионлири билән бағлиниш ясайду.

Тп-Т — тропонинни тропомиозин билән бириктүриду.

Тп — миозин вә актин арасида көрүк тәхлит бағлинишниң түзүлүшини блоклайду.

Миозин — том филаментлири. Миозин молекулилири актин элементлириниң арасида орунлашқан, қош башлири бар, шарнирлик қисмиға бойни арқилиқ бөкитилиду. Молекула бойни униң қозғалтқучлиғини тәминләйду вә узун кәйни жипчисиға өтиду. Шарнирлик қисми арқисида миозин актин билән қайтиш бағлинишлар түзәләйду вә өз ара силжыйдиған икки жипчә түзиду. Булжун талчиқлирида башқиму белоклар болиду. Уларниң хизмити — булжун талчиғиниң ички компонентлириниң түзүлүшини қуруш, шунинң нәтижесидә талчиқ тәхлит һаләткә келиду вә ички компонентларниң қисимға тәзүмлүги тоғра вә тик йөнилиштә ашиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Скелет булжунлириниң хизмәтлик бирлиги дегинимиз немә?
2. Булжун талчиқлириниң қисқириси аппаратини немә тәшкил қилиду?
3. Булжун талчиқлириниң мембраниси қандақ атилиду?
4. Миофибриллар қандақ белоклардин түзүлиду?
5. Миофибрилида қандақ қисимлар болиду?



А, Н, I-дискилири қандақ белоктин түзүлиду?



1. Төвәндики чүшәнчиләргә ениқлима бериңлар:
Саркомер —
Саркоплазма —
Саркоплазмилик ретикулум —



2. Дәптәргә көчирип сизип, көрсәтмиләргә саркомер қисимлирини йезиңлар..



Булжун талчиқлири қисқарғанда қисқираш механизми қандақ әмәлгә ашиду?



Параграф мавзуси бойичә дискуссия тәйярлаңлар.



Саркомер түзүлүшиниң схемиси

§ 112. БУЛЖУҢ ТАЛЧИҚЛИРИНИҢ ҚИСҚИРАШ МЕХАНИЗМИ. БУЛЖУҢ ТАЛЧИҚЛИРИНИҢ Т-СИСТЕМИСИ

Бу дәрістә:

- Булжуң талчиқлириниң қисқираш механизмини, булжуң талчиқлириниң Т-системисини оқуп үгинисиләр;
- Булжуңниң қисқираш механизмини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Булжуң талчиқлири қандақ вақитта қисқирайду? Булжуң талчиқлириға қандақ қисқираш түрлири хас?

Тирәк чүшәнчиләр:

- рефрактерлиқ
- изотоникилик вә изометриялик қисқираш
- кимограф
- миограмма
- тетанус
- сирилған жипчә нәзәрийәси
- электромеханикилик Т-система қошулуш һадисиси


Скелет булжуңи талчиқлириниң һәрикәт-линиши вақтида әгәр стимуллиғучи импульс мөлүм бир чәклик мөлчәригә йәткәндә яки ешип кәткән шараиттила у қисқирашқа башлайду (195-сүрәт). Бу қисқирашлар мундақ шараитлар үчүн максимал болиду. Һәрикәт күчиниң хелила ешишиму талчиқниң көп мөлчәрдә қисқиришиға яки униң күчиниң тәрәққий етип туруп ешишиға елип кәлмәйду. Мундақ һадисини “һәммиси яки һечнемә” реакция түригә ятқузиду. Булжуң талчиқлирниң қисқиришини пәйда қилишқа қабилийәтсиз һалсиз қозғатқучи *босуға асти* дәп атилиду.

Жавап аяқлашқандин кейин абсолютлүк рефрактерлиқ басқуч башлиниду, бу басқучта талчиқлар сиқилмайду. Шуниндин кейин селиштурма рефрактерлиқ басқуч башлиниду. Бу вақитта пәқәт пухта стимулла қисқираш пәйда қилиши мүмкин. *Рефрактерлиқ басқуч — булжуң талчиқлириниң дәсләпки қелипиға кәлтүрүшкә кетидиған вақит.*

Стимулға жавап ретидә булжуң механикилик хизмәтләр атқуриду, йәни сиқилиду, бу өз новитидә булжуңниң қисқиришиға елип келиду яки булжуң қисими ашқини билән узунлуғи өзгиришсиз (әгәр булжуңниң иккила учи һәрикәтсиз бәкитилсә) қалиду.

Булжуң талчиқлириниң қисқиришиниң үч типи ажритилиду: изотоникилик — булжуңниң қисим шәкилләнмәй қисқириши (сиңир үзүлүши вақтида); изометриялик — булжуңниң көтирәлмәйдиған жүкни көтириш вақтидики узунлуғиниң өзгиришсиз қелип қисқириши; ауксотоникилик — қисим ашқансири булжуң узунлуғиниң өзгириши арқилиқ қисқириши (жүкни көтириш вә қойиветиш) (196-сүрәт).

Булжуң қисқиришини кимограф ярдими билән тәтқиқат қилишқа болиду. Керәклик булжуңларниң барлиқ қисқиришини йезиш *миограмма* дәп атилиду. Булжуң қисқиришини *бир рәтлик* (көз алмисиниң,




195-сүрәт. Булжун қисқиришида жипларның тейилиш механизми

қапигиниң сиртқи булжундири) вә икки рәтлик дөп бөлиду. Ритмлик қисқираш вақтида булжун тетанус һалитидә болиду (булжунниң максимал тәсирлиниши басқучи).

1954-жили бир топ алимлар — Х.Хаксли, А.Хаксли, Дж.Хэнсон, Р.Нидергерке булжун қисқиришини жипчиларниң тейилиши билән чүшөндүридиған нәзәрийәни шәкиллөндүрди. Улар А-дискисиниң узунлуғи бошиған вә қисқарған саркомерда өзгиришсиз турақлиқ түрдә қалидиғанлиғини байқиди. Шу сәвәптин улар мундақ молжа ясиди:

жипчилириниң икки жиғиндиси бар актин вә миозин, улар бириниң арасына бири кирип орунлишиду вә саркомер узунлуғиниң өзгириши вақтида бу жипчилар бир-бириниң үсти билән тейилиду. Қисқираш вақтида актин жипчилири саркомер мәркизигә қарап силжийду. Миозин жипчилириниң беши “илмәк” хизмитини атқуриду вә F-актинға бәкитилип, тоғра көрүкләр түзиду дегән гипотеза шәкилләнди. Шуниндин кейин уларниң конфигурацияси мундақ өзгириду: актин молекулилири А-дискисиниң ички тәрипигә силжийду. Бу жәриянниң ахирида жипчиниң миозинлиқ учлири актиндин бөлүниду вә актинниң арилиқтики башқа қисимлириға “илиниду”. Саркомер өз узунлуғидин 30% -ға қисқирашқа қабилиятлик. Тоғра көрүкләрниң қошулуши билән ажраш цикли бирнәччә” қетим қисқираш илдамлиғиға бағлиқ түрлүк илдамлиқта қайтилиниши мүмкин. Толуқ цикл орунлиниши үчүн АТФ ниң бир молекулиси керәк (196-сүрәт).




196-сүрәт. Электромеханикилық тартилиш (тропомиозин вә тропонин)

Булжұң қисқираш механизми тоғрилиқ һазирқи көзқарашни жипчиларниң тейилиш нәзәрийәсини вә бу жәриянда Т-системиниң ролини чүшәндүрүш толуктуруду.

Теч һаләттә саркомер тәркивидә магний иони вә АТФ болиду, бирақ бош кальций ионлири интайин аз. Бу шараитта актин жипчилири тропомиозин үчүн “ишлимәйдиған шараитта” болиду, у миозинниң башлири илиниши керәк қисимларни блоклайду. Шуңлашқа башлири миозин жипчилириниң бойлуқ оқиға қарап тартилған вә актиндин елинип ташланған.

Булжұң талчиқлирини саркомерлар бойи билән әсәб импульси арқилиқ тәсир йәткүзүш вақтида деполяризация долқуни тарайду, у Т-системиси арқилиқ саркомерлар ичигә кириду, у йәрдә триада цистернилирида кальций ионлириниң бошап чиқишиға тәсир қилиду. Кальций ионлири С тропонини билән бағлинишиду, у I тропонини билән актин вә миозин арасидики көрүк түзүлүшиниң тосалғусини (блокировкисини) йешиду. Тропомиозин алмишиду, миозинниң беши актин билән бағлинишип, актомиозин көрүгини түзиду. АТФ гидролизиниң энергияси һесавиға тоғра көрүкләрниң бөлүнүш булуңи өзгириду, у актин жипчилириниң саркомер мәркизиниң йөнилиши бойичә созулушиға елип келиду. Саркомерда күч пәйда болиду, у қисқартылған саркомерлар түзүшкә интилиду. Булжұң қисқаришини чүшәндүридиған бу һадисә электромеханикилық қийилишиш дәп атилиду.



197-сүрәт. Саркомерниң қисқираш схемиси.
Актин жипчисиниң миозин жипчиси бойи билән тейилиши

Саркомерда һәрикәт тохтиғандин кейин кальцийлик шориғучқа бағлинишлиқ АТФ ярдимидә кальций ионлири әкси триада цистер- нилириға чиқирилиду. Саркомер бошайду. Тропомиозин тосалғуси (блокировкиси) қошулиду — тропонин, көрүкләр үзүлиду, актин билән миозин “өчүрүлгән һаләткә” алмишиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Булжуң талчиқлириниң асасий хусусийити немә?
2. Булжуң талчиқлириниң қисқариши қандақ периодларға бөлүниду?
3. Булжуң талчиқлириниң қисқараш түрлирини атаңлар, мисал кәлтүрүңлар.
4. Тейилған жипчә нәзәрийә мәнаси немидә?



1. Электромеханикилик қошулуш механизмини чүшәндүрүңлар.
2. Т-системиниң булжуң қисқаришидики роли қандақ?



Саркомер қисқаришида А, Н, I-дискилириниң узунлуғи қандақ өзгириду? Уларниң өзгиришини чүшәндүрүңлар.



Параграф мавзусиға ихчам лайиһә тәйярлаңлар.

§ 113. ИЛДАМ ВӘ АСТА ҚИСҚИРАЙДИҒАН БУЛЖУҢ ТАЛЧИҚЛИРИНИҢ ТҮЗҮЛҮШИ, ОРУНЛИШИШИ ВӘ УМУМИЙ ХУСУСИЙИТИ

Бу дәристә:

- Илдам вә аста қисқирайдиған булжуң талчиқлириниң түзүлүши, орунлишиш вә уму- мий хусусийәтлирини оқуп үгинисиләр;
- Илдам вә аста қисқирайдиған булжуң талчиқлириниң түзүлүши, орунлишиш вә уму- мий хусусийәтлири арисидә бағлиниш орниталайдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Булжуң тонуси немә билән бағлинишлиқ? Булжуң тонусиниң тәбиити қандақ? Адәм булжуңлири қандақ булжуң талчиқлиридин туриду?

Скелет булжуңлириниң тонуси униңға келип чүшидиған әсәб импульслириға бағлиқ. Бу импульслар жулун мотонейронлирида пәйда болиду, активлиғини тутуп туруши вә рәтлиниши булжуңниң өзидә жуқурида орунлашқан периферийлардин проприорецепторларға чиқидиған импульс- ларға бағлиқ. Мошундақ скелет булжуң- лириниң тонуси реклиторлуқ болуп келиду.

Скелет булжуңлириниң талчиқлири қисқараш илдамлиғиға бағлиқ аста (тонуслуқ)

Тирәк чүшәнчиләр:


- тонуслуқ вә физикилик талчиқлар
- миоглобин
- ақ вә қизил талчиқлар

вə илдам (физикилик) талчиқлар дəп иккигə бөлүниду. Уларниң һәрқайсисиниң өзиниң физиологиялик алаһидиликлири болиду.

Аста талчиқлар — I тип (МНС-I) яки тонуслуқ талчиқлар тərкивидə миоглобин вə цитохром пигментлириниң көп болушиға бағлиқ рəңги қизил. Тərкивидə көп мөлчəрдə митохондриялəр бар, бирақ саркоплазмилик ретикулум һалсиз йетилгән вə гликоген аз.


Тонуслуқ талчиқлар булжуңларниң чоңқур қатламлирида орунлишиду вə мадда алмишишни илдамлитиш үчүн капиллярлар билən зич бағлиништа болиду. Диаметри 5 мкм инчикə əсəб талчиқлири билən тəсирчанлиғи ашиду. Бир булжуң талчиғида бирнəччə япқучи пластина учлири орунлишиду, улар қозғиғучи аксонниң булжуң талчиқлириниң əсəб-булжуңлуқ бағлиниши болуп һесаплиниду. Импульсниң қозғилиш илдамлиғи — 2—8 м/с. Мембранида электрлик қозғиғуч йоқ. Һəрбир импульс аз мөлчəрдики ацетилхолинниң бөлүнүп чиқишиға тəсир йəткүзиду. Шуниң үчүн мембраниниң деполяризация дəрижиси тəсирниң илдамлиғиға бағлинишлиқ болиду. Аз мөлчəрдə күчни ашуруп туруп, импульсқа жавап ретидə тонуслуқ талчиқлар аста қисқирайду вə аста бошайду. Бу жүклимигə маслишишқа вə бирхил тутуп турушқа керək болидиған булжуңниң узақ вақит қисқиришини тəминлəйду. АТФ мənбəси аэроблуқ нəпəс елиш болуп һесаплиниду. Кислородниң тапчиллиғи вақтида көплигән талчиқлар анаэроблуқ гликолиз һесавиға хизмитини давамлаштурувериду. Бу шараитта сүт кислотаси түзүлүп, кислородлуқ фонд жиғилиду (198-сүрəт).

Илдам талчиқлар — II тип (МНСII) яки физикилик талчиқлар тəнниң үстки япмисиға йeqин орунлишиду. Уларни бəзи чағларда “ақ” булжуң дəпму атайду, сəвəви уларда миоглобин интайин аз яки мутлақ болмиши мүмкин. Бу талчиқларда митохондриялəр аз, шундиму кальцийниң тез бөлүнүп чиқишиға тəсир йəткүзидиған саркоплазмилик ретикулум яхши йетилгән. Илдам талчиқлар гликогенлик түгүрчəклəрниң көплиғи билən, аста талчиқлардин үч һəсəсə илдам қисқириши вə тез һерип қелиши билən тəриплиниду. Диаметри 10—20 мкм қелин



198-сүрəт. Аста талчиқлар схемиси

әсәб талчиқлири билән тәсирлиниду вә адәттә бир булжуң талчиғида бир туюқлиғучи пластина болиду. Импульс өткүзүш илдамлиғи 8—40 м/с. Мембрана электрлик һәрикәтләш хусусийитигә егә, шуңлашқа физикилик талчиқлар тез қисқирайду вә қисқа вақитлик ишләшкә қабилиһәтлик болиду (199-сүрәт).



199-сүрәт. Илдам талчиқлар схемиси

Адәмниң барлиқ булжуңлири бир вақитта талчиқларниң икки типидинму түзүлиду, шундимү уларниң бири доминантлик. Бунин пайдилиқ физиологиялик хусусийити бар. Тонуслуқ талчиқлар аста вә узақ қисқирашқа қабилиһәтлик вә улар сақийиш булжуңлирида көп болуп келиду, пүкүлүш булжуңлирида болса, илдам реакцияләргә беғишлиниду вә уларда физикилик талчиқлар сани бесим. Илдам сиқилидиған булжуңларға көзни вә путни һәрикәтләндүргүчи булжуңлар ятиду.

Тонуслуқ булжуңлар талчиқлири жуқури дәрижилик аэроблуқ төзүмлүккә егә. Бу хусусийәт булжуң активлиғини узақ вақит бойи тутуп турушқа мүмкинчилик бериду вә “булжуң төзүмлиғи” дегән нам билән мәлум. Шу сәвәптин тонуслуқ талчиқлар көп шараитларда чәктин көп күч чүшкәндә төзүмлүк бериш үчүн қатнишиду, мәсилән, марафон мусабиқиси, аз күч чүшидиған меңиш вақтидимү қатнишиду.

Илдам талчиқлар төвәнки аэроблуқ төзүмлүккә егә. Бирхил иш-һәрикәт вақтида илдам талчиқлар аз қоллинилиду, бирақ еғир күч чүшүш вақтида улар көп күчни генерацияләйду. Улар өзлириниң органикилик төзүмлүгигә бағлиқ тез һерип қалиду, шуңлашқа талчиқлар төзүмлүккә узақ күч чүшмәйдиған вақитта пайдилинилиду, мәсилән, 1 миль арилиққи жүгрәш яки 400 м арилиққа үзүш вақтида.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Скелет булжуңлири талчиқлири нәччә түргә бөлүниду?
2. Аста талчиқлар дегән немә?
3. Илдам талчиқлар дегинимиз немә?



Жәдвәлни икки булжуң талчиқлирини селиштуруп толтуруңлар.

№	Селиштуруш параметрлири	Тонуслуқ талчиқлар	Физикилик талчиқлар
1	2	3	4
1	Қисқирашниң төвәнки илдамлиғи		
2	Миоглобинниң йоқлуғи билән пәриқлиниду		

Давами

1	2	3	4
3	Тез һерип қелиш		
4	Қисқа вақитлиқ күч чүшүш вақтида активли- ниду		
5	Тәркивидә миоглобинниң жуқури болуши		
6	Активацияниң жуқури дәрижиси		
7	Һерип қелишқа дегән төзүмлүк		
8	Қан билән тәминләшниң жуқури дәрижиси		
9	Төвәнки аэроблук төзүмлүк		
10	Узақ вақитлиқ күч чүшүшкә қабил		

§ 114. АКТИНҒА БАҒЛИҚ СКЕЛЕТ БУЛЖУҢЛИРИНИҢ ТҮРЛИРИ

Бу дәристә:

- Актин билән миозинға бағлиқ скелет булжуңи тоқумилириниң түрлирини окуп үгинисиләр;
- Илдам вә аста қисқирайдиған булжуң талчиқлириниң умумий хусусийәтлирини, орунлишиши билән түзүлишиниң бағлинишини орниталайдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Булжуң талчиқлириниң түзүлүши қандақ? Саркомерниң асасий компоненти немә болуп һесаплиниду? скелет булжуңи қандақ хизмәт атқуриду? Бу вақитта актин билән миозин белоклириниң роли қандақ?


Тирәк чүшәнчиләр:

- актин
- миозин
- саркомер
- миофибриллар
- филаментлар

Актин билән миозин булжуң талчиқлириниң саркомерлириниң асасий компонентлири тоғра йоллуқ булжуңларниң асасий қисқираш бирлиги болуп һесаплиниду. Булжуңлар қисқирашқа қабилийәтлик, тәнниң қозғилиши билән өзәларниң қозғилишини тәминләйдиған тоқулма.

Қисқираш талчиқлириниң сиртқи көрүнүшигә мас булжуңларниму икки асасий топқа бөлүшкә болиду: тоғра йоллуқ вә бирхил бағланған.

Тоғра йоллуқ булжуңларниң мундақ атилишиниң сәвәви, мөлчәрини ашурғанда өзигә хас йоллирини көрүшкә болиду. Бу топқа скелет билән жүрәк булжуңлири ятиду. Скелет булжуңлири скелетниң қозғилишини, жүрәк булжуңлири болса, жүрәкниң қисқирисини тәминләйду.




200-сүрөт. Миозинниң түзүлүши

Силик булжунларниң йоллири болмайду, шәкиллири урчуқ тәхлит болиду. Бу булжунлар өзаларниң чәтлирини тәшкил қилиду, мәсилән досун, қан томурлири, үчәй-қерин йоли. Булжунларниң қисқирашни тәминләйдиған белок мотори II миозин топиға ятиду. Бу миозин — омуртқиларда кәң тариған белок, у йеник бөлүнүп елиниду, шү сәвәптин яхши тәтқиқат қилинан белокларниң бири болуп һесаплиниду. II миозин — гексамерлик ком—лекс, у икки еғир тизмидин вә икки жүп йеник тизмидин туриду (200-сүрәт).

Бу соаллар яхши тәтқиқат қилинған. Тоғра йоллуқ булжунлар булжун талчиқлириниң топидин түзүлиду. Булжун талчиқлири йоған ядролуқ һүжәйриләрдин тәркип тапиду, уларниң узунлуғи бирнәччә миллиметрдин бирнәччә сантиметрғичә болиду, диаметри болса, 20—100 мкм-ни тәшкил қилиду. Төвәндики сүрәттә көрситилгинидәк, һәрбир булжун талчиғи 1000-дин көп миофибриллилардин тәркип тапиду, улар қисқирашқа қабилийәтлик таяқчә тәхлиттә болиду.

Миофибриллилар саркомерлар дәп атилидиған қайтилинидиған бирликләрдин әркип тапиду. Саркомерлар биридин кейин бири орунлишип, өзигә хас булжун йоллирини шәилләндүриду. Саркомерлар тоғра йоллуқ булжунларниң асасий қисқираш бирлиги болуп һесаплиниду, булжунлар қисқарған вә бошиған вақитта уларниң узунлуғи өзгириду.


Төвәндики сүрәттә көрситилгинидәк, саркомерлар йоған филаментлардин, асасән, биполярлик II миозин филаментлиридин вә инчикә филаментлардин, у актин жиблири билән рәтлигүчи белоклардин тәркип тапиду. Актин филаментиниң пәй басқан учи бир тәрәптин




201-сүрәт. Актин түзүлүшү

актин филаментлиринин деполаризациялинишигә йол бәрмәйду. Актин филаментлиринин учланған учлири саркомерларниң мәркизигә йөнилиш елип, тропомодулинларда көчирилгән (201—202-сүрәтләр).

Шуниң билән биллә актин филаментлири небулин белоклири билән өз ара һәрикәткә чүшиду, у талчиқларниң биқин тәрәплирини вә инчикә филаментларниң узунлуғини рәтләйду. Том филаментлар мәркәздә М-сизигида Z-дискисиниң арилиғида орунлишиду. М-сизиклар түзүлүши тәрипидин әвришим бағлинишқан қош қутуплуқ том филаментлардин тәркип тапиду, бу бағлинишлар ичидә гексагональлиқ орунлашқан том филаментларни бөкитиду. М-сизиклири билән қатар титин дәп атилидиған филамент белоклири Z-дисклири билән миозинлиқ талчиқлар билән әвришим бағлиниш түзиду. Титин саркомердики том филаментларниң мәркизини тәминләйду, у пружина тәхлит һәрикәтлинип, саркомерниң керилишигә йол бәрмәйду. Инчикә вә том филаментлар торлинип, үч өлчәмлик торлуқ қурулум түзиду. Саркомер қош қутуплуқ болғанлиқтин, икки йеримидиму бирдәк миозинлиқ мотор болиду, у актин қатнишишигә қаритилған. Қисқираш вақтида том филаментлар миозинниң моторлуқ домени инчикә филаментларниң актини билән һәрикәткә чүшиду. Қисқираш вақтида саркомерлар инчикә вә том филаментларниң бир-биригә селиштурма тейилиш һесавиға қисқирайду, бу хошна Z-дискиси билән мәркизий саркомерларни йеқинлаштуруиду (203—204-сүрәтләр).




202-сүрәт. Булжуң талчиғиниң қисқириши билән бошишиға актин билән миозинниң қатнишиши




203-сүрөт. Булжун талчиклиринин түзүлүшү. Саркомерлар

Миозин бешинин актин филаментлиринин чиш тәхлит учига карап силжиш мүмкинчилигиге бағлиқ том вә инчике филаментлар узунлуғи турақлиқ болуп қалиду. Омуртқиларниң саркомерлиринин ени булжунлар бошиған вақитта тәхминән 3 мкм, қисқарған вақитта тәхминән 2,4 мкм болиду. Булжун талчиклиридики миңлиған саркомерлардин туридиған топларниң қисқириши барлиқ булжунларниң қисқиришиға елип келиду (205-сүрөт). Қисқириған булжун талчиклиринин умумий узунлуғи икки амил билән ениқлиниду: қисқарған һәрбир саркомерниң узунлуғи вә топтики саркомерниң сани. Қисқарған булжун талчиклиринин паизлиқ мөлчәри уларниң узунлуғиға бағлиқ болмайду. Генерацияләнгән саркомерларниң күчиниң ешиши йерим саркомерниң тәркивидики өз ара һәрикәттики актомиозин саниға пропорционал, булжун талчиклирини тәрәққий өттүридиған күчниң ешиши болса параллель орунлашқан саркомерларниң саниға пропорционал болиду.



204-сүрөт. Булжун талчиклиринин түзүлүшү



205-сүрөт. Саркомерларның вә булжуң талчиқлириниң қисқириши

Скелет булжуңи булжуң талчиқлиридин тәркип тапиду, улар узарған һүжәйрә түридики миофибриллилар. Миофибриллилар қисқирашқа қабилиятлик вә саркомер дәп атилидиған қайтиланғучи тәркивий бирликләрдин тәркип тапиду.

Тоғра йоллуқ булжуңларниң қисқираш цитозол тәркивидики Ca^{2+} дәрижиси билән рәтлиниду, у миозин билән актинға бағлиқ тропонин/тропомиозин комплексиниң һалитини ениқлайду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Саркомер — бу
2. Булжуң талчиқлири саркомерлириниң асасий компонентлирини атаңлар.
3. Миофибриллилар дегинимиз немә?
4. Булжуң талчиқлириниң тоғра йоллуқлири немишкә тәвәлик болиду?



Филаментлар тәркивини тәрипләңлар.



Қошумчә әхбарат қураллирини пайдилинип, тапшурмини орунлаңлар. Еғир салмақтики спортчиларниң булжуңлириниң мөлчәрини қандақ ашурушқа болиду?



Булжуң талчиғиниң қисқираш бирлиги немә болуп һесаплиниду?



Параграф мавзусиға ихчам лайиһә уюштуруңлар.

Билгәнгә — маржән!

Булжуңларниң күндиликтә қисқиришиға тәнниң барлиқ энергиясиниң 50%-и ишлитилиду. Әгәр силәр спорт билән шуғулансаңлар, молекулиларниң парчилинишиниң елинидиған энергияниң 40%-и аддий һәрикәтләрни орунлаштики булжуңларниң қисқирашқа кетиду. Мошу сәвәптин спортчилар өзлириниң тамақ менюсини тәйярлиғанда, порцияләрни ашуруп, энергиягә бай таамларға көңүл бөлиду.



БАП БОЙИЧЭ БИЛИМНИ СИСТЕМИЛАШ ВЭ ЙӘКҮНЛӘШ СОАЛЛИРИ БИЛӘН ТАПШУРМИЛИРИ

1. Тоғра йоллуқ булжуңлар қандақ фуекционаллик бирликтин туриду?
2. Триада дегән немә?
3. Булжуң талчиқлириниң қисқираш элементи немә болуп һесаплиниду?
4. Актин дегән немә?
5. Миозин дегән немә?
6. Т-системисиға тәриплимә бериңлар.
7. Саркомер қисқирашниң схемисини ясаңлар.
8. Булжуң тонуси немә билән башлиниду?
9. Аста булжуң талчиқлири қандақ болиду?
10. Уларниң қисқириши қандақ әмәлгә ашиду?
11. Илдам булжуң талчиқлири қәйәргә орунлишиду?
12. Уларниң хизмәтлири қандақ әмәләг ашиду?
13. II миозин дегән немә?
14. Булжуңниң қисқириши вақтида уни тәсвирий түрдә қандақ атайду?
15. Миофибриллилар немидин тәркип тапиду?
16. Скелет булжуңлириниң синапслирида немә медиатор болуп һесаплиниду?
17. Иккила учи һәрикәтсиз бәкитилгән булжуңларниң қисқириши қандақ атилиду?
18. Импульслар арисидики арилиқ (интервал) бир қисқирашниң узақлиғидинму көп болған шараитта тәхминдин сирт импульсларниң тәсирлинишидин пәйда болидиған булжуңниң қисқириши қандақ атилиду?

12

БИОМЕДИЦИНА ВӘ
БИОИНФОРМАТИКА

§ 115. РОБОТОТЕХНИКИДА БИОМЕХАНИКИНИ ҚОЛЛИНИШ

Бу дәрістә:

- Биомеханикини робототехникада қоллиниш, инженерлік биомеханикини окуп үгинисиләр;
- Биомеханикиниң робототехникада қоллинилишини тәтқиқат қилалайдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Биомеханика немини тәтқиқат қилиду? Биомеханика силәрниң көзқаришиңлар бойичә қәйәрдә пайдилинилиши мүмкин? Силәрниң пикриңларчә биомеханикиниң келәчиги қандақ болиду?

Тирәк
чүшәнчиләр:

- биомеханика
- робототехника
- һава булжуңлири
- нитиноллик симлар

Биомеханика — бу жанлиқ организмларниң һәрикәтлиниш мүмкинчиликлринини вә қозғилиш һәрикәтлринини тәтқиқат қилидиған илимниң саһаси. Көпинчә адәм вә жуқури басқучтики һайванатларниң қозғилишини тәтқиқат қилиш әмәлий қизиқиш пәйда қилиду.

Дәсләпки қетим һайванатларниң һәрикити тоғрилиқ язмилар Аристотель әмгәклиридә болған (миладигичә 384—322-жж.). Биомеханикиниң шәкиллинишигә үлүш қошқан қедимий дәвирдики мутәппәккүрләр: Гален (131—202-жж.), Леонардо да Винчи (1452—1519-жж.), Микеланджело (1475—1564-жж.), Джованни Альфонсо Борелли (1608—1679-жж.) — биринчи биомеханика тоғрилиқ “Һайванатлар қозғилиши” китавиниң муәллиплири, И.М.Сеченов (1829—1905-жж.), П.Ф.Лестгафт (1837—1909-жж.), А.А.Ухтомский (1875—1942-жж.) вә вәтәнлик биомеханика мәктивиниң асасини қурғучи Н.А.Бернштейн (1896—1966-жж.) биомеханика илиминиң тәрәққияти үчүн көп әмгәк әтти.

Ахирқи жилири биомеханика саһалири тәрәққий әтмәктә:

— инженерлік биомеханика (робототехника билән бағлинишлиқ);
— медицинилиқ биомеханика (травматизм билән протезлаш профилактикиси).

— эргономикилик биомеханика (адәмниң жанлиқ тәбиәт билән бағлиниши).


Роботларни һәрикәтләндүрүш вә ишқа қошуш системилри. Биз келәси конструкцияләргә тохтилимиз: һава булжуңлири, нитиноллик симлар.

Һава булжуңлири. Һава булжуңлири аддий қурулма болуп һесаплиниду, уни 1950-жили Дж. Л. Мак Киббен төклип қилған.

Һава булжуңи биологиялик прототипи охшаш активлиғини ашурғанда сиқилиду. Һава булжуңлири — биологиялик прототипиниң нәқ көчәрмиси болуп һесаплинидиғанлиғи қизик мәлумат, “жанлиқ” булжуң һалитигә мас мундақ булжуңни скелетқа бәкитиш арқилиқ биологиялик булжуңға хас биомеханикини вә төвәнки дәрижидики системилинишни модельлашқа болиду. Мак Киббен һава булжуңи, ясалма пневматикилик булжуң вә “резинка булжуң” охшаш конструкцияләрни әдәбиятларда елан қилған.

Қоллиниш. Һава булжуңлирини робототехникада, биомеханикада, ясалма пут-қол протезлирини ясашта вә ишлөпчиқирешта қоллиниду. Эксперимент ясиғучилар билән һәвәскарларниң пат-пат пайдилинишиниң сәвәви һава булжуңлириниң конструкцияси аддий вә адәттики пневматикилик цилиндр билән селиштүрғанда қоллинилиши оңай.

Һава булжуңлириниң салмиғи аз, “әвришим” конструкция вә өз салмиғиға қариганда күчини бир таллап тәрәққий өттүрүш жуқури қатнашта болиду (400:1). Шуниң билән биллә улар узун бойини бурашқа чидамлиқ, параллель учлирини бәкитишни тәләп әтмәйду вә ишиға тосалғу кәлтүрмәйла сиртқи чәклигүчиләргә учриғанда егилип алиду.



Һава булжуңиниң ишләш қайдиси. Һава булжуңи икки асасий қисимдин туриду: ички созулма юмшақ резинка нәйчиләр вә капрондин тәйярланған сиртқи торлуқ угилик йеңи (тутқучи болиду) (206-сүрәт). Резинка нәйчиләр “ички көвүкчә” дәп атилиду вә тутқучи бар йән ичидә орунлашқан.

Һава булжуңлириниң түзүлүши вә иши. Һава давамлик нәйчиләр компонентлириға бир тәрипидә резинка нәйчиси, учида болса, һава булжуңлири орунлишидиған икки илмәк кириду. Улар булжуңларни конструкцияниң башқа қисимлириға бөкитиду. Асасий көвүкчигә қисим ясиғанда униң мөлчәри ашидудә, ички тәрәптин йән тутқучини қисиду, шу вақитта униң диаметри ашиду. Тутқучниң физикилик тәриплимиси униң узун бойлуқ қисқираш диаметриниң ешишиға пропорционал, бу һава булжуңлириниң қисқираш күчиниң пәйда болуши билән чүшәндүрилиду. Ейтип кетидиған нәрсә, булжуңларниң дурус ишлиши үчүн “теч” һалитидә у созулған яки салмақ селинған болуши керәк. Болмиса қисқираш эффекти көрүнмәйду. Адәттә, мундақ һава булжуң конструкциялири өзиниң дәсләпки узунлуғидин 25%-ғичә қисқирайду.

Нитиноллик симлар. Нитинол формини “әстә сақлаш” қабилыйити бар материаллар классига ятидиған қошулма болуп һесаплиниду. Нитинолни, адәттә, сим түридә қоллиниду. Қиздурған вақитта у дәсләпки узунлуғини 10%-ғичә қисқарталайду. Бу қисқираш сизиклик қозғилиш пәйда қилиду. Қисқираш хусусийитидин башқа қошулмида “әстә сақлаш” қабилыйити болиду. “Әстә сақлаш” эффекти — қошулма үчүн алаһидә хусусийәт. Қошулмини алмишидиған һаләткә йәткүзидиған температуриғичә қиздурғанда у автоматлик түрдә дәсләп берилгән шәклигә қайтидин келиду. Материал әстә сақлайдиған дәсләпки берилгән шәклини қайтилаш жәрияни термаллик бошаш процедури-си дәп атилиду. Қошулмини керәклик шәкилгә селип, алмишидиған һаләткә йәткүзидиған температуридин жуқури температурада бо-шаш жәрияни маңиду. Бу жәриян қошулминиң кристаллик торини



207-сүрәт. Кепинәк нитинол симлири билән

өзгәртиду. Мошуниндин кейин температу-рини ашурғансири әстә сақлиған дәсләпки берилгән шәклигә келиду. Мундақ мате-риалдин тәйярланған буюмни егишкә яки бурашқа болиду, бирақ уни қиздурғанда мәжбүрий түрдә дәсләпки қелипиға кели-ду. Бу алаһидә хусусийәтни қошулминиң кристаллик торлуқ тәркиви тәминләйду. Униң қайтуруш күчи 1500 г кв/см-ға йети-ши мүмкин. Мундақ тоғра кесиндиси йоған материални һечкимму қолланмиши мүмкин. Сәвәви униңдинму инчикә симларниң күчи интайин көп болуши мүмкин. Мәсилән, диа-метри 6 мм симниң қайтуруш күчи — 350 г.

Нитинол симиниң болса 10% -лик дәрижидә қисқириши турақлиқ болуп қалиду. Қисқиришиға қарап униң диаметри пропорционал бойичә өсүп, турақлиқ мөлчәрни тәминләйду. Нитиноллик симни қиздурушниң аддий усули — униңдин турақлиқ электр токини өткүзүш. Бирақ узак вақит турақлиқ ток өвәткәндә тәкши әмәс омлуқ қиздуруш симниң бузулушиға елип келиду. Қиздуруш вақтида симни зәхмилиништин сақлаш үчүн вә қиздуруш вақтида қоллап-қувәтләш үчүн әнлик-импульслиқ турақлиқ ток мәнбәси қоллинилиду (207-сүрәт).



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Биомеханика — бу
2. Биомеханикини қоллиниш тәҗрибисини дәсләп тәклип қилған улук адәмләр кимләр?
3. һава булжуңиниң ишләш қайдиси қандақ түзүлгән?
4. һава булжуңлирини әмәлиятта қәйәрдә вә қандақ қоллинишқа болиду?



Нитиноллик кепинәкниң ишләш принципини тәрипләңлар. Бу кепинәкни қандақ пайдилинишқа болидиғанлиғини ойлиниңлар.



Мавзуға мас хәвәрлимә тәйярлаңлар.

§ 116. МЕДИЦИНИЛИҚ БИОМЕХАНИКА (ПРОТЕЗЛАШ). ЭРГОМЕТРИЯЛИҚ БИОМЕХАНИКА (ОПТИМИЗАЦИЯ)

Бу дәристә:

- Медицинилиқ биомеханикини (протезлаш), эргометриялик биомеханикини (оптимизацияләш) оқуп үгинисиләр;
- Биомеханикиниң робототехникада қоллинилишини тәтқиқат қилалайдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Медицинада биомеханикиниң вәзипилири қандақ? Медицинада биомеханикиниң қандақ мүмкинчиликлири бар? Медицинилиқ эргономика дегән немә? Медицинилиқ хизмәткарларға эргономикини оқутуш һажәтму?

Медицинилиқ биомеханика. Медицинилиқ (клиникилик) биомеханика биомеханикиниң медицинидики саһаси болуп һесаплиниду. Турақлиқ вә патологиялик шараитта адәм һәрикәт механикисини башқуруш вә нәтиҗисини баһалаш позициясидики тәкшүрәлгән қозғилишни өзгәртмәй ясаш усули — бу биомеханикиниң медицинидики асасий вәзипилири. Клиникилик биомеханика, биринчидин, диагностика жәриянини орунлиши керәк, иккинчидин, давалаш усулини таллиши керәк, үчинчидин, елинған нәтиҗини баһалиши керәк (208-сүрәт).

Тирәк чүшәнчиләр:

- *медицинилиқ биомеханика*
- *медицинилиқ эргономика*



208-сүрәт. Биомеханика

Медицинилик биомеханикинң асасий саһалири: омуртқа йотиси биомеханикиси, қозғилиш биомеханикиси, қан айлиниш биомеханикиси, өгиләр биомеханикиси, нәпәс елиш системисиниң биомеханикиси.

Омуртқа йотиси биомеханикиси алаһидә қизиқиш пәйда қилиду. Сәвә-ви омуртқа йотиси адәм организмида асасий роль атқуриду. У жулунни қоғдап туриду, тәңпуңлуқни сақлайду, меңиш вақтида амортизация хизмити-

ни атқуруп, скелетқа пухтилиқ хусусийитини бериду. Омуртқа йотиси патологиясини диагностикилашниң биомеханикилик усуллири болиду, улар: клиникилик тест, механикилик хусусийәтләрни өзгәртидиған қурулмилар, магнитлиқ-резонанслиқ томография, рентгенография, инвазиялик усуллар, мәхсус программилик-әхбаратлиқ комплекслар. Мундақ көп усуллар болғини билән, омуртқа йотисиниң патологиясини диагностикилайдиған “талашсиз” усул теһи йоқ.

Һәрбир бөлүмни диагностикилаш вә давалаш үчүн қоллинилидиған биомеханика қанунлири болиду. Омуртқа йотисиниң биомеханикиси тоғрилиқ Фрайетниң үч қануни бар, улар омуртқиниң мәйдә вә бәл қисимлириға беғишланған.

Биринчи қанун бойичә, әгәр омуртқиниң бәл вә мәйдә қисимлири турақлиқ шараитта болса, ротация вә биқинға илиш қариму-қарши йөнилиштә әмәлгә ашиду.

Фрайетниң иккинчи қануни — омуртқиниң бәл вә мәйдә қисимлири алдиға вә арқисиға егилгәндә ротация билән сайдбендинг бир йөнилиштә маңиду.

Фрайетниң үчинчи қануни — һәрқандақ бошлуқтики омуртқа сегменти қозғалғанда қозғилиш өзгириду, қозғилиш бу сегментниң башқа бошлуқтики қозғилишлирини өзгәртиду. Шуниң билән биллә медицинилик биомеханика ортопедиялик бөлүмдә мәжбүрий түрдә күндилик клиникилик практикада қоллинилиши керәк.

Медицинилик эргономика — жүкләрни вә бемарларни йөткәш саламәтликни сақлаш орунлирида пат-пат учришидиған еғир ишларниң бири. Жүкләр билән бемарларни йөткәштә эргономика алтә асасий параметрни һесапқа алиду: вәзипиләр (орунлинидиған иш), жүк (бемар), қоршиған муһит (қурал-жабдуқларни һесапқа елиш), берилгән ишни орунлайдиған адәм, ишниң уюштурулуши, оқутуш нәқ назарәт билән әмәләг ашурулуп, баһалиниши керәк. Эргономикилик ишни орунлаш — бу жуқурида ейтилған амилларға баһа бериш,

ховуп дәрижисини ениқлаш вә ховупни төвәнлитиш, мошунин арқилиқ вәзипиләрни орунлашқа адәмләрнин чамисини йөткүзүш.

Йеңи шараитларға маслишиш 7—10 күн ичидә маңиду. Әгәр 10 күн ичидә қолайсизлиқ (дискомфорт) сақланса, бу эргономикилик иш болуп һесапланмайду (эргономикилик һаләт әмәс), ишнин меңиш шараитини өзгәртиш керәк. Эргономикилик йөткәштә бемарни йөткәш қолайлиқ вә пайдилиқ болуши керәк, уннға минимал қозғилиш ясилип, максимал ховупсизлиқни сақлаш керәк.

Медицинидики биомеханика сүйәк-булжуңини, әсәб системисини, вестибулярлиқ аппаратнин координациялик күчийишини төкшүрәйду. Тәңпуңлуқни сақлаш вә теч һаләттә, қозғилишта (меңиш, еғир салмақ кәтириш, иңишиш, олтириш, туруш, йетиш вақтида) тәннин физиологиялик һалитини тәминләш медицинилиқ биомеханикинн иши.

Биомеханика қанунлири бойичә әң пайдилиқ һәрикәт — у қоюлған мәхсәткә йетишни тәминләйдиған һәрикәт. Организм үчүн әң пайдилиғи: булжуңға чүшкән күчни, энергия чиқими билән скелетқа чүшидиған жүклимини азайтиш. Ейтилған мәсилиләрнин йерими дегидәк адәм тенинин һәрикәтсиз һалитигиму тегишлик: йетиш, олтириш, туруш.

Һәмширә биомеханика қаидилири билән тонушуп, уни өзинн ишида қоллинишни билиши һажәт вә “қозғилиш” еһтияжлирини қанаәтләндүрүш пайдилиқ болуши үчүн бемарға уни пайдилинишни үгитиш вәзипилиниду (209—210-сүрәтләр). Бемарға қозғилиш активлиғини чәкләш режиминн әкси тәсирини азайтиш үчүн, еғир ағриқнин һәрхил шараитта орнини алмаштуруш вақтида әзалар билән тоқумиларни зәхмиләп алмас үчүн, шундақла мундақ ағриқларни қариғанда һәмшириләрнин зәхмә елиш мүмкинчиликлирини азайтиш үчүн уларға миннәтлик түрдә бирқатар биомеханикилик қаидиләрни билиш вә уларни дурус орунлаш һажәт.

Статистикилик вә динамикилик салмақлар. Кәтириш, тәннин бир қелиплиқ һалитини тутуп туруш медицинидики статистикилик ишларға ятиду. Динамикилик салмақлар операция ясиғучи хирургларға,



209-сүрәт. Һәмширә билән бемар тенинин биомеханикиси



210-сүрәт. Медицина хизмәткарлиринн тенинин биодинамикиси



211-сүрәт. Бир һәмшириниң қоли билән бемарни орундин турғузуш биомеханикиси

һәмшириләргә, стоматологларға башқиларға қариганда еғир келиду.

Медицинидики динамикилик иш — орун йөткөш (211-сүрәт). Эргономикилик график шәкиллиниши үчүн ишқа салидиган күчни азайтип, орниға уни бир аз вақитқа созуп, бирнәччә басқучқа бөлүш керәк.

Шуниң билән биомеханика — бу комплекслик илим, у биологияниң барлиқ мәсилилири билән бағлинишлик, бир тәрәптин, биологиялик системиларниң ишлири қандақ түзүлгәнлигини чүшиниш-

кә ярдәм қилиду, иккинчи тәрипидин, дохтурларға механикилик бузулуш билән зәхмиләнгән организмларни қандақ давалашқа болидиганлигини әмәлиятта чүшинишкә мүмкинчилик бериду. Өгиләр протезини ясаш — бу биомеханикиниң вәзиписи.

Бу илим, бир тәрәптин, жанлиқ тәбиәт қандақ ишләйдиғанлигини тәкшүрсә, иккинчи тәрәптин, һазирқи медицинда әмәлиятта қоллинилиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Медицинилик биомеханика — бу
2. Медицинилик биомеханика саһалирини атаңлар.
3. Омуртқа йотисиниң биомеханикиси немишкә алаһидә қизиқиш пәйда қилиду?
4. Омуртқа йотисиниң биомеханикисиға бағлиқ Фрайет қанунлирини атаңлар.
5. Медицинилик эргономикиға тәриплимә бериңлар.
6. Биомеханикиниң диагностикилик усуллирини атаңлар..



Медицина хизмәткарлириниң қайсисиниң статистикилик жүклимиси еғир?



Өз организмиңларниң сутка ичидики биомеханикилик һалитини тәрипләңлар.



Еғирлиқ көтәргән вақитта дурус биомеханика төвәндикичә болиду:

1. Еғирлиқни көтириш алдида тапанлириңларни бир-биригә 30 см арилиқта сәл алдиға силжитип орунлаштуруңлар (мундақ шараит тәңпунлуқни йоқатмаслиққа вә жиқилип чүшмәсликкә мүмкинчилик бериду).
2. Алдиға иңишмәс үчүн көтириш керәк адәмниң йениға туруңлар.
3. Көтириш вақтида өзәңларға тартип қисип тутуңлар.
4. Адәмни көтириш вақтида тәннитик һалитидә сақлап туруп, пәқәт тизнила пүкүңлар.
5. Адәмни көтириш мабайинида чапсан һәрикәт қилмай, аста көтириңлар.

6. Бурулуш үчүн алди билән адәмни көтириңлар, униңдин кейин тапанға күч селип туруп, жүк қолда болған вақитта тәнни пүкмәй, аста бурулуңлар. Биомеханикиниң аталған қайдилирини орунлаштин башқа чоңкур нәпәс елип күчиништин нери болуш керәк. Чоңкур нәпәс елиш дәрижисидә күчиниш жүрәк соқуши билән коронарлик (жүрәк артериясигә бағлиқ) қан айланиминиң бузулушиға — Вальсальва тәсиригә әкелиду. Бошлуқтики тән һалитиниң туюқсиз өзгириши адәмдә постуральлик рефлексни пәйда қилиши мүмкин, йәни башниң айланиши, қулақта авазниң пәйда болуши, жүрәк соқуши, бәзидә есини жүтүрүп қоюши мүмкин. Тәнниң дурус биомеханикисини пайдилинип туруп, һәмширә ховупсизлиқни тәминләйду, йәни у өз саламәтлигини сақлайду.

§ 117. ЙӨРДИКИ ЖАНЛИҚ ОРГАНИЗМЛАР ҚОЗҒИЛИШИНИҢ БИОМЕХАНИКИСИНИ ТӨТҚИҚАТ ҚИЛИШ. МОДЕЛЬЛАШ

Бу дәристә:

- Йөр йүзидики жанлиқ организмлар қозғилишиниң биомеханикисини оқуп үгинисиләр;
- Йөр йүзидики жанлиқ организмлар қозғилишиниң биомеханикисини модельләйдигән болусиләр.

Биомеханика — жанлиқ организмларниң өз ара бағлинишлиқ һәрикәт сегментлириниң орун алмаштурушини, йәни бир-бири билән селиштурғанда шәхсий қисимлириниң көп қирлиқ вә һәр түрлүк қозғилишлирини шәкилләндүридиған вә тәһлил қилидиған илим.

Биомеханика қануни бойичә қоюлған мәхсәткә йетишни тәминләш вә организм үчүн пайдиси болидиған қозғилиш пайдилиқ болуп санилиду: булжуңға, скелетқа аз күч чүширип, энергияни аз ишлитиду.

Организмларниң бир орундин иккинчи орунға алмишиши локомоция дәп атилиду.

Йөр йүзидики организмларниң қозғилиш биомеханикисини тәтқиқат қилиш

Қозғилиш немә үчүн керәк? _____

— Көп һүжәйрилиқ организмларниң қозғилиши әзаларниң қандақ системилери билән бағлинишлиқ? _____

— Йөр бетидики һайванатларниң қозғилиш усулларини атаңлар.


— Йөрғилиғучи һайванлар _____ бар.

— Сөкрәп қозғилидиған һайванлар _____.

— Һайванатлар яхши жүғриши үчүн _____ керәк.



— Жүгрәш вақтида путлириниң Һалитигә бағлиқ Һайванатлар _____ бөлүниду.



2. Пақиниң қозғилишини тәкшүрәш.

— Алдинқи жүп путлири кәйни жүп путлиридин қандақ пәриқлиниду?

— Схема бойичә пақиниң тәкши йөрдә аддий қозғилишини чүшәндүрүңлар.

Алдинқи сол айиғи _____.

Униң билән бир вақитта оң кәйни пути _____.

Иккиси пақиниң орнини алмаштурушқа қатнишиду. _____.


Униңдин кейин оң алди пути _____.



Сол кәйни пути _____.

Мошу цикл пақиниң қозғилишини тәминләйду.

Схема бойичә пақиниң йәрдин сәкрәп қозғилишини чүшәндүрүңлар.




3. Иштниң қозғилишини тәтқиқат қилиш.

А. Меңиш.

Меңиш вақтида омуртқиниң қурулуми өзгирәмду? _____

Иштниң алдиға қарап қозғилишини _____ тәминләйду.

Ишлар қандақ қозғилиду, әскә елиңлар. Меңиш вақтида бир пути көтирилип туриду, қалған үчи _____.



Әгәр ишт меңишни сол тәрәп алдинқи путидин башлиса, у вақитта нерисиға путлири мону рәт билән қозғилидиған болиду: _____.

Ә. Жүгрәш

Жүгрәш вақтида бир мәзгилдә _____ орун алмаштуриду.

Омуртқа түзүлүши өзгирәмду? Қандақ _____?

Немә сәвәптин жүгрәш илдамлиғи өсиду? _____

§ 118. ЖҮРӘКНИҢ ӨТКҮЗГҮЧ СИСТЕМИСИ. ЖҮРӘК АВТОМАТИЯСИНІҢ МЕХАНИЗМИ. ЖҮРӘКТИКИ ҚОЗҒИЛИШНИҢ ӨТҮШ ИЛДАМЛИҒИ. ЖҮРӘК БУЛЖҰҢЛИРИНИҢ ҚИСҚИРИШИ

Бу дәрістә:

- жүрәкниң өткүзгүч системисини, жүрәк автоматиясиниң механизмини, жүрәктики қозғилишниң өтүш илдамлиғини, жүрәк булжұңлириниң қисқиришини оқуп үгинисиләр;
- электрокардиограммини қоллинип, жүрәк автоматияси механизмини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Жүрәкниң түзүлүши қандақ? Жүрәк ишиниң автономияси дегән немә? Автономлук әсәб импульслири қәйәрдә түзүлиду? Бу импульслар жүрәкниң башқа қисимлириға қандақ берилиду?


Тирәк чүшәнчиләр:

- һәрикәт иқтидари
- синоартериаллиқ түгүн
- өгиниң соғ тегиш түгүни
- бирхил вә бирхил әмәс кардиомиоцитлар
- илгириләш пәйда қилғучи
- жүрәкниң өзлүгидин ишлиши
- атриовентрикулярлиқ тохташ

Автоматия — жүрәкниң өзидә пәйда болидиған импульсларниң тәсиридин қисқираш қабилийти. Миокардниң типлиқ әмәс һүжәйрилиридә әсәб импульслири ясилидиғанлиғи ениқланди. Жүрәк булжұңлириға қозғилиш, өткүзгүчлүк, қисқираш вә автоматия хас. Қозғаш миокардниң тәсирчанлиқ тәсиридин болиду, өткүзгүчлүк — қозғашни өткүзүш, қисқарғучи қозғаш вақтида қисқираш қабилийәтлири. Алаһидә хусусийәт — автоматия. Бу жүрәкниң өзлүгидин қисқираш қабилийти. Өз

вақтида Аристотель жүрәккә тирикчиликниң бешидин башлап та ахириғичә тохтимай соқуш қабилийти тән дәп язған. Өткән әсирдә жүрәк автоматиясиниң 3 асасий нәзәрийәси болди. Прохаска билән Мюллер жүрәкниң соқуш қисқириши униң әсәб импульслири билән бағлинишлиқ дәп һесаплайдиған нейрогенлиқ нәзәрийәни тәклип қилди. Гаскелл билән Энгельман қозғаш импульслири жүрәк булжұңиниң өзидә пәйда болидиғанлиғини ейтип, миогенлиқ нәзәрийәни тәклип қилди. Жүрәктә ишләп чиқирилидиған вә униң қисқиришиға башланма болидиған жүрәкниң гормонлук нәзәрийәсиму болди. Жүрәк автоматиясини Штраубниң жирақлашқан жүрәк сүритидин көрүшкә болиду (212-сүрәт). 1902-жили Томск профессори А.А. Кулябко мошу усулни қоллинип, биринчи қетим адәм жүригини тирилдүрди.

XIX әсирниң ахирида қулақчә билән қеринчә миокардиниң һәрхил жайлирида түзүлүши алаһидә атипиялик (бөлгүлүк типқа ятмайдиған) булжұң һүжәйрилириниң жиғилидиғанлиғини ениқланди. Бу һүжәй-



212-сүрәт. Жүрөк

рилөрнің диаметри қисқираш булжуңлиридин йоған вә уларда қисқираш элементлири аз болди, гликоген гранулиси (түгүрчәклири) көп. Ахирқи жиллири Р-һүжәйрилири (Пуркинсь һүжәйрилири) яки пейсмекерлик түзүлүшләр жиғилидигәнлиғи ениқланди. Шунинң билән биллә уларда өтүмлүк һүжәйриләрму болди. Улар қисқираш вә пейсмекерлик кардиомиоцитларның (жүрөк булжуңиниң һүжәйриси) арасида арилиқ һаләттә орунлишип, қоздурушни өткүзүш системисини түзиду. Уларда мундақ түгүнләр билән йоллар болиду:

1. Синоатриальлик түгүн (Кийс-Флек). У кавак веналар йолида, йәни веналиқ синусларда орунлашқан.

2. Түгүн арилиқ вә қулақчә арилиқ Бахман, Венкенбах вә Торель өткүзгүч йоли қулақчә билән қулақчә арилиқ пәрдә миокарди бойичә өтиду.

3. Атриовентиккулярлик түгүн (Ашофф-Тавар). Оң қулақчә эндокардиниң астида, қулақчә арилиғидики пәрдиниң төвәнки қисмида орунлишиду.

4. Атриовентиккулярлик топ яки Гис топи. Қернчә арилиқ пәрдиниң жуқарқи қисми билән атриовентиккулярлик түгүндин келиду. Униңдин кейин икки путқа — оң вә сол путқа бөлүниду. Улар қеринчә миокардида тармақлар түзиду.

5. Пуркинсь талчиги. Бу — Гис топи айиғиниң тармақланған учи. Қеринчә миокардиниң қисқираш һүжәйрилириниң қийилишишини әмәлгә ашуриду.

Синоатриальлик түгүнләр көпинчә Р-һүжәйрилиридин түзүлиду. Өткүзгүч системиниң башқа қисимлири өтүмлүк кардиомиоцитлар. Бирақ улардиму қулақчә билән қеринчиниң қисқираш миокардисида

пейсмеркерлик һүжәйриләрнийң азла мөлчәри болиду. Қисқираш кардио-миоцитлар Пуркинье талчиғи билән, шунинға охшаш өз ара нексуслар билән (йочуқлуқ яндишиш арқилиқ) электрлик тосалғуси төвән һүжәйрә арилиқ бағлинишлар билән бағланған. Мошунин арқисида вә кардиомиоцитларнийң тәхминән қоздуруш қабилыйитинийң бирдәк болушиға бағлиқ миокард функционаллик синцитий болуп тепилиду. Жүрәк булжуңи титиркәндүргүчләргә (қоздурғуч) биртуташ қурулум ретидә жавап қайтуриду.

Жүрәк автоматиясинийң түрлүк қисимлиридики өткүзгүч системиларнийң ролини дәсләпки қетим Станниус билән Гаскелл ениқлиған. Станниус жүрәкнийң һәр түрлүк қисимлириға лигатура бағлиди. Биринчи лигатура венозлуқ синуснийң арасиға, синоатриальлик түгүн билән оң қулақчә орунлашқан йәргә қоюлиду. Мошуниндин кейин синус адәттики тәвриништә қисқиришини давамлаштуриду, минутиға 60-80 қетим қисқирайду, қулақчә билән қеринчинийң қисқириши тохтайду. Иккинчи лигатура қулақчә билән қеринчинийң чегарисиға қойилиду. Бу синуслуқ түгүн автоматиясинийң чапсанлиғидин тәхминән 2 һәссә аз, йәни минутиға 30—40 қетим қеринчә қисқиришини пәйда қилиду.

Қеринчилар атриовентрикулярлик түгүн һүжәйрилиринийң механикиқ тәсиридин қисқиришқа башлайду. Үчинчи лигатура қеринчиларнийң оттурисиға қоюлиду. Шуниндин кейин уларнийң жуқарқи қисми атриовентрикулярлик тәвриништин, төвәнки қисми болса, синус тәвринишидин 4 һәссә аз чапсанлиқта, йәни минутиға 15—20 қетим қисқирайду. Гаскелл өткүзгүч системиларнийң йәрлик түгүнлирини салқинлитиш арқилиқ жүрәк тәвринишинийң йетәкчи жүргүзгүчиси синоатриальлик түгүн екәнлигини ениқлиди. Станниус билән Гаскелл тәжрибилиринийң асасида автоматия градиентини төвәнлитидиған принцип шәкиллиниду. У йәрдә жүрәк автоматиясинийң мәркизи венозлуқ учтин жирақ, артериаллик учқа йеқин орунлашқансири унийң автоматия қабилыйити төвән болиду дәп ейтилиду. Бирхил шараитта синоатриаллик түгүнләр төвәндә ятқан автоматияни бесип ташлайду, унийң чапсанлиғинийң туюқсиз пааллиғи ашиду. Шуңлашқа синоатриальлик түгүнни 1-қатардики, атриовентрикулярликни 2-қатардики, Гис топи билән Пуркинье талчиқлирини 3-қатардики *автоматия мәркизи* дәп атайду.

Жүрәк қисимлиринийң бирхил рәт билән қисқириши унийң өткүзүгүч системиси арқилиқ қоздурушни өткүзүш алаһидиликлиригә бағлиқ болиду. Қоздуруш синоатриальлик түгүндә — тәвринишлик йетәкчи жүргүзгүчидә башлиниду. Униндин қулақчә арилиқ Бахман топи тармиғи бойи билән 0,9—1,0 м/с илдамлик билән қозғилиш қулақчә миокардиға тарайду. Уларнийң систолиси башлиниду. Синуслуқ түгүндин қозғаш бир пәйттә түгүн арилиқ Венкенбах билән Торель йоли билән атриовентрикулярлик түгүнгә йетиду.

Униң өткүзгүчлүк илдамлиғи чапсан $0,02—0,05$ м/с-қичә төвөнлөйду. Атриовентрикулярлиқ тохташ пәйда болиду. Йәни қеринчиниң импульс өткүзүши $0,02—0,04$ с-қа тохтайду. Мошу тохташниң арқисида қан қулақчә систолиси вақтида қеринчә қисқириши башлиниши биләнла чүшиду. Атриовентрикулярлиқ түгүндин Гис топи бойичә униң аяқлири билән түгүнлиригә қозғаш $2—4$ м/с илдамлиқ билән тарайду. Мошундақ жуқури илдамлиқниң арқисида у бир пәйттә қеринчә арилиқ пәрде билән икки қеринчини бирдәк тәминлөйду. Қеринчә миокарди бойичә қоздурушни өткүзүш илдамлиғи $0,8—0,9$ м/с болиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:




1. Жүрәк булжуңи һүжәйрилири билән скелет булжуңи һүжәйрилириниң пәрқи қандақ?
2. Бирхил вә бирхил әмәс кардиомиоцитлар хизмитиниң мәнаси неמידә?
3. Жүрәкниң өткүзгүч системиси тәркивигә немә кириду?
4. Жүрәкниң өзлүгидин ишлиши дегинимиз немә?
5. АВ-тохташ дегән немә?
6. Униң физиологиялик мәнаси қандақ?



Иқтидар һәрикитиниң пәйда болуши қәйәрдин башлиниду?



Сүрәттә 1—5 санлири билән көрситилгән жүрәкниң өткүзгүч системисиниң барлиқ қисимлирини атаңлар.



1. Жүрәк булжуңиниң асасий тәркивий-функционаллик алаһидиликлирини атаңлар.
2. Жүрәк булжуңиниң қисқириши қандақ қанунға беқиниду?
3. Жүрәк булжуңиниң қандақ һүжәйрилири өзлүгидин ӘП ишләп чиқиралайду?
4. Жүрәкниң өткүзгүч системисиниң асасий функциялирини атаңлар.
5. Жүрәк автоматиясигә ениқлима бериңлар.
6. Жүрәк автоматиясиниң асасий түгүнлирини атаңлар.

§ 119. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ВӘ УНИҢ ДИАГНОСТИКИЛІК ӘНМИЙИТИ

Бу дәрістә:

- Электрокардиография вә униң диагностикилік әнмийитини окуп үгинисиләр;
- Электрокардиограммини пайдилинип, жүрәк автоматияси механизмини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Электрокардиография дегән немә? ЭКГ қандақ мәхсәттә қоллинилиду? ЭКГ ярдими билән қандақ ағриқларни ениқлашқа болиду? Силәр диагностика усулиниң мәлуматлирини пайдилинип көргәнму? Бу тәкшүрәш усулини немини ениқлаш үчүн қолландиңлар?

Тирәк чүшәнчиләр:

- электрокардиограмма
- униң диагностикилік әнмийити


Электрокардиограмма (ЭКГ) — бу жүрәкниң электрлик активлиғини йезивелиш. ЭКГ жүрәк соқуши билән өткүзгүчлүгини, теч һаләттә жүрәк булжуңлириниң қан билән төминлинишини баһалайду, шунинң билән биллә жүрәк камерилириниң улғийишиға тәсир қилиду (қулақчилар билән қеринчилар).

ЭКГ нәтижилири арқилиқ аритмия, инфаркт, жүрәк йетишмәслиги, жүрәк дефектлири охшаш ағриқларни ениқлашқа, шунинң билән биллә өпкәниң ишлишиниң бузулушини баһалашқа болиду. Сәвәви һәрхил өпкә ағриқлирида жүрәк билән башқа әзаларниң кислород билән төминлиниши бузулиду (214-сүрәт).

Бу усуллар жүрәк генерацияләйдиған электрлик импульсларни тиркәшкә асасланған. Уларни йезиш әгир сизик түридә әмәлгә ашурулиду. Кардиограммини электродларниң ярдими билән тиркәйду, электродлар мәйдә кавигиға қоюлуп, мәхсус аппаратқа қошулиду.

тәтқиқат йеқимсиз тәсир пәйда қилмайду, тәхминән 10 минуттәк вақит кетиду, ахирида тәйяр пленкини дохтур тәрипләп язиду.

Жүрәктин пәйда болған қозғилиш ритми өткүзгүчи система билән миокард арқилиқ тарилиду вә һүжәйрә үстидә әкси иқтидариниң пәйда болуши билән биллә маңиду. Бу вақитта көп мөлчәрдә қозғалған бирликләрниң синхронлук разрядлиниши оруналиду. Жүрәк күчлүк биологиялик электрогенератор болуп



214-сүрәт. Электрокардиография

һесаплиниду. Қозғалған талчиқларниң жиғинда иқтидариниң йоғанлиғи шунчилики, уни жүрөктин жирақ йөрләрдинму тиркәшкә болиду. Электродларни тәнниң мәлум чекитлиригә қоюш арқилиқ әгир сизиклар арқилиқ йезивелишкә болиду, у жүрөк цикли ичидә иқтидарларниң һәрхил динамикисини көрситиду. Бу әгир сизик мурәккәп тәриплимигә егә, у электрокардиограмма (ЭКГ), тәкшүрәш усули болса электрокардиография дөп атилиду.

ЭКГ диагностикилик усул ретидә медицинида кәң қоллинилиду, у жүрөкниң ишилишиниң бузулушиниң бирқатар алаһидиликлирини ениқлашкә мүмкинчилики бериду. Жүрөкниң һәрхил йөрлиридә жүрөк цикли вақтида қоздуруш жәрияни бир муддәттә болмайду. Иқтидарлар айримчилиғи чоң, икки чекитни қошудиган шәртлик сизикларни жүрөкниң *электрлик оқи* дөп атайду. Әгәр қозғилиш бир қелипта таралса, жүрөкниң электрлик оқи анатомиялик оққа мас келиду. Мәлум бир басқучта электрлик оқ һәрхил мөлчәр вә йөнилиштә тәриплиниду, уларниң векторлуқ тәхмини болиду (вектор-йөнилиш бәргүчи). Бир вақитта һәрхил иқтидарларни тиркәш (ЭКГ) вә жүрөккә хас электр оқи (вектор) **векторкардиограмма (ВКГ)** дөп атилиду.

Электрокардиография — жүрөк-қан томурлири системисини әсваплиқ тәкшүрүшниң алдинқи қатарлиқ усуллириниң бири, у кәң таралған вә әмәлийәтчи дохтурлар үчүн қолайлиқ. Бу усул өзиниң әһмийитини йоқатмайду вә дайим йетилдүрүп туриду. У клиникилик тәкшүрүшләр мәлуматиниң тәһлил қилиниши билән бирдәк болушини тәминлиши керәк.

Бу усулни ашуруп баһалаш диагностикиниң еғир хаталиқлиригә елип келиду. ЭКГ өзгиришлириниң сәвәвини дурус чүшиниш жүрөк ағриқлирини ениқлашта баһалиқ ярдәм болуп һесаплиниду. ЭКГ — миокардиниң биоиқтидариниң графикалиқ йезилиши. Жүрөк булжуңидин пәйда болидиған электрлик һадисиниң асаси һүжәйрә мембраниси арқилиқ ионларниң қозғилиши билән бағлинишлиқ. Уларниң ичидики әң асасий әһмийәтликлири: натрий, калий вә кальций катионлири, хлор анионлири.

Медицининиң һазирқи тәрәққий етиш басқучида атеросклерозлуқ диагностикилаш билән давалаш адәм томуриниң зәхмилиниш алаһидиликлириниң анатомиялик вә морфологиялик тәриплирини санлиқ вә сапалиқ тәтқиқат қилишсиз мүмкин әмәс. Мундақ тәтқиқат қилишлар, биринчидин, артерияниң атеросклерозлуқ стенозирлинишини ениқлаш үчүн, униң очуқлиғини, адекватлиқ давалаш усулини таллаш үчүн, иккинчидин, ағриқниң тәрәққий етишигә динамикилик байқаш ясаш үчүн вә антиатеросклерозлуқ тәсирини баһалаш (гиполипидемиялик) үчүн, шундақла атеросклероз ағриқлирини хирургиялик давалаш үчүн керәк.

Атеросклерозның өсуші, асасән, бирқатар созулма вә қаттиқ әдәп кетиш жәрияларға бағлинишлиқ. Униң биринчисигә липидлиқ түгүнләрниң пәйда болуши ятиду. Иккинчиси томур ичилик тромб түзүлүши билән бағлинишлиқ, у атеросклерозлуқ түгүнни шәкилләндүрүшкә қатнишиду вә қаттиқ әдәп кәткән томурниң йешилип қелишиға елип келиду. Йәнә, бир тәрәптин, ахирқи жиллардики тәтқиқатлар түгүн қелинлиғиниң азийиши нәтижисидә артерияниң қисилиш дәрижиси төвәнләйдиғанлиғини дәлиллиди. Атеросклерозниң мундақ репрессияси туюқсиздин яки давалаш нәтижисидә пәйда болиду. Шүниң билән томур түзүлүши билән хизмити бойичә елинған визуаллиқ әхбаратниң әһмийәтлик нусхиси тәжрибилик мәхсәтләр үчүн әһмийәтлик.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Электрокардиограмма — бу
2. Кардиологиялик тәкшүрүшләр немә үчүн жүргүзүлиду?
3. Кардиологиялик тәкшүрүшләрниң асасий усуллирини атаңлар.
4. Жүрәкниң электрлиқ импульслири қандақ тиркилиду?



Электрокардиография ярдими билән қандақ ағриқларни диагностикилашқа болиду?



Өз дохтуруңларға берип, кардиограмма ясап, жүригиңларниң сақ екәнлигигә көз йәткүзүңлар.

§ 120. ЖҮРӘКТӨ БОЛИДИҒАН ЭЛЕКТРЛИҚ ЖӘРИЯННИ ТӘТҚИҚАТ ҚИЛИШ. МОДЕЛЬЛАШ

Бу дәристә:

- жүрәктики электрлиқ жәриянларни тәтқиқат қилип үгинисиләр;
- жүрәктики электрлиқ жәриянларни модельлалайдиған болусиләр.

Жүрәктики электрлиқ жәриян электрокардиограммида көрүнүш бериду: қозғилиш (деполяризация) — жүрәк һүжәйрилирини қисқирашқа, реполяризация — бошашқа елип келиду.


Жүрәктө меңиватқан электрлиқ жәриянларни тәкшүрәш үчүн ЭКГ қандақ элементлардин тәркип тапқанлиғини вә бу элементларниң немини билдүридиғанлиғини билиш керәк (215-сүрәт).

1. Чилиқ дегинимиз немә?

— P чилиши _____ билдүриду.


— Q R S чилири _____ тәрипләйду.

— T чилиши _____ билдүриду.



215-сүрәт. ЭКГнің тәһлили

- Әң егиз чиш қайси? _____
- 2. *Сегмент* дегинимиз немә?
 - P Q сегмент _____ билдүриду.
 - T P сегментлири _____ мувапиқ келиду.
 - S T сегментлири _____ билдүриду.
- 3. *Интервал* дегинимиз немә?
 - P Q интерваллири _____ көрүниду.
 - Q T интерваллири _____ көрситиду.
- 4. QRS комплекси _____ көрүниду.
- 5. Жүрөк қандақ режимда ишләйду? _____
- 6. Жүрөкнің ритмикилик қисқиришиға елип келидиған импульслар қәйәрдә пәйда болиду? _____





БАП БОЙИЧӘ БИЛИМНИ СИСТЕМИЛАШ ВӘ ЙӘКҮНЛӘШ СОАЛЛИРИ БИЛӘН ТАПШУРМИЛИРИ

1. Биомеханика дегинимиз немә?
2. Инженерлик биомеханика немә билән бағлинишлиқ?
3. Медицинилиқ биомеханикини қандақ тәрипләшкә болиду?
4. Эргономикилик биомеханикини қайәрдә қоллиниду?
5. Һава булжуңлириниң ишләш қайдилрини атаңлар.
6. Һава булжуңлириниң түзүлүши қандақ?
7. Биомеханикада нитиноллик симлар қандақ қоллинилиду?
8. Медицинидики биомеханикниң вәзипилири қандақ?
9. Клиникилик биомеханика қандақ мәсилиләрни йешиштә қоллинилиду?
10. Эргономика медицинада қандақ мәсилиләрни йешиду?
11. Медицинада биомеханика немини тәтқиқ қилиду?
12. Орун тутуп ятқан бемарниң орнини алмаштуруш үчүн медицина хизмәткарлири қандақ һәрикәт ясиши керәк?
13. Жүрәкниң өткүзгүчлүк системисини тәрипләп бериңлар.
14. Жүрәктә қозғилишниң өткүзүш илдамлиғи қандақ?
15. Жүрәк автоматияси механизми қандақ әмәлгә ашиду?
16. Электрокардиограмма — бу
17. ЭКГ ярдими билән қандақ ағриқларни ениқлашқә болиду?
18. Қандақ әгир сизикни электрокардиограмма дәп атайду?

БИОТЕХНОЛОГИЯ

13

§ 121. ИШЛӘПЧИҚИРИШТА, ЙЕЗА ЕГИЛИГИДӘ, МЕДИЦИНИДА, ТУРМУШТА МИКРООРГАНИЗМЛАРНИ ҚОЛЛИНИШНИҢ АРТУҚЧИЛИҚЛИРИ БИЛӘН КАМЧИЛИҚЛИРИ

Бу дәрістә:

- ишләпчиқиришта, йеза егилигидә, медицинада, турмушта микроорганизмларни қоллинишниң артуқчилиқлири билән камчилиқлирини оқуп үгинисиләр;
- биотехнологиядә қоллинилидиған жанлиқ организмларниң артуқчилиқлирини тәһлил қилалайдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Микроорганизмлар тоғрилиқ силәр немә билисиләр? Уларниң қайсилири бизниң достлиримиз, қайсилири дүшмәнлиримиз? Адәм микроорганизмларни ишләпчиқиришта қандақ қоллиналайду? Микроорганизмлар йеза егилигидә қандақ қоллинилиду? Уларниң медицинидики роли қандақ? Адәмләр микроорганизмларни турмушта қоллинамду?

Тәбиәттики микрорганізмлар алыми хил-му-хил. Уларниң бираз бөлиги бактерияләр, униң ичидә цианобактерияләрму (водоросльлар) бар. *Микроорганизмларниң көплигән топни моғулар, бир һүжәйрилиқ җаниварлар, вируслар, бир һүжәйрилиқ водоросльлар тәшкил қилиду.* Микроорганизмларниң көң түрдә тарилиши уларниң тәбиәттә чоң роль атқуридиғанлиғини дәлилләйду. Уларниң қатнишишида топиларда вә су мәнбәлиридә һәрхил органикилиқ маддиларниң парчилиниши әмәлгә ашиду, улар тәбиәттики маддилар вә энергия әйлинишини тәминләйду. Топиниң һосулдарлиғи, нефть, таш көмүр, торф, һак ташларниң түзүлүши уларниң һәриктигә бағлинишлиқ. Микроорганизмларниң көпчилиги жуқури дәриҗидә *ферментативлиқ хизмәт атқуриду.* Шуңлашқиму биринчи новәттә ишләпчиқириш вә йеза егилигидә көң түрдә пайдилинилиду. Улар сүзмә, йогурт, шарап, пиво, қимиз, қетик, май в.б. озуқ-түлүк мәһсулатлирини тәйярлашта қоллинилидиған сүт кислоталиқ вә сиркә кислоталиқ бактерияләр. Һазирқи вақитта жуқури сападики ечиған сүт мәһсулатлирини ишләп

Тирәк чүшәнчиләр:

- микроорганизмлар
- ферментативлиқ һәрикәт
- антибиотиклар
- витаминлар
- биологиялиқ назарәт
- биологиялиқ зәхмилиниш
- жуқумлуқ

чиқиришта пайдилинидиған бактерияләр билән могуларниң бирқанчә түрлири ясалған. Улар чириған микроорганизмларниң һаятлик һәрики-тини бесип, өзлириниң хусусийәтлирини узақ вақитқичә йоқатмайду.

Микроорганизмлар антибиотиклиқ хусусийәт көрситип, йәни башқа микробларниң өсүшини бесип ташлашқа яки өлтүрүп ташлашқа қабилийәтлик тәбиий маддиларниң продуцентлири болуп һесаплиниду. Антибиотиклар медицинада, мал чарвачилиғида, йеза егилиғидә, ишләп чиқиришта қоллинилиду. Топа микроорганизмлариниң биологиялик актив маддилар — витаминлар, аминокислоталар, өсәргүчи маддилар, ферментлар түзүш хусусийәти ениқланған. Микроорганизмларниң болупму өсүмлүк егилиғи билән мал чарвачилиғида алидиған орни алаһидә. Бу топини азот билән бейитиш, микроблуқ препаратлар ярдими билән йеза егилиғи өсүмлүклириниң зиянкәшлири билән күришиш, йәмләрни дурус тәйярлаш вә сақлаш, йәмлик белок елиш мәсилилиригә бағлиқ.

XX әсирниң иккинчи йеримида дуниявий ихтисатта энергия, таам вә ишләпчиқириш үчүн хам әшияниң йетишмәслиғи қаттиқ сезилишкә башлиди. Әтрап муһитни булғаш ховупи туғулди. Өсүмлүк тәхлит тәбиий органикилик маддиларни техникилик мурәккәп әмәс жабдуқларда, һава райиға бағлиқ әмәс башқурулидиған шараитларда, энергия билән әмгәк көп чиқмайдиған инсанийәткә керәклик халиған башқа түргә алмаштурушқа қабилийәтлик қувәтлик вә хилму-хил көпәйтиш системиси ретидә микроорганизмларға көңүл бөлүнди. Бу биоконверсия — өсүмлүк массилири компонентлирини микробиологиялик яки ферментативлик йол билән һәр түрлүк маддиларға вә мәһсулатларға айландуруш. Иккинчи тәрәптин, бу — өсүмлүк хам әшиясини толук пайдилиниш, қалдуқсиз технология ясашниң бирдин-бир йоли.

Микроорганизмларни пайдилиниш. Автоном генларға удул манипуляция жүргүзүш мүмкинчилиғиниң пәйда болуши йеңи селекци-ялик иш йөнилишиниң — генлик инженерияниң пәйда болушиниң асасини яратти. Бу усулниң утуқлириниң бири — адәмгә интайин һажәт маддилик бактерия һүжәйрисигә кодлайдиған генларни тошуш. Мәсилән, һазирқи вақитта инсулинни, интерферонни ишләпчиқиришта ишләш мүмкинчилиғи бар. Генлик инженерия — вакцинилар ясаш билән ишләпчиқиришниң келәчиги бар бирдин-бир йоли.

Йеза егилиғиниң қалдуқлирини биогаз яки этанолға қайта ишләш үчүн бактерияләрни қоллиниш пүтүнләй йеңиланған энергия фондлири-ни ясашқа мүмкинчилик бериду. Бактерияләрни металларни бөлүвелиш үчүн, нефть қәвәтлиридин нефть елишни ашуруш үчүн пайдилиниду.

Бәзибир бактерияләрниң ярдими билән биологиялик назарәтни әмәлгә ашурушқа болиду. Мәлум бир бактерияләр бәзибир кепинәкләрниң юлтуз-қурутиға ағриқ жуқтуридудә, уларниң қирилип кетишигә елип келиду. Бирақ улар башқа организмларға тәсир қилмайду. Бу дегинимиз — бизниң қолумизда көплигән өсүмлүк зиянкәшлири билән күришиш

қураллири бар деген сөз. Бактерияләр препаратлирини етизликни тозаң-лителиш үчүн пайдилиниду. Миллионлиған жыллар бойи макроорганизм-лар вә микроорганизмлар өз ара маслишип, бир-биригә керәк болуш-қа башлиди. Микроблар — адәм яки һайванатлар организмниң дайимий маканлиғучилири, уларниң һаятлиғида әһмийәтлик роль атқуриду. Дайимий үчәй микрофлорисиниң вәкиллири озуклуқ маддиларни һәзим қилишни аяқлаштуриду, уларни микроорганизмларниң сапалиқ пайдилинишиға шараит яритиду. Үчәйдә яшайдиған көплигән микро-блар чиритқуч вә ағриқ пәйда қилғучи бактерияләрниң антагонистлири (қарши тәсир йәткүзидиған мадда) һесаплиниду, адәм яки һайванатлар организмлири пайдилинидиған витаминларни ишләп чиқуриду.

Микроорганизмларниң зийиниға қариғанда пайдиси көп десәк, ашуруп ейтқанлиқ әмәс. Бирақ, адәттә, адәттики шараитларда биз буни унтуп қалимиз. Көпчилик микроблар тоғрилиқ ейтқанда, алди билән уларниң ағриқ пәйда қилидиғанлиғини есимизгә алимиз, сәвәви көплигән ағриқларни пәйда қилидиған көрүнмәйдиған қозғиғучиларниң алдидики қорқунучни унтуш интайин қийин (216-сүрәт).

Бактерияләр адәмгә икки шараитта зиянлиқ болуши мүмкин. Биринчидин, әгәр алаһидә чариләрни қолланмисақ, тамақ мәһсулатлириниң бузулушиға елип келиду. Бактерия алмишишиниң аччиқ мәһсулатлиридин тәркип тапқан бузулған тамақлар арқилиқ организм зәхмилиниду. *Иккинчидин*, бактерияләр билән вируслар жуқумлуқ ағриқларниң қозғиғучилири болуши мүмкин. Уларниң әкси йәрлири мошу. *Зиянлиқ микроорганизмлар* өсүмлүкләргиму, һайванатларғиму жуқуши мүмкин. Давалаш-эпидемиологиялик хизмәт көрситиш мәркәзлириниң алимлири билән хизмәткарлири микробниң санлиқ көрсәткүчлирини өлчәйду, бу озук-түлүкниң йеңи тәйярланғанлиғи билән ховупсизлиқ дәрижисини ениқлашқа ярдәмлишиду. Бактерияләр көпинчә имарәтләрниң, труба системилириниң, металл қурулмилириниң керәклик бөләклириниң бузулушиға сәвәпчи болиду. Мәсилән, нефть қатламлиридин нефтьни толук елиш мәхситидә у йәрни хошна патқақ муһитиниң сүйи билән толтуруиду, нәтижидә нефтьта мол микрофлора пәйда болуп, йеқилғу ишләпчиқуришта униң сапасини төвәнлитидиған чаплашқақ мадди-ниң пәйда болушиға әкелиду. Могулар мицелийлири қиммәт туридиған оптикилик әсваплар әйнигигә чүшкәндә, уни ярамсиз қилип, баһалиқлиғини йоқитиду. Водоросльлар деңиз кемилириниң астиға жиғилип, йеқилғу чиқимини 10% -ға ашуриду, қозғилиш илдам-лиғини 20—30% -ға төвәнлитиду.

Ечитқу могулар



Айран могулири



216-сүрәт. Микроорганизмларниң егиликтики роли

Авиациялық йеқилғу, майлаш-совутуш суюқлықлири бәзибир бактерияләрниң тәсиридин тәзүмлүк эмульсия түзиду, кислоталиқни ашуриду, пуриғи билән рәңгини өзгәртиду, чаплашқак мадда билән булғиниду, адәмдә дерматит, өпкә ағриқлирини пәйда қилиши мүмкин. Бактерияләрниң бәзибир түрлири нефть трубилирида орунлишип, уларни чиритиду, бу трубиларниң тешилишиға, еқип чиққан нефтьниң өтрап муһитни булғишиға елип келиши мүмкин. Мундақ шараитлар микроорганизмлар һәрикитиниң әкси тәрипини көрситиду. Микроорганизмларни пайдиланғанда биологиялик бузулуштин қоғдайдиған комплекслик стратегияләр ишлиши керәк. Әмәлиятта микроорганизмлар еһтияти түгимәйду. Микроблар хизмити интайин кәң вә хилму-хил, һәтта бәзидә чүшинишмү тәс. Микробларниң һәрбир түри нәқ шараитларға вә өз ара бағлинишиға қарап биологиялик турғудин өзини һәр түрлүк көрситиши мүмкин. Микроорганизмларниң һаятлиқ һәрикити тоғрилиқ билимни чоңқурлитип, уларниң экологиялик тәләплирини чүшиниш уларни сапалиқ пайдилинишниң йеңи йөнилишлирини ачиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Микроорганизмларға қандақ организмлар ятиду?
2. Микроорганизмларниң тәбиәттә атқуридиған роли қандақ?
3. Ишләпчиқиришта микроорганизмлар қандақ пайдилинилиду?
4. Йеза егилигидә микроорганизмлар қандақ пайдилинилиду?
5. Микробиологияниң тәрәққий етиши медицина утуклирида қандақ байқилиду?



Микробларни пайдилинишниң әкси тәрәплири қандақ чүшәндүрүлиду?



1. Микроорганизмлар тоғрилиқ дурус концепцияни таллаңлар:
 - а) барлиқ микроорганизмлар прокариотларға ятиду;
 - ә) микроорганизмлар һүжәйрилиқ организмлар болуп һесаплиниду;
 - б) барлиқ микроорганизмлар ағриқ пәйда қилғучи болуп һесаплиниду;
 - в) һаятлиқ үчүн қолайсиз шараитларда микроблар өлүп қалиду;
 - г) һаятлиқ үчүн керәклиқ шараит төвәнлигәндә бактерияләр спора түзиду;
 - ғ) микроорганизмлар спора түзүш арқилиқ көпийиду;
 - д) чечәк, туму, гепатит — бактерияләрдин пәйда болидиған ағриқлар;
 - е) туберкулез, холера, тамақтин оғилиниш — вируслуқ ағриқлар;
 - ж) микроорганизмлар озуклиниш усули бойичә гетеротрофларму, автотрофларму болуп һесаплиниду;
 - з) микроорганизмлар аддий иккигә бөлүнүш арқилиқ көпийиду;
 - и) бактериялик ағриқларға чечәк, холера, сальмонеллез, туберкулез ятиду.



Озуқ-түлүк мәнсулатлирини сақлаш үчүн бактерияләр билән күришиш усуллирини мисал кәлтүрүңлар.



Төвәндики аталғуларға ениқлима бериңлар:

Эпидемия —
Дезинфекцияләш —
Зәрәрсизләндүрүш —
Вакцинацияләш —



Параграф мавзусиға дискуссия уюштуруңлар.

§ 122. ПОЛИМЕРАЗЛИҚ ТИЗМИЛІҚ РЕАКЦИЯНИ (ПТР) ҚОЛЛИНИШ

Бу дәрістә:

- полимеразлиқ тизмилиқ реакцияни (ПТР) қоллинишни үгинисиләр;
- полимеразлиқ тизмилиқ реакцияниң таксономиядики, медицина билән криминали-стикидики әһмийитини тәрипләләйдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- полимеразлиқ тизмилиқ реакция тоғрилиқ силәр немә билисиләр?

Тирәк чүшәнчиләр:

- полимеразлиқ тизмилиқ реакция
- амплификация
- термофильлиқ ДНК-поли-мераза

1983-жили Кэрри Муллис тәклип қилған полимеразлиқ тизмилиқ реакцияниң (ПТР) усули XX әсирниң молекулярлиқ биология йөнилишидики асасий дәвирлиқ илмий йеңилиқ болди. Бу *in vitro* (пробирка ичидә) шараитида бирнәччә онлиғандин башлап бирнәччә йүзлигән жүп нуклеотидлардин тәркип тапқан ДНК бөлүмлиридә, матрица ретидә ДНК-ниң удул кәлгән үлгилирини пайдилинип мөхсус амплификация (ДНК көчәрмисиниң көпийиши) ясашқа иштәрди. Бир вақитларда пәқәт минимал мөлчәрдики мөхсус генлар елинидиған болса, һазир ПТР-ни пайдилиниш арқилиқ һәтта бир көчәрмидин бирнәччә саатта миллионлиған көчәрмини амплификацияләшкә, йәни көпәйтип елишқа болиду. ПТР усули көплигән аддий чарә-тәдбирләр үчүн һажәт болмақта, мәсилән: мөхсус ДНК фрагментлириниң клонлиниши, диагностика билән сот медицинисида генларни ениқлаш вә маслаштуруш, шунинң билән биллә генларниң экспрессиясиниң алаһидилигини тәтқиқат қилиш жәрияни охшаш иш-чариләрдә. Ахирқи вақитларда ПТР усули йеңи йөнилишләрдә тәтқиқат жүргүзүшкә мүмкинчилиқ бәрди, мәсилән: озуқ-түлүкниң аутентлиқлиғини назарәт қилиш, генетикилиқ модификацияләнгән ДНК-ни ениқлашқа беғишланған тәһлил қилиш яки микробиологиялиқ зәхмилинишни ениқлаш.

ПТР жүргүзүш үчүн амплификацияләнгән орунлардики нуклеотидлиқ рәтлик тоғрилиқ билиш керәк. Матрица ретидә удул кәлгән ДНК типини пайдилиниду. Усул тәтқиқат қилинидиған ДНК-ниң көп мөлчәрини керәк қилмайду, һәтта адәм бешидики бир тал чач, бир тамча қан яки сперма тәркивидики бир молекулиму йетәрлик болиду.

Усулни тәрәққий әттүрүштики утуқлар ейтарлиқ дәрижидә фермент ретидә бактериядин бөлүнидиған, иссиқ йәрләрдә тирикчилик қилидиған, шуңлашқа жуқури температуриларға тәзүмлүк термофильлиқ ДНК-полимеразиларни қоллинишқа бағлинишлиқ болди. Бу ферментни 1955-жили А.Корнберг ачқан. Бу ферментниң



217-сүрәт. Полимеразилик тизмилик реакция (ПТР) усули

артуқчилиғи жуқури температурада (оптимум 72—80°C) ишләш қабилыйитигә бағлиқ.

Бизни қизиқтуруп реакциялик қошулминиң ДНКсини елиш үчүн тәтқиқатқа елинған ДНК реакция субстратлири — 2 праймер, термотурақлиқ Tag-полимераза, 4-дезоксинуклеозидтрифосфат (дНТФ) магний иони́дин түзүлгән қурулуш карнизлири вә буфер ретидә пайдилилиду.

Полимеризацияниң бир цикли үч басқучтин ибарәт, (217-сүрәт):


— ериш: бу басқучта қошулмини 90—97°C температуригичә қиздуриду. Тәкшүрүлидиған икки тизмилик ДНК денатурациялинип, бир жипчилик шәкилгә алмишиду;

— гибридизация яки ДНК-ниң праймер билән көйдүрүлиши. Температурины 50—60°C-гә төвәнлитиш нәтижисидә праймерларниң матрицилик ДНК тизмилири билән комплементарлиқ бағлиниши вә һәрбир ДНК жипчисидә икки тизмилик бөләкләрниң пәйда болуши орун алиду;

— элонгация — матрицилик ДНК-ға комплементарлиқ ДНК жипчилириниң улиниши. Термофильлиқ полимераза 5' тин 3' қичә катализлиниду.

Шуниңдин кейин қайтидин ериш мәзгили башлиниду, бу вақитта температуриниң жуқурлиши нәтижисидә ДНК синтези тохтитилиду вә матрицилик ДНК билән йеңи синтезланған ДНК молекулилири араси-

¹Праймерлер — РНК-ниң қисқа фрагменти, ДНК молекулилириниң полимеразилик тизмилик синтезиниң депольаризацияси үчүн керәклик нуклеин кислотасиниң қисқа фрагменти (олигонуклеотид).



218-сүрәт. ПТР 3 тин 20 гичә цикл 10⁶ көчәрмисини тәминләйду

дики қош жипчилик бөлөк денатурациялиниду. Иккинчи вә униңдин кейинки циклларда праймерлар дәсләпки матрицилик ДНК билән вә мөлчәри геометриялик прогрессия билән өсидиған йеңи синтезлинған ДНК молекулиси билән гибридизациялиниду. Ахирқи шараитта ДНК синтези температура режиминиң өзгиришигә бағлиқ пүтмәйду, у — ДНК-полимераза амплификацияләнгән бөләкниң чегарисиға йәткәндә тохтайду, уни мәһсулатниң қатаң фиксацияләнгән нәқ бир нуклеотидқичә һесапланған өлчими ениқлайду.

Бу басқучларниң һәрқайсисиниң узақлиғи онлиған секундтин 1—3 минутқичә болған арилиқта, толук цикл бирдин бирнәччә минутқичә созулиду.

Тәрипләнгән амплификацияләнгән ДНК процедурисини автоматлиқ режимда циклизаторда яки термоциклларда, ДНК амплификатор әсваплирида орунлайду. Мундақ әсвап һажәтлик циклни беришкә вә оптимал вақитни, температурилик көрсәткүчләрни таллашқа мүмкинчилик бериду. 25—30 цикл ичидә синтезланған ДНК көчәрмиси бирнәччә миллионға йетиду.

ПТР ярдими билән керәклик мөлчәрдә мутациялири бар ДНК бөләклири көчәрмисини елишқа болиду, у арқилиқ вируслуқ, бактерия-лик ағриқлири бар бемарларға ДНК-диагностикисини ясашқа болиду. “Адәм геноми” хәлиқарилиқ программиси ПТР усулиниң алаһидә чапсан тәрәққий етишигә тәсир қилиду. Иш беришида моногенлик ағриқларниң тәрәққий етишигә тәсир қилғучи 923 ген хәритигә чүширилгән. Заманивий лазерлик технологияләрдә секвенирлаш пәйда болди (ДНК-ниң нуклеотидлик ретини ениқлаш). Бу өз новитидә түрлүк биологиялик объектларниң ДНК ретини қураштуридиған әхбаратлиқ факилар фондиниң өсүшигә тәсир қилиду.

Бүгүнки таңда һәрхил ПТР модификациялири тәклип қилинип, микроорганизмларни ениқлашқа беғишланған тест-системилар түзүш вә чекитлик мутацияләрни ениқлаш мүмкинчиликлири тәклип қилинди. Йеқин 2—3 жил арилиғида адәмдики патологиялик жәриянларниң пәйда болушиға сәвәпкар барлиқ генлар тәтқиқат қилиниду дәп күтүлмәктә. Бу көплигән ағриқларни ениқлаш вә давалашни йеңи басқучқа чиқиридиғанлиғи сөзсиз.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Полимеразилик тизмилик реакция чүшәнчисигә ениқлима бериңлар.
2. ПТР усулиниң артуқчилиғи немидә?
3. ПТР жүргүзүшкә керәклик шараит немә?
4. ДНК-ниң һажәтлик бөлигиниң көчәрмисини елиш үчүн қоллинилидиған реакциялик қошулма немидин тәркип тапиду?
5. Немишкә тизмилик реакцияниң ферменти ретидә бактериаллик термофильлик ДНК-полимераза пайдилинилиду?
6. Бир ПТР-ниң басқучини тәрипләңлар..



Адам иш-һәрикитиниң қандақ саһасида ПТР қоллинилиду?



Кәлтүрүлгән ениқлимиларни толуктуруп, дәптәргә көчирип йезиңлар.

— ДНК нуклеотидлик ретиниң йешилиши ... —

— толук яки йерим бәлгүлүк рәтлик ДНК фрагменти билән берилгән in vitro амплификациясиниң усули —

— ДНК тизмисиға қошумчә нуклеотидни қошидиған қисқа олигонуклеотидлик мадда —



Параграф мавзусиға презентация тәйярлаңлар.

§ 123. КРИМИНАЛИСТИКИДА, МЕДИЦИНИЛИҚ ДИАГНОСТИКИДА, АТИЛИҚНИ ЕНИҚЛАШТА, МУСТӘҚИЛ МЕДИЦИНИДА ПОЛИМЕРАЗИЛИҚ ТИЗМИЛИҚ РЕАКЦИЯНИҢ ӘҢМИЙИТИ

Бу дәристә:

- криминалистикида, медицинелиқ диагностикида, атилиқни ениқлашта, мустәқил медицинда полимеразилиқ тизмилиқ реакцияниң әһмийитини оқуп-үгинисиләр;
- полимеразилиқ тизмилиқ реакцияниң таксономиядики, медицина билән криминалистикидики әһмийитини тәрипләләйдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- ПТР ярдими билән қандақ генетикилик материал үлгисини қоллинип, жинайәтчини ениқлашқа болиду? Башқа диагностикилик усулларға қариғанда ПТР-ниң артуқчилиғи немидә?

Полимеразилиқ тизмилиқ реакция инсанийәт паалийнтиниң көплигән саһалирида тәһлил жүргүзүш үчүн вә илмий тәжрибиләрдә пайдилинилиду.

Криминалистикида ПТР “генетикиқ бармақ изини” селиштуруш үчүн пайдилинилиду. Жинайәт қилинған йәрдин генетикилик материал үлгиси — қан, шөлгәй, сперма, чач керәк болиду. Уни гуманлик адәмниң генетикилик материали билән селиштуриду. ДНК-ниң интайин аз мөлчәри, һәтта бир көчәрмисиму йетәрлик. ДНК-ни фрагментларға парчилайду, униңдин кейин ПТР ярдими билән амплификация ясайду. Фрагментларни ДНК электрофорези ярдими билән бөлиду. Елинған полоскиларниң сүритини *генетикилик бармақ* изи дөп атайду. ДНК-типирләшни сот медицинисиға киргүзүш көпчилиқниң қоллишиға егә болди, сәвәви униң ярдими билән қолға елинған адәмләрниң көпчилиқиниң улар әйипләнгән жинайәткә қатниши бар екәнлиги дәлилленди.

Тирәк чүшәнчиләр:

- генетикилик бармақ излири
- геномлуқ дактилоскопия
- ДНК-типирләш
- ПТР-диагностика
- Автоном медицина



219-сүрәт. ДНК электрофорез нәтижиси фрагментлири:

Ата; (2) бала; (3) ана.
Бала ата-аниниң бәзи
бир генетикилик
алаһидиликлирини елип, йеңи
алаһиде бөлгү шәкилләндүриду

ДНК-типирләш шуниң билән биллә бәзибир адаләтсиз әйипләнгән адәмләрниң ақлинишини тәминләйду. Сот тәҗрибисигә ДНК-типирләшни толук киргүзүш генетикилик материаллар мәлуматлириниң базисини ясашқа мүмкинчилик бәрди. Бу келәчәктә қилмиш ясалған йәрдин елинған генетикилик материални қисқа вақит ичидә мәлум бир җинайәтчиләр мәлуматлири билән селиштурушқа мүмкинчилик бериду (219-сүрәт).

ДНК-типирләш яки геномлуқ дактилоскопия — организмлар арисидики генетикилик пәриқләрни тепиш асасиға ятидиған идентификацияләш системи. Һәрбир җанлиқ һаятлиқ егиси генетикилик тәрипидин һәйран қаларлиқ де-йишкә болиду. ДНК-типирләш методлири ДНК нуклеотидлириниң интайин кичик генетикилик пәриқлирини рети билән ениқ-

лашқа беғишланған. Атилиқни ениқлашта икки шәхсий адәмниң охшашлиғини тепиш мәхситидә, уларниң ДНК үлгилири селиштурулиду.

ПТР-диагностика ахирқи вақитларда жуқумлуқ вә вируслуқ ағриқларға бағлиқ диагноз қоюшта келәчиги зор технология болуп һесаплиниду. ПТР усули билән диагностикилаш 30 жилдин ошуқ вақит қоллинилип кәлмәктә вә инфекцияни ениқлашниң бираз дәл усуллириниң бири болуп һесаплиниду. Шуниң билән биллә илимға көплигән ағриқ пәйда қилидиған микроорганизмларниң ДНК рети мәлум. Тәкшүрүлидиған патоген ретигә мас келидиған вә ДНК-ға мәлум арилиқта орунлашқан икки праймер ясашқа болиду. Униңдин кейин мошу праймерларни пайдилинип вә гель-электрофорезниң ярдими билән елинған мәһсулатларға тәһлил жүргүзсәк, у вақитта тәкшүрүлидиған үлгиниң шу вирусқа ятидиғанлиғи ениқланса, ДНК рети билән селиштурушқа беғишланған узунлуққа мас фрагмент али-миз. ПТР-ниң жуқури спецификаға егә экәнлиги тәкшүрүлидиған ма-териалда қозғиғучиниң пәқәт берилгән түригила хас ДНК фрагменти пәйда болиду.

Бактерияләрниң бир һүҗәйрисини яки вирусларниң бөлигини тәкшүрүп, ПТР-диагностика башқа — иммунологиялик, микроскопиялик, бактериологиялик усуллар билән ениқлаш мүмкин болмиған жуқумлуқ ағриқларни пәйда қилғучиларни ениқлайду.

Клиникилық тәжірибиде ПТР усули вируслық гепатит, кондилома, туберкулез, СПИД, салжа энцефалити (мейігә соғ тегиш), қизил, холера, хеликобактериоз, дифтерияни еніқлашта пат-пат пайдилини-лиду. ПТР ярдими билән жинис өзалириниң жуқумлуқ ағриқлирини еніқлашқиму болиду.

Уруқни анисиниң қосиғида зәхмиләйдиған көплигән микроорганизм-лар бар. ПТР-диагностикиси ана қосиғидики басқучтиму, йеңи туғулған сәбидиму инфекцияниң болушини нәқ еніқлашқа мүмкинчилик бериду.

Бәзидә дора бәзибир адәмләргә қеріқ билинип, аллергенлиқ тәсир қилиду. Бу дора-дәрмәкләрни организмниң қобул қилиши билән мад-да алмишишниң айрим пәриқлиригә бағлинишлиқ болиду. Мундақ айримчиликлар генетикилиқ дәрижидә еніқлиниду. Мәсилән, бир даваланғучида мәлум бир цитохром (натонуш нәсиллик маддиларниң мадда алмишишиға жавап беридиған белок) актив, иккинчисидә активлиғи төвән болуши мүмкин. Мошу даваланғучиниң цитохроминиң түри қандақ екәнлигини еніқлаш үчүн дора ичишниң алдида ПТР-диагностика жүргүзүш тәклип қилинди. Бу автономиялик медицина дөп атилиду, тәһлил қилиш болса алдин-ала генотиплаш дөп атилиду.

Башқа тәһлил қилиш усуллириниң алдида ПТР-диагностикисиниң артуқчилиқлири: инфекция пәйда қилғучиларни еніқлаш, усулниң жуқури спецификиси, жуқури сезимталлиқ, барлиқ шараитта қолли-нишқа болидиғанлиғи, нәтижиләрни елиш илдамлиғиниң тезлиғи, йошурун инфекцияни диагностикилаш болуп һесаплиниду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Криминалистикидики ПТР-ниң әһмийити қандақ?
2. Сот тәжірибисидә ПТР-ниң әһмийити қандақ?
3. ПТР ярдими билән атилиқ қандақ еніқлиниду?
4. Клиникилық медицининиң қандақ саһалирида ПТР қоллинилиду вә униң әһмийити қандақ?
5. Автономиялик медицина дегән немә?



Башқа тәһлил қилишларға қариғанда ПТР-ниң артуқчилиғи қандақ?



ПТР басқучлири — лаборатория шараитида диагностикилаш тоғрилиқ хәвәрлимә тәйярлаңлар.



ПТР усулиниң қандақла бомисун чәкләш яки камчилиқлири барму?



Параграф мавзуси бойичә презентация тәйярлаңлар.

§ 124. ГЕНЛАРНИ КЛОНЛАШТА, ДНК-НИ СЕКВЕНИРЛӘШТӨ, МУТАГЕНЕЗДА ПОЛИМЕРАЗИЛИК ТИЗМИЛИК РЕАКЦИЯНИҢ ӘҢМИЙИТИ

Бу дәристә:

- генларни клонлашта, ДНК-ни секвенирләштә, мутагенезда полимеразилик тизмилик реакцияниң әһмийитини оқуп үгинисиләр;
- полимеразилик тизмилик реакцияниң таксономиядики, медицина вә криминалистикадики әһмийитини тәрипләләйдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Генларни клонлаш бойичә силәр немә билисиләр? ДНК-ни секвенирләш чүшәнчиси немә билдүриду? Уни қандақ мәхсәттә қоллиниду?

Тирәк чүшәнчиләр:

- ДНК-ни клонлаш
- секвенирләш
- дидезоксинуклеотидлар
- мутагенез


Бизни қизиқтуридиған материалниң бир аз мөлчәрини елиш үчүн керәклик ДНК фрагментини ДНК векторлуқ молекулисиға (вектор) орунлаштуруп, ДНК-ни клонлайду. Вектор мошу рекомбинантни яки химерлик ДНК-ниң бактериялик һүжәйриләргә киришини тәминләйду. Векторлар ретидә плазмидларни, фагларни, аденовирусларни пайдилиниду. Көпинчә вектор ретидә плазмидлик ДНК қоллиниду.

Плазмидлар — көчәрмиси бактериялик һүжәйриләрдә һәр түрлүк мөлчәрдә болидиған кичиккинә үзүклүк икки тизмилик ДНК молекулири. Уларда һүжәйриләрдик мөлчәрини мәлум дәрижидә — бирнәччә бирликтин йүзлигән геномлар көчәрмисигичә тутуп туридиған репликацияни назарәт қилишниң автономиялик системиси болиду.

Клонлаш үчүн пайдилинидиған плазмидлик ДНК-ниң вә бизгә керәклик ДНК-ниң мәлум бөлигини рестриктаза билән парчилайдудә, рекомбинантлик ДНК-ни алиду, гибридлик плазмидлик үзүк түригә қайтуруиду вә бактериялик һүжәйригә киргүзиду — **бактерияни трансформацияләйду**. Трансформацияләнгән бактерияләр көпәйгәндә плазмидқа киргүзүлгән ДНК фрагментиниң көчәрмисиниң саниниң ешиши әмәлгә ашиду. Мошундақ бактерия үчүн натонуш нәсиллик генетикилик материал көп мөлчәрдә елиниши мүмкин. Натонуш нәсиллик организмға генни киргүзүшни, адәттә, мошу РНК-ниң мәһсулатини елиш яки көпинчә белок елиш үчүн пайдилиниду. Мошундақ мөлчәрдә йеза егилигидә, медицинида пайдилиниш үчүн көплигән белокларни алиду (220-сүрәт).

Клонлайдиған векторлар ретидә көпинчә фаг пайдилинилиду. Әгәр ДНК-ни эукариотлуқ һүжәйриләргә киргүзсә, у вақитта бу чарини **трансдукция** дөп атайду.

Клонлайдиған векторлар ретидә көпинчә фаг пайдилинилиду. Әгәр ДНК-ни эукариотлуқ һүжәйриләргә киргүзсә, у вақитта бу чарини **трансдукция** дөп атайду.



220-сүрәт. Геномни клонлашта ПТР

Секвенирләш яки дидезоксисеквенирләш дегинимиз ДНК-ниң дәсләпки тәркивини орнитиш болуп һесаплиниду.

Тәркивидә денатурацияләнгән бир тизмилик ДНК, ДНК-полимераза, дезоксинуклеозидтрифосфатлар (д-НТФ)-дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ бар, униң бири радиоактивлиқ болидиған реакциялик үлгидә вә праймер специфицилик дидезоксинуклеозидтрифосфатлар яки терминатор-

лар — ддАТФ, ддЦТФ, ддГТФ яки ддТТФ-ларның қатнишиши билән ДНК синтезини инициирләйду. Синтезлашни һәрқайсисиға реакциялик қошулма компонентлири билән биллә төрт ддНТФ-ның бирини қошуш арқилиқ төрт үлгидә бир мәзгилдә жүргүзидү.

ддНТФ өсүп келиватқан полинуклеотидлик тизмиға кириш үчүн шәкиллик НТФ билән бәс-бәскә чүшиду. Мас нуклеотид орниға ддНТФ киргүзгәндә ДНК синтези тохтайду. Нәтижидә пробиркиларның һәрбиридә тамғиланған ДНК ферментлириниң узунлуғи бойичә пәриқлинидиған ахирида бир спецификалик дидезоксинуклеотидлар жиғиндиси елиниду. Мошу фрагментларни электр зонисида 4 хошна полосада вә радиоавтографиядә бир вақитта бөлгәдин кейин синтезланған молекулилар өлчими ениқлиниши мүмкин. Бу дегән терминацияләйдиған дидезоксинуклеотидларның топлиниши ениқлиниши мүмкин экәнлигини билдүриду. Мошу мәлуматлар аса-сида қайтидин синтезланған фрагментларда ДНК-ға комплементарлик матрицида нуклеотидлар рәтликлигини орнитиду.

Һазирқи вақитта һәрхил флюорохромилар билән тамғиланған дидезоксинуклеотидларни пайдилинип, үлгиләрның көп мөлчәрини бир мәзгилдә автоматлик түрдә секвенирләш үчүн қураллар ясалмақта.

ПТР-ни пайдилиниш арқилиқ мутагенез жүргүзүш — ДНК-ның нуклеотидлик ретигә өзгиришләр киргүзүш болуп һесаплиниду. Биотехнологиядә бактерияләрның бираз һосулдар штаммлирини елиш үчүн қоллиниду. ПТР пайдилиниш мутагенез жүргүзүш чарилирини тезлитишкә, сәрәмжанлашқа, шуның билән биллә уни бираз ишәшлик вә һосулдар қилишқа мүмкинчилик беридү.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. ДНК-ни клонлаш дегинимиз немә?
2. ДНК-ни клонлаш вақтида вектор ретидә немә қоллинилиду?
3. Рекомбинантлик ДНК дегән немә?
4. ДНК-ни клонлаш әмәлиятта қәйәрдә қоллинилиду?
5. ПТР-ни пайдилиниш арқилиқ жүргүзүлгән мутагенезниң әһмийити неמידә?



Секвенирләш дегән немә?



Аталғу билән уларның ениқлимилири арасидики маслишишни орнитиңлар.

№	Ениқлимиси	Терминлар	
1	2	3	
А	ДНК-ның дәсләпки тәркивини орнитиш	1	Геномлуқ дактилоскопия
Ә	ДНК бактериялириниң қисқа кесин-дилири	2	ДНК-ни клонлаш

Давами

1	2	3	4
Б	ДНК-нің керәклик фрагментини ДНК-нің векторлуқ молекулисиға киргүзүш вә рекомбинантлик ДНК елиш	3	Плазмидлар
В	ДНК-нің тәкшүрилидиған фрагмент-лириниң көчәрмилирини сан жәһәттин ашуруш	4	Мустәқил медицина
Г	Организмниң дора препаратлирини қобул қилишиға айрим ПТР-тәһлил	5	Мутагенез
Ғ	ДНК-ни парчилайдиған ферментлар	6	Секвенирләш
Д	Бактерия һүжәйрисигә рекомбинантлик ДНК-нің киришини тәминләйдиған ДНК молекулиси	7	Вектор
Е	Генлик дәрижидә организмлар ари-сидики пәриқни ениқлаш үчүн иден-тификацияләш системиси	8	Амплификацияләш

§ 125. ГЕНЛИҚ-ИНЖЕНЕРИЯЛИК МАНИПУЛЯЦИЯ БАСҚУЧЛИРИ

Бу дәристә:

- генлик-инженериялик манипуляция басқучлирини оқуп үгинисиләр;
- генлик-инженериялик манипуляцияләшнің басқучлирини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Генлик-инженериялик технология дегән немә?

1972-жили һәрхил молекулилар ДНК-си фрагментлиридин бактериаллик, фаглик вә вируслик түзүлгән *in vitro* рекомбинантлик ДНК елинғанлиғи тоғрилиқ биринчи мақалә йорук көрди. Ишни орунлиған америкилик алим Пол Берг вә кәсипдашлири молекулярлик биологияниң йеңи йөнилиши — генетикилик (генной) инженерияниң ечилиши билән алаһидиләнди.

Генлик инженерия — һүжәйриниң бөлгүлүк хусусийити бар генетикилик материалыниң мәхсәтлик рәвиштә алмишиши, уни башқа һүжәйригә киргүзүш, шундақ қилип көпийиш вә мадда алмишиш жәрияниниң өзгириши.

Генлик инженерия ярдими билән мәлум мәхсәттә һәрхил организмларниң нәсилдарлик әхбаратини өзгәртишкә болиду, униң үчүн геномлирини алдин-ала бөлгүләнгән рәт билән қайта қуруш керәк.

Тирәк чүшәнчиләр:

- генлик инженерия
- рекомбинантлик ДНК
- вектор
- рестриктаза
- лигаза
- трансгенез
- плазмидлар

Генлик инженерия — бу махсатлик функционаллик актив генетикилик түзүлүшнүн рекомбинантлик ДНК молекулиси асасида өзгириши.

Генлик инженерия асаси — бир организмдин генларни бөлөк елиш вэ уларни векторлар ярдими билэн башка организмларга алмаштуруш. Бу жериян рестриктаза вэ лигаза ферментлиринин ечилишига вэ төвөнки биологиялик объектларнун табий репликациялирини — вирусларни, плазмид прокариотни пайдилиниш бойиче мүмкин болди. Рестриктаза ферменти ДНК молекулилирини нөк еникланган рестрикция сайтлири деп атилидиган орунлири бойиче бөлөклөргө бөлиду, лигаза ферменти болса гетерогенлик ДНК фрагментлирини бир пүтүн система қилип қошуп тикиду. Төркивидө келип чиқиши һөртүрлүк ДНК-си бар молекула рекомбинантлик деп атилиду.

Рекомбинантлик ДНК = прокариот яки вируслар ДНК-си + эукариот ДНК-си
(вектор) (натонуш ДНК)

Шөкиллөнгөн рекомбинантлик ДНК тирик һүжәйригә киргүзүлгөн вэ һүжәйринин йеңи генида экспрессия башлангандин кейин рекомбинантлик белок синтези башлиниду. Нәтижидө йеңи бөлгүлири бар организм пайда болиду. Мундак организм трансгенлик яки трансформациялик деп атилиду, сөвөви мундак организмнун өзгириш жерияни вэ йеңи қабилитинин пайда болуши трансформация деп атилиду. Генларнун алмишишини орунлаш үчүн (яки трансгенез) төвөндики мүрөккөп операцияләрни орунлаш керөк:

Махсус генетикилик конструкцияләрни (векторларни) түзүш, уларнун төркивидики тамғиланган генлар башка түрнун гени билэн киргүзүлидиган болиду. Мундак конструкцияләр геннун ишлишигә һажәтлик шараитларда түзүлүши керөк (промоторлар, терминаторлар) вэ “репортер” генлар уларнун алмишиши әмәлгә ашқинини хәвәрләйду;

Генетикилик векторларни биринчи һүжәйригә киргүзүш, унундин кейин башка түрнун геномига киргүзүш вэ өзгәртилгөн һүжәйриләрни туташ организм қилип өстүрүш.

Генлик инженерия усули арқилик селекция үчүн баһалик йеңи өсүмлүкләр түри елинди.

Тәбиәттә эндотоксин белогини ишләп чиқарғучи *Bacillus thuringiensis* бактерияси бар. Йеза егилиги өсүмлүклиринин зиянкәш һашарәтлиринин ашқазинига бу бактерияләр чүшкәндө эндотоксин ашқазаннун бузулушини пайда қилидудө, һашарәтнун һаятини тохтитиду. Белокларнун мундак хусусийитини генетик инженерлар һашарәтләргә чидамлик өсүмлүкләрни өсүрүштә қоллиниш керөк дегән қарар қобул қилган. Улар бактериаллик һүжәйриләрдин эндотоксинни кодлиғучи ген бөлүп елип вэ топа бактериялири *Agrobacterium tumefaciens* һүжәйриси төркивидө бар плазмиднун, йәни табий генетикилик векторлар төркивигә киргүзди. Бу бактерияләр билэн озуклук муһитта өстүрүлгөн өсүмлүк тоқулмилиринин бөлөклири

зәхмиләнгән еди. Бираз вақиттин кейин белок гени — токсинни тошиғучи плазмидлар өсүмлүк һүжәйрисигә киргүзүлди, ген өсүмлүк ДНК-сигә киргүзүлди. Шуниндин кейин өсүмлүк тоқулмисиниң бөләклирини йетилгән өсүмлүкләрниң өсүши билән тәрәққий етишини тәминләйдиған тәркип башқа озуклуқ муһитқа алмаштурулди. Мундақ өсүмлүкләрниң йопурмақлири билән озукланған һашарәтләрниң гусе-ницилири өлди. Әһмийити токсин һашарәтләр үчүн ховуплуқ, адәмләр билән жаниварлар үчүн зиянсиз екәнлиги ениқланди.

Генлиқ инженерияниң тәрәққий етиши теһи алдимизда. Шундиму мундақ тәтқиқатлар интайин пәхәслик билән жүргүзүлүши керәк. Киргүзүлгән генотипи өзгәргән организмлар ишләпчиқиришқа чүшмәй туруп, узақ мүддәтлик назарәттин өтүши һажәт.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Генлиқ инженерия чүшәнчисигә ениқлима бериңлар.
2. Генлиқ инженериягә қандақ тәтқиқатлар асас болди?
3. Қандақ операцияләр нәтижисидә рекомбинантлиқ ДНК пәйда болиду?



Генлиқ-инженериялик ишларниң мәхсити немә?



Өсүмлүкләрни тәтқиқат қилиштики генлиқ инженерияниң утуқлири тоғрилиқ хәвәрлимә тәйярлаңлар.

§ 126. ГЕНЕТИКИЛИҚ ИНЖЕНЕРИЯНИҢ ӘҺМИЙИТИ

Бу дәристә:

- генлиқ инженерияниң әһмийитини оқуп үгинисиләр;
- генлиқ инженериялик манипуляцияләшниң басқучлирини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

Силәр биләмсиләр?

- Генетикилик инженерияни қоллиниш арқилиқ қандақ утуқларға қол йәткүзүшкә болиду? Генлиқ инженерияниң усуллири арқилиқ ағриқларни давалашқа боламду?

Генетикилик инженерия — биохимия билән молекулилик генетика усуллириниң жиғиндиси, уларниң ярдими билән һәрқандақ организмларниң мәхсәтлик рәвиштә генетикилик апаратыни комбинацияләшкә болиду. Генетикилик инженерия бир-биридин таксономлуқ жиһақ орунлашқан түрләр арасида генетикилик әхбарат алмаштурушқа йол бәрмәйдиған тәбиий түр арилиқ тосалғуларни йоқ қилишқа вә тәбиәттә учрашмайдиған генлар жиғиндиси бар, йеңи

Тирәк чүшәнчиләр:

- генлиқ инженерия
- генотерапия
- һүжәйрә

хусусийәтлири ирсийәтлинидиған һүжәйриләр билән организмлар ясашқа мүмкинчилик бериду.

Шуниң билән биллә адәмниң ирсийәтлик ағриқлирини давалайду.

Генлик инженерия — генларниң түзүлүшини өзгәртишкә яки организмға мәлум функцияләр жүкләнгән нәтонуш генларни киргүзүшкә ярдәмлишидиған технология (221-сүрәт).

Дәсләпки қетим генотерапияни клиникилик тәжрибидә утүқлүк пайдилиниш 1990-жили АҚШта әмәлгә ашурулди. Генлик камчилиқ билән бағлинишлиқ комбинациялик иммунодефициттин еғир зәрдап чәккән балиға зәхмиләнмигән генниң көчәрмиси киргүзүлди. Бемарниң ағриқ һүжәйрисидин (қанниң Т-лимфоцити) елинип, әйнәк пробиркида өсүрүлди, ретровируслүк вектор ярдими билән зәхмиләнмигән ген аденозиндезаминазилири киргүзүлүп, һүжәйрә бемарға қайта орунлаштурулди.

Генлик-инженериялик усул билән давалашта яхши көрсәткүчләргә қол йәткүзүшкә болидиған ағриқларниң топлириға лизосомлүк ағриқлар ятиду.

Бүгүнки күндә тәхминән 10 ағриқни трансгеназа ярдими билән давалашқа болиду.

Генлик инженерияниң әһмийәтлик тәжрибилик утуғиға диагностикилик препаратларни ясаш ятиду. Бүгүнки күндә медицинилик тәжрибигә 200 дин ошүқ йеңи диагностикумлар қошулған.


Генетикилик инженерияниң усуллирини генетика билән биология илимлириниң мәсилилирини тәтқиқат қилиш үчүн қоллиниду.

Бир қатар йеңи методикилик усулларниң тәрәққий етиши һүжәйрилиқ дәрижидики генетикилик инженерияниң мүмкинчиликлирини кәңәйт-

ти. Сомилиқ һүжәйриләрниң гибри-
зация усули йетәкчи роль атқуриду.

1960-жили Ж.Барский һайванатларниң сомилиқ һүжәйрилиридә һәр икки ата-аниниң һүжәйрилириниң генетикилик әхбаратлири қошулуп, бирикишкә қабилйәтлик екәнлигини көрсәтти. 1965-жили Г.Харрис ультра бенәпшә рәң шола билән инактивацияләнгән, тәркивидә РНК болидиған Сендай типлиқ паргрипп вирусини һүжәйрә қошулмисиға қошқанда сомилиқ һүжәйриләрниң гибризация чапсанлиғиниң тез арида ашқанлиғини ениқлиди.

Вирус бөләклириниң тәсиридин һүжәйриләр өз ара йепишип, нәтижисидә бир-бири билән қошулиду. Мундақ




221-сүрәт. Генлик инженерия

шарайтта келип чиқиши бир-биридин жирақ шәкилләр арасида һүжәйриләр гибризацияси маңидиғанлиғи ениқланди. Мәсилән, тулум чашқан билән чашқан, адәмниң адәттики һүжәйриси билән ач һүжәйриси арасида (222-сүрәт).


Һүжәйриләрниң бир-биригә қошулуши бойичә тәҗрибиләр өсүмлүкләрдә жүргүзүлди. Өсүмлүк һүжәйрисиниң протопластини елиш мүмкинчилиги туғулди, униң үчүн мезофилл һүжәйрилирини гипертониялик муһитта пектиназа вә целлюлоза ферментлири билән қайта ишләйду, бу йопурмақниң бағлаштурғучи бөлүмлири билән һүжәйрә қеписиға тәсир қилиду.

Гипертониялик муһитта өсүмлүк һүжәйрисиниң протопластини йешил сферилик түзүлмә болуп көрүниду, у сиртки муһиттин пәқәт цитоплазмилик мембрана арқилиқ бөлүнгән. Бу модель өсүмлүк генетикисини тәтқиқат қилиш үчүн әҗайип материал ретидә алимларниң диққитини өзигә бирдин җәлип қилди. Тоқумиларни өстүрүш чәтләштүрүлгән протопластларни өстүрүштин көп бурун ечилған болсиму, ахирқи модельниң бесимчилиғи очуқ. Протопластлар жуқури сапа билән Петри тавақчисида клонлиниши мүмкин, бу өсүмлүкләр селекциясигә микроорганизмлар генетикисиниң усуллирини қоллинишқа йол ачти. Бәзибир өсүмлүк түрлири (тамака, сәвзә, помидор в.б.) бөлүнүп елинған протопластиниң һүжәйрә қеписи өз қелиписиға келип, каллус түзгәндин кейин туташ өсүмлүкниң шәкиллиниши мүмкин (223-сүрәт).

Һайванатлар һүжәйриси охшаш һалсизландурулған (инактивландурулған) Сеид вируси билән қайта ишләнгән өсүмлүк һүжәйрисиниң протопластиму қошулуш қабилиитигә егә болиду. Бу шарайтта индуктор ретидә азот кислотаси натрий, полиэтиленгликоль вә башқиму қошулмилар қоллинилиду. Бирақ өсүмлүк моделиниң һайванатлардин пәрқи — гибризациягә қатнашқан икки индивидумниң бир протопластқа қошулушидин атилиқ-анилик бөлгүлириниң жиғиндиси бар туташ өсүмлүкни клонлаш мүмкинчилигиниң болушида. Һәрхил



222-сүрәт. Сомилик һүжәйриләрниң гибризацияси



223-сүрәт. Каллус түзүлүшү. Туташ өсүмлүкнүн шөкиллиниши

бир һүжәйриниң ядросини иккинчисигә алмаштуруп, һәрхил тәрәққий етиш басқучида икки яки бирнәччә уруқниң (эмбрионларниң) қошулушини тәминләйду, уларниң санини икки яки униңдинму көп қилип бөлүш, уруққа (эмбрионға) натонуш һүжәйриләрни қошуш мүмкин болди.

Организмлик дәрижидики генетикилик инженерия үчүн аллофенлик чашқан елиш чоң қизиқиш пәйда қилди, йәни һәрхил ата-анилик һүжәйрә тоқумилиридин елинған генотипи һәрхил индивидларни елиш. Мундақ генотипни һәрхил сападики тоқумиси бар индивидларниң тәрәққий етиш басқучиға интайин өтигән арилашқан вақитта пәйда болиду. Йеңи туғулған чашқан аллофенлик болуп һесаплиниду, униң тенидә һәрхил ата-анилик тоқумилар болиду, бу уларниң фенотипини бириктүриду. Аллофенлик индивидларни үч, төрт вә униңдинму көп атилиқ-анилиқлардин елишқа болиду. Аллофенлик чашқанлар һәтта гистологиялик жәһәттин мас кәлмәйдиған атилиқ-анилиқлардин қураштурулған, улар иммунлик бузулушсиз бирхил тәрәққий етиду. Бу иммунлик тәзүмлүк (толерантлик) һайванат генотипиниң көрүнүшила әмәс, у тәрәққиятниң нәтижиси болуп һесаплиниду.

Ядросиз тухум һүжәйрилиригә сомилиқ һүжәйриләрниң ядролирини киргүзүш чоң планларға йол ачиду. 1962-жили Дж.Гердон *Xenopus laevis* амфибиялиригә ясиған тәжрибисидә ишт белиқларниң үчәй эпителий һүжәйрилиридин елинған ядрони ядроси ультра бенәпшә рәң шолилири билән йоқ қилинған тухум һүжәйрисигә қошқанда, толук тәрәққий өткән индивидларниң пәйда болидиғанлиғини көрсәтти.

Ядросиз тухум һүжәйрисигә сомилиқ һүжәйриләрниң ядросини алмаштурған вақиттики усуллар генотиплири охшаш индивидлардин клон елиш усуллириға охшайду. Бу усулларни сүт әмгүчиләргә

түрләрниң һүжәйрилириниң қошулуши вақтида сомилиқ гибридлар елиниду. Өсүмлүк һүжәйрисиниң генетикилик инженерияси үчүн бу усуллар чоң келәчәккә йол ачиду.

Һүжәйрилиқ вә организмлик дәрижиләр зич өз ара бағлинишлиқ. Һазирқи вақитта әйнәк пробиркида сүт әмгүчиләр билән адәмниң тухум һүжәйрисини ясалма уруқландуруш вә мошу шараитта уруқ өсүрүлүши усуллири тез жүрәт билән тәтқиқат қилинмақта. Һайванатлар һүжәйрисигә ясилидиған модельлик тәжрибиләр арқилиқ

қоллинишнің тәжірибилик әһмийити зор. Қара мал, қой в.б. һайванларның падилик популяциясидә һосулдарлығы алаһидә жуқури, әжайип генотиплик һайванатлар учришиду, улар: сүтлүк, жуңи қелин вә узун в.б. Селекция усуллирини қолланғанда уларның генотиплири бөлүнгәнликтин, барлиқ хусусийәтлири толуги билән әвлатқа берилмәйду. Сомилик һүжәйрә ядролирини алмаштуруш арқилиқ индивидларни клонлаш, бир һайванаттин чәксиз мөлчәрдә сомилик һүжәйрә ядросини елиш мүмкинчилигини һесапқа алғанда, ядросиз тухум һүжәйрилири йеза егилиги һосулдарлығының интайин чоң мөлчәрдә ешишиға йол ачар еди.

Сүт әмгүчиләрниң һүжәйрилирини реконструкцияләш (қайта қуруш) усули арқилиқ һәрхил организмлардин елинған ядро билән цитоплазмани қошуш сомилик һүжәйриләр дәрижисидә ядро билән цитоплазманиң өз ара бағлинишини тәтқиқат қилиш үчүн йеңи мүмкинчиликләр пәйда қилиду. Цитохалазиннің қатнишиши билән һүжәйриләр ядро (кариопласт) билән цитоплазмаға (цитопласт) бөлүниду. Инактивацияләнгән Сейдай вируси ярдими билән Н-тимидин билән тағиланған кариопласт цитопластқа қошулған. Мошу йол билән реконструкцияләнгән (қайта қурулған) һүжәйриләр көпийәләйду.

Микрохирургия усуллири билән тухум һүжәйрисини қайта ишләш сүт әмгүчиләрни клонлашқа мүмкинчилик бериду. Уруқланған тухум һүжәйрисидин бир пронуклеусни елип ташлаш қалған гаплоидлик пронуклеусның геноми базисидә тәрәққий етишкә шараит яритиду. Хромосомилар жиғиндиси икки һәссиләнгәндин кейин толук гомозиготилиқ индивидлар пәйда болиду. Мундақ индивидлар пәқәт анилиқлар болуши мүмкин, сәвәви жинис хромосомилири ҮҮ болидиған индивидлар тирикчилик ясимайду, адәттә, елинған клонлар жинислиқ түрдә көпийәлмәйду.

Клонлаш уруқланған тухум һүжәйрисидин атилиқ пронуклеусни елип ташлаш процедурисини қайтилиғандила мүмкин болиду. Бу процедуриларни әвлатларда тәкрарлаш арқилиқ генотиплири бирдәк, һәқиқий гомозиготилиқ, дәсләпки анилиқ геном генотипини қайтилайдиған индивидлар топини елип, мошу арқилиқ сүт әмгүчиләр индивидлириниң клонлирини ясашқа болиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Генетикалық инженерия — бу
2. Клиникалық тәжірибидә дәсләп қоллинилған генотерапияни тәрипләңлар.
3. Сомилик һүжәйриләрниң гибридизация усуллириниң әһмийити қандақ?
4. Бу усуллариниң һайванатларда қоллинилишини ейтип бериңлар.
5. Бу усуллар өсүмлүкләрдә қандақ жүргүзүлиду?
6. Аллофенлик чашқанларни қандақ елишқа болиду?



Тухум һүжәйрилиригә жүргүзүлидигән микрохирургия усулини тәрипләңлар.



1. Генлик инженерияниң әһмийитини тәрипләңлар.
2. Немишкә молекулярлик биологияниң утуклири генлик инженерияниң тәрәққиятида әһмийәтлик роль ойнайду дәп ойлайсиләр?
3. Генлик инженериягә мисал кәлтүрүңлар..



1. Адәм интерферониниң синтезига жавап беридигән ДНК бөлигиниң транскрипцияси вақтида УУЦАААГАУГЦ түзүлүши бар а-РНК молекулиси пәйда болди. Интерферон ишләп чиқириш үчүн үчәй таяқчисиниң ДНК-си кириштүрүшкә һажәтлик ДНК молекулисиниң тәркивини ениқлаңлар. Белокниң мошу бөлиги қандақ аминокислоталиридин пәйда болиду? Магнитлик тахтида белок тизмисини ясаңлар.
2. Инсулиндики дәсләпки 5 аминокислота: фенилаланин-валин-аспарагин кислотаси-глутамин кислотаси-гистидин. Үчәй таяқчисиниң ДНК-синиң ГАГТГТТГАГ-ГЦЦАЦЦТГАТГАГЦ тәркиви бар халиған бөлигини бактерияләргә инсулинни ишләп чиқиришкә мүмкинчилик беридигән ДНК молекулисиниң бөлигигә алмаштуруңлар.



Һазирқи заман утуклириниң қандақ аспектилири генлик инженерияниң тәрәққий етишигә тәсир қилиду? Генлик инженерияниң утуклири бизгә немә бериду?

Билгәнгә — маржан!

Биотехнологиялар ярдими билән өстүрүлгән һайванатлар аддий һайванатлардин пәриқлинидигән болса, пәқәт яхши тәрипигә қарап болуши мүмкин: клонлаш билән генлик инженерия — йеңи сүнъий чиқириш үчүн йәнә бир қурал, буниң билән адәмләр миңлиған жиллар бойи шуғуланған, генетика асаслириға асаслинип шуғуланғанлиғига йүз жилдәк вақит болди.

§ 127. ГЕНЛИҚ МОДИФИКАЦИЯЛӘНГӘН ОРГАНИЗМЛАРНИ ҚОЛЛИНИШНИҢ ИЖАБИЙ ВӘ СӘЛБИЙ ТӘРӘПЛИРИ

Бу дәристә:

- генлик модификацияләнгән организмларни қоллинишниң ижабий вә сәлбий тәрәплирини оқуп үгинисиләр;
- генлик модификацияләнгән организмларни қоллинишниң этикилик соаллирини тәһлил қилишни үгинисиләр.

Силәр биләмсиләр?

- модификацияләнгән организмлар тоғрилиқ немә билисиләр? Ейтип бериңлар.

Тирәк чүшәнчиләр:

- *трансгенлик организмлар*
- *генетикилик модификацияләнгән таамлар*

Генлик модификацияләнгән организмлар (ГМО) — организмға йеңи хусусийәтләрни бериш үчүн генлик инженерия усуллирини қоллиниш арқилиқ генотипи өзгәргән организмлар. Колорадо қоңғузи йемәйдиған яңию, соққа чидамлик помидор, оғилиқ химикатларға сезимталлиғи йоқ

көмүқонақ — буларның һәммиси генетикилик модификацияләнгән организмлар. ГМО (яки трансгенлик организмлар) — бурун тәбиәттә яшимиған, генетикилик кодни өзгәртиш нәтижисидә ишләп чиқирилған өсүмлүкләр билән һайванатлар. Бүгүнки таңда 100 вә униңдин көп ГМО йеписқ лабораторияләр билән биллә дуқанлар билән базарларда учришиду. Дәсләпки трансгенлик мөһсулатлар 80-жилларның ахирида “Монсанто” намлиқ Мәркизий америкилик компаниядә ишләп чиқирилди вә һазир дунияда көң түрдә таралди. Селекцияның бу йөнилишини яқлиғучиларму, қарши чиққучиларму бар. ГМО-ни пайдилинишның яхши тәрәплири — генетикилик модификацияләнгән мөһсулатлар ишләпчиқириш проблемилрини йешиду, сәвәви улар көплигән йеңи қабилыйәтләргә егә: пестицидларға тәзүмлүк, зиянкәш һашарәтләрдин қоғдинишқа қабилыйәтлик, соққа вә сусизлиққа тәзүмлүк, йемишлири узақ вақит сақлиниду. Шунинң билән биллә адәм вә қушларға, һашарәтләргә зиянлик тәсир қилидиған химиявий инсектицидларни қошушқа болған еһтияжның йоқ болуши. Молекулярлик биологлар үзүмгә брокколи капустаһиниң явайи шараитта өсидиған туққинидин соққа чидамлик генини қошти. Соққа чидамлик сортни елиш бир жилның ичидә мүмкин болди. Адәттә, үзүмның йеңи сортни елиш 25—35 жил вақитни тәләп қилиду, әнъәнивий усулларда үзүмның уруқдиши әмәс башқа өсүмлүкның генини алмаштуруш мүмкин әмәсти. Шунинң билән биллә алаһидә геномодификацияләнгән, көп һосул берип, аз озуқ тәләп қилидиған, ағриқларға тәзүмлүк һайванат түрлирини чиқиришқа болиду.

Генлик инженерияның тәжрибидики утуқлириниң ичидә әң муһимлириниң бири биологиялик актив белок-инсулин продуцентини, интерферонлуқ өсүш гормонини ишләп чиқириш болуп һесаплиниду. Мадада алмишишни активлаштуруш усулларини тәрәққий өттүрүш төвәндики молекулярлик биологиялик актив қошулмиларның пәйда болуши билән бевасигә бағлинишлиқ, нәтижидә генетика билән селекцияның әнъәнивий усулларини арқилиқ ишләп чиқирилған продуцентлардин пайдилиқ антибиотиклар, аминокислоталар, витаминлар қатарини ишләп чиқирилди. Гепатит, грипп, ишшиққа қарши таза белоклуқ вакцинилар ишләп чиқириш йоллири тәйярланмақта. Интайин тез сүрәт билән ирсийәтлинидиған, көп амиллик вә инфекциялик ағриқларни соматикилиқ һүжәйриләргә генлик чәтнәшләрни түзәйдиған яки һүжәйриләргә йеңи хизмәт атқурушқа мүмкинчилиқ беридиған генларни қошуш арқилиқ давалаш — генлик терапия тәрәққий етишкә башлиди. ГМО мөһсулатлири медицинада жуқури тәсир қилиши бар вакцинилар ишләп чиқиришта қоллинилиду. Мәсилән, һәрхил өсүмлүк тозаңлириға болған аллергиялик реакциядин қоғдайдиған вакцинилар үчүн. Униң актив қошулмиси ретидә ГМО белогини қоллинилиду.



224-сүрөт. Көмүконак мутанти коллекцияси

Генлик инженерия инсанийет үчүн чоң мүмкинчиликлөргө йол ачти. Шундиму, ховуп һәр дайим болиду. Генлик инженерияниң йеңилиқлири адәмгә қарши қурал болушиму мүмкин. Уни утуқлуқ пайдилинишни билиш — бу һүнәр. Орни толмас хаталикқа урунмаслик үчүн мошу һүнәрни өzlөштүрүш һажәт.

ГМО-ға қарши мутәхәссисләрниң ейтишичә, генетикилик модификацияләнгән организмлар аллергиялик ағриқлар, антибиотикларға төзүмлүк ашқазан микрофлорисиниң пәйда болуши охшаш ховуплар туғдуриду. Генетиклар жанлик организмларниң геномиға тәсир қилиш өзгиришсиз болуши мүмкин әмәслигини иқрар қилиду, сәвәви ДНК молекулисида һәрбир ген бирнәрсигә жавап бериду. Униң келәчәктә инсанийет үчүн қандақ тәсири болидиғанлигини молжалап билиш қийин. ГМО-ға қарши чиққучиларниң йәнә бир ховупи — генларни манипуляцияләш келәчәктә ГМО өсүмлүклири өстүрүлгән орунларда һашарәтләрниң пүтүнләй бир топлириниң йоқ болушиға елип келиши мүмкин. У өз новитидә йеңи мутантлик өсүмлүкләр билән һашарәтләрниң пәйда болушиға вә топиниң булғинип, биологиялик түрләрниң көпчилигиниң йоқилишиға тәсир қилиду (224-сүрәт).

ГМО зиянлик экәнлигини кесип һечким ейталмайду. Көп шараитларда “ховуплуқ болуши мүмкин” аталғуси қоллинилиду. ГМО-ниң зиянлик экәнлигини ейтиш үчүн узақ вақитлик көплигән тәжрибиләр билән тәтқиқатлар жүргүзүш керәк. ГМО мөһсулатлириниң тәсирини тәтқиқат қилиш үчүн 50 вә униңдин көп жил һажәт болиду. Бу аз вақит әмәс. ГМО мөһсулатлириниң асасий камчилиғи — униң организмға узақ вақит қолланғандики тәсири ениқланмиған.

Илим дуниясида ГМО-ниң зиянсиз экәнлигини дәлилләйдиған һәқиқий көзқарашниң, таам тәркивидә генетикилик модификацияләнгән белокларниң тәркиви тоғрилиқ көрсәткүч баһа беридиған лабораторияләрниң, толук бәкитилгән усуллириниң йоқ болушиға бағлиқ трансгенлик таамларни пайдилиниш яки пайдиланмаслиғини һәрким өзи таллаш керәк.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Генетикилик модификацияләнгән организмлар чүшәнчисигә ениқлима бериңлар.
2. Генлик инженерияни йеза егилигидә пайдилинишниң пайдилик тәрәплиригә мисал кәлтүрүңлар.
3. Генлик инженерияниң утуқлири медицинада қанадақ қоллинилиду?



Инсанийәт үчүн генлик инженерияниң зиянлик тәрәплирини атаңлар. Тәриплимә бериңлар.



Қошумчә әхбарат мәнбәлирини пайдилинип, хәлиқара әмәлиятта ГМОни рәтләшниң асасий усуллирини чүшәндүрүп көрүңлар.



1. “ГМОниң ижабий вә сәлбий тәрәплири” мавзусида икки топқа бөлүнүп, дискуссия уюштуруңлар.
2. “ГМОниң ижабий вә сәлбий тәрәплири” пикир-талиши.
Пикир-талашқа беғишланған соаллар:
 1. ГМОси бар озук-түлүкләр зиянликму?
 2. ГМОси бар озук-түлүкләр хәтәрлик ишшиқлар пәйда қиламду?
 3. ГМОси бар озук-түлүкләр мутациягә әкеләмду?
 4. ГМОси бар озук-түлүкләр исләп чиқириш санаитини мәнй қилиш керәкму?

§ 128. ГЕНЛИҚ МОДИФИКАЦИЯЛӘНГӘН ОРГАНИЗМЛАРНИ ҚОЛЛИНИШНИҢ ЭТИКИЛИҚ МӘСИЛИЛИРИ (СОАЛЛИРИ)

Бу дәристә:

- генлик модификацияләнгән организмларни қоллинишниң этикилик соаллирини оқуп үгүнисиләр;
- генлик модификацияләнгән организмларни қоллинишниң этикилик соаллирини музакирә қилишни оқуп билисиләр.


Силәр биләмсиләр?

- ГМО дегән немә? ГМОға сениң көзқаришиң қандақ?

Тирәк чүшәнчиләр:

- ГМО

“Генлик модификацияләнгән организмлар” яки қисқартилған ГМО чүшүниги генлик инженерия манипуляция ярдими билән жанлик организмларниң бәзибир пайдилик хусусийәтлирини ашуруш дегән мәнани билдүриду. Мәсилән, өсүмлүкләр тәркивигә зиянкәшләргә, гербидцитларға вә өсүшкә әкси тәсир қилидиған ташқи муһитниң қолайсиз шараитлириға тәзүмлүк генларни жайлаштуриду. Яки һайванатларниң геномиға сүт тәркивидики пайдилик белокларни ашурушқа мүмкүнчилик беридиған модификациялик генларни жайлаштурушқа болиду.



225-сурет. Агробактериялик трансформация сизмиси

Һөкүмәт башчилири Дөләтлик кеңәшкә генлик модификацияләнгән организмларни (ГМО) қоллинишни назарәтләш бойичә дөләт рәтләшни йетилдүрүш һәққидә федераллик қанунниң йеңи вариантыни тәйярлиди. Һөкүмәт ГМО бойичә тәләпни күчәйтишни, мундақ мәһсулатларға трансгенлик назарәт жүргүзүшни, мониторинг системисини қурушни, ГМО мәсилилирини рәтләйдиған қоллиништики қанунни бузған лавазимлик вә кануний шәхсләр үчүн миллионлиған әйип пул (штраф) киргүзүшни, шундақла ГМО мәһсулатлириға штамп ясашқа (маркировка) мәҗбурлашни тәвсийә қилди.

Дунияда генлик модификацияләнгән нишанларниң 100 дин ошук тармақлири озук-түлүк санаитидә қоллинилиду.

Генлик модификацияләнгән организмларни (ГМО) пайдилинишни назарәтләш бойичә дөләтлик рәтләшни йетилдүрүш қануни һазирқи вақитта көплигән көплигән Европа мәмликәтлиридә бар. Америка Қошма Штатлирида ГМО мәһсулатлириниң тәркиви рәтләнмигән (регламентлинмиған). ГМО-ға бағлинишлик мәсилиләр бойичә мундақ кануний лайиһиләрниң чиқирилиши мәмликәтлик органларниң аләмшумул жәмийәт алдидики ениқ жавапкәрчилигини көрситиду.

Қазақстанлик алимлар һазирниң өзидә селекция вә генлик инженерия саһасида қайта ишләнгән бир қатар усунушларни беришкә тәйяр. Агробактериялик трансформация йоли билән бактерияләрниң зәхмилишигә тәзүмлүк данлик ашлиқлар елинди (225-сурәт). Қурғақчиликқа тәзүмлүк, протеинға бай язлик буғдайниң йеңи сорти (гибриди) чиқирилди. Шундақла селекционерлар жумһурийәтниң шималий бөлигидә өсидиған гибридлиқ көмүқонақ билән Арал әтрапидики қолайсиз (топиниң тузлуқлиғи жуқури) шараитқа тәзүмлүк

гүрүч түрини чиқарди. Шундақла мал озуклуқ — әркәкчәп, ар-пабаш, бедә вә эспарцетларниң йеңи түрлири елинди. Мал чарвичилиғида сүлтүклиги билән сүтниң майлиқлиғи жуқури йеңи сийир нәсиллири — “Ақ ирис” вә “Ертис” чиқирилди. “Гөшлүк меринос” қой нәсиллиридә мал беши 350 миңға йәтти. Бу нәсилниң гөшиниң үнүмдарлиғи билән өсүмталлиғи әнъәнивий шараиттин 10%-қичә артүқ болди. Қазақстанда ГМОға қатнишлиқ “Генлиқ-инженериялик хизмәтни мәмликәтлик рәтлиниш тоғрилиқ” қанун лайиһилик ясалди, у чағда генлиқ модификациялинған нисанларни қоллиниш, уларни тиркәш, экспортқа чиқириш вә импортлаш шараитлири қараштурулған. Шуниң билән биллә хәтәрлик дәријисиниң системлиниши, генлиқ-инженериялик хизмәткә қоюлидиған умумий тәләпләр билән бағлинишлиқ хизмәт билән шуғуллинишқа рұхсәт елиш механизмли-риму ейтилған.



226-сүрәт. Генлиқ модификацияләнгән өсүмлүкләргә қарши Гринпис хәлиқара экологиялик уюшмиси Англиядә трансгенлиқ зираәтләр терилидиған етизлиқни бесивалди

Өсүмлүк генлиқ инженериясиниң этикилик мәсилилири (226-сүрәт).

Өсүмлүк генлиқ инженериясидә клонлашқа қариғанда этикилик мәсилилири аз, шундиму мәсилиләр бар. Шуниң билән биллә умумий пикирләргә қариму-қарши худа яратқан генлирини өзгәртиш диндар адәмләрләрдә бираз әнсирәшни пәйда қилиду, йәни түрлүк организмлардин “гибридлар” ясаш һазирқи вақитта йешими қийин мәсилиләрни пәйда қиливатиду.

Бүгүнки күндә трансгенлиқ өсүмлүкләрниң зиянлиғи һәққидә дәлилләр йоқ. Өсүмлүк генлиқ инженериясиниң зиянлиғи ейтилған вә униңға тәвсийә қилған (ссылка) барлиқ бесилимлардики мәсилиләр йоққа чиқирилған.

Әлвәттә, өсүмлүк генлиқ инженериясиниң һәқиқий яқлиғучилири болсиму, трансгенлиқ өсүмлүкләрни тамамән бехәтәр дәп аталмайду.

Шу сәвәптин абсолютлуқ бехәтәр технология болмайду, тәбиәттә биологиялик ховуп-хәтәр нольға тәң болмайду. Өсүмлүк генлиқ инженериясигә қарши чиққучилар трансгенлиқ өсүмлүкләрниң 100%-ти бехәтәр екәнлигиниң дәлилини тәләп қилиду. Алимларниң ейтишичә, “бәзибир шараитларда генлиқ модификацияләнгән мәһсулатларниң (яки өсүмлүкләр) айрим адәмләр (яки экосистемилар) үчүн хәтәрлик болуши мүмкүн”, улар оппонентлири умумийла “барлиғи зиянлиқ, һәрқачан вә барлиғи үчүн” дегән пикирни билдүриду.

Биохилму-хиллиқни сақлаш. Генлик модификациялэнгэн өсүм-лүкләрни қоллаш арқилиқ терилғулуқ йөрләрниң мәйданини көпәйт-мәйла, йеза егилик мөһсулатлириниң чүшүмини ашурушқа қол йөткүзүшкә болиду. Бу биосферини сақлашта әһмийәтлик орун али-ду, сәвәви тәрәққий етиватқан әлләрдә һәр жили йеза егилиги билән санаәткә пайдилиниш үчүн 13 млн га орман яғачлири кесилиду.



Билимиңларни тәкшүрүңлар:



1. Биотехнология, биобехәтәрлик, генлик инженерия дегән немә?
2. "Трансгенлик организм" дегинимиз немә? Трансгенлик организмларни яшати-ки мөхсәт немидә?
3. Генлик — инженериялик иш-һәрикәттә қоллинилиши тегишлик сақландурғучи чариләрни атап чиқиңлар.
4. Генлик инженерия организмларниң адәм саламәтлигигә қолайсиз тәсир қилиш ховуপিға баһа бериңлар.



1. Пикир таллаш жүргүзүш үчүн соаллар:
 - 1) Биотехнология, биобехәтәрлик, генлик инженерияни қандақ чүшүнисиләр?
 - 2) Генлик инженерия организмлири медицинада қоллиниламду?
 - 3) Адәм саламәтлиги вә әтрап муһит үчүн генлик инженерияниң ховупи билән униң асасий амиллирини вә сақлаш чарилирини қобул қилиш чарилирини атаңлар.
 - 4) Трансгенлик өсүмлүкләр вә һайванатларни шәкилләндүрүшниң һәм пай-дилинишниң этикилик асаслири қандақ?
2. "ГМО ни пайдилинишниң этикилик мәсилилири" мавзусида төрт ихчам топқа бөлүнүп, дискуссия уюштуруңлар. .



БӨЛҮМ БОЙИЧӘ СИСТЕМЛАШТУРУШ ВӘ НӘТИЖИЛӘШ СОАЛЛИРИ БИЛӘН ТАПШУРМИЛИРИ

1. Биотехнология вә униң нисанлириға (объектлириға) ениқлима бериңлар.
2. Прокариотлар билән эукариотларниң геномлириниң уюшуш алаһидиликлири қандақ?
3. Ген, генниң қурулмисини ейтип бериңлар.
4. Генларниң химиялик вә ферментлик синтезлиниши қандақ әмәлгә ашиду?
5. Биотехнологиялик векторлар вә уларниң түрлири қандақ болиду?
6. Плазмидлар, уларниң хусусийәтлири, тарилиши, биотехнологиядә пайдилиниши һәққидә ейтип бериңлар.
7. Генлик инженерия вә уларниң асасий усуллирини ейтип бериңлар.
8. Рекомбинантлик ДНК, уни елиш қайдилри, биотехнологиядә қоллинилиши һәққидә ейтип бериңлар.
9. Генлик модификацияләнгән организмлар дегинимиз немә?
10. Адәм инсулинини елиш биотехнологиясини ейтип бериңлар.
11. Биотехнология усуллири арқилиқ интерферонларни қандақ алиду?
12. Сомилик (тән) гибридлик һүжәйриләрни елиш вә уларни биотехнологиядә қоллиниш һәққидә ейтип бериңлар.
13. Һайванатларни клонлаш усул қайдилри билән келәчиги һәққидә немә ейталайсиләр?
14. Сүт кислоталиқ мәһсулатларни ишләп чиқириш технологияси.
15. Органикилик кислоталар охшаш бир қатарлиқ метоболитларни елиш технологияси.
16. Ишләп чиқиришта, йеза егилигидә, медицинада, турмушта микроорганизмларни қоллинишниң пайдилиқ тәрәплирини атаңлар.
17. Ишләп чиқиришта, йеза егилигидә, медицинада, турмушта микроорганизмларни қоллинишниң зиянлиқ тәрәплирини атаңлар.
18. Полимеразалиқ қатарлиқ реакцияләр қандақ шараитларда қоллинилиду?
19. ПТР ярдими билән немә елишқа болиду?
20. ПТРниң криминалистикида қандақ әһмийити бар?
21. Атилиқни ениқлашта ПТР қандақ роль атқуриду?
22. Медицинилиқ диагностикида ПТР қандақ қоллинилиду?
23. Мустәқил медицинада ПТР қандақ орун алиду?
24. Генларни клонлашта ПТРниң әһмийити қандақ?
25. ДНК секвенирлашта ПТРниң әһмийитини атаңлар.
26. Мутагенезларда ПТР қандақ қоллинилиду?
27. Генлик инженерия дегинимиз немә?
28. Генлик инженерияниң қандақ әһмийити бар?
29. Генлик модификацияләнгән организмларни қоллинишниң пайдилиқ вә зиянлиқ тәрәплирини атаңлар.

АТАЛҒУЛАРНИҢ ҚИСҚИЧӘ ЛУҒИТИ

Аденозиндифосфат, АДФ (*аденозиндифосфат, АДФ*) — аденин, рибоза вә фосфор кислотасының икки қалдүғидин түзәлгән нуклеотид.

Актин вә меозин — қисқарғучи белоклар.

Альдостерон — адәмнің бөрәк үсти бәзлириниң сирқи қәвитиниң асасий минеракортикостериодлиқ гормони.

Анаболизм — тоқумилар билән һүжәйриләрниң қурулмилик бөләклирини түзүшкә вә йеңилашқа беғишланған жанлиқ организмлардики химиялик реакцияләрниң жиғиндиси.

Антигенлар — организм ят мадда ретидә қобул қилидигән вә мәхсус иммунлуқ реакция пәйда қилидигән маддилар.

Антипорт — башқа маддини қариму-қарши йөнилиштә тошуш.

Антитәнчиләр — нәсли ят (теги ят) маддилар билән алаһидә бағлинишидигән вә иммунитет билән тәминләйдигән аддий белоклар.

Ароморфоз — эволюция нәтижисидә жанлиқ организмларниң уюштуруш дәрижисиниң мурәккәплигини ашуридигән бәлгүләрниң пәйда болуши.

Ассоциатлар — (лат. *associare* — қошуш) — маддиниң химиялик тәбиитидә өзгириш пәйда қилмай, аддий маддиларни — молекулилар яки ионларни қошуп бираз мурәккәп маддиларға айландуруш.

Атеросклеоз — артерияләрниң ички қәвитидә май жиғилип, кейин бирик-түргүчи тоқулмиларға айланип қетиши.

Аутосомилар — атилиқ вә анилиқ организмларда охшаш болидигән жиниссиз хромосомилар.

Әсәб импульслири — бу әсәб талчиқлири бойи билән 0,5—120 м/сек илдам-лиқта күчсиз биоэлектрлиқ ток.

Белокларниң денатурацияси — белокларниң алаһидә тәбийи қурулуминиң өзгириши.

Белокларниң ренатурацияси — белок молекулисиниң биринчи қатарлиқ қурулумидин үчинчи қатарлиқ қурулумиғичә қайта қелипиға келиши.

Биотехнология — организмларниң қатнишиши билән биологиялик жәриян-ларни адәмнің мәхситигә мувапиқ өзгәртиш арқилиқ ишләп чиқиришта пайди-линиш.

Биотикилик иқтидар (потенциал) — түр саниниң улғийишиға тәсир қили-дигән амиллар.

Бластоцель — бластулиниң ичидики суюқлиққа толтурулған йочуқ.

Бөлчәклиниш — уруқниң тухум һүжәйрилириниң (яки партоногенез нәти-жисидә уруқланмиған тухумлириниң) митозлиқ системилик бөлүнүши.

Вазопрессин — яки антидиурезлик гормон — көплигән сүт әмгүчиләрдин тепилған, гипоталамусниң пептидлик гормони. Көп шараитларда тәркивидә ар-гинин болиду, шу сәвәптин аргенин вазопрессини яки аргипрессин дәпму ати-лиду.

Вегетитивлик көпийиш — жиниссиз көпийишниң түри; йетилгән организм-ларниң тән бөләклирини (қәләмчә, бихлиниш) бөлүп елиш яки организмниң түри өзгәргән бөләклири (түгүн, пияз, йилтизтүгүн) арқилиқ көпийиш.

Вектор — генетикилик әхбаратни тошушқа беғишланған генлиқ ин-женериядики сүнзий генетикилик түзүлүш; бактерияләрниң, вирусларниң плазмидилири (өскүч тәнчилири) вектор ретидә пайдилинилиду.

Гамета — һайваналар вә өсүмлүкләрниң жинис һүжәйрилири.

Ганглиозидлар — гликофинголипидлардин туридиған, тәркивиде церамидлар вә олигосахаридлар болидиған тәркиви мурәккәп молекулилар.

Гаплоидлиқ — бир хромосома (n) жиғиндиси бар.

Гемоглобин — эритроцитларда болидиған белок; у кислородни барлиқ тоқулмилар билән әзаларға тошуйду.

Гемодиализ — созулмилиқ бәрәк йетишмәслигидә қанни бәрәктин сирт тазилаш усули.

Гемодилюция — плазминиң умумий мөлчәриниң өсүши билән бағлинишлиқ плазмидики эритроцитлар саниниң азийиши.

Гемосорбия — сорбент бетидә оғини адсорбцияләш йоли билән қанни зәһәрлик маддилардин бәрәктин сирт тазилаш усули.

Гемофильтрация — қанни сүнзий өткүзгүчлиги жуқури мембранилардин фильтрацияләш ярдими билән тазилаш усули.

Ген — белокниң бир полипептидлиқ тизмисиниң синтезлинишиға жавап беридиған ирсийәтлинишниң қурулмилиқ бирлиги.

Генетика — ирсийәтлинишниң вә өзгиришчанлиқниң қанунлири һәққидики илим.

Геном — бир түргә ятидиған организм гаплоидлиқ хромосома жиғиндисидә орунлашқан генлар топлими.

Гетерозигота — һәрхил аллельлиқ генлири бар гаметиларниң қошулушидин пәйда болған зигота.

Гетеротопия — эмбриногенез вақтида тоқулминиң яки организмниң адәттин сирт йәрдә орунлишип тәрәққий етиши.

Гибрид — бир-биридин айримчиликлири бар геномларниң бирикишиниң нәтижисидә елинған организм.

Гибридологиялик тәтқиқат усуллири — альтернативлиқ бәлгүлири бойичә ата-анилиқ индивидларниң чеқилишиши.

Гипергликемия — 1 вә 2-дәрижілик қәнт диабетидә учришидиған патологиялик әһвал, қан плазмисидә глюкоза дәријисиниң кәтирилиши билән тәриплиниду.

Гиперфункция — мәлум бир әзаларниң, тоқулмиларниң, системисиниң хизмитиниң активлиғиниң йәткүлүксиз болуши (хизмитиниң төвәнлишиши).

Гликоген — полисахарид, һайванат крахмали.

Гликолипидлар — тәркивиде қан қалдуғи болидиған мурәккәп липидлар. Гликолипидларниң полярлиқ “башлири” (углевод) вә қош қутуплуқ “қуйруқлири” (май кислотасиниң қалдуқлири) болиду. Мошу хусусийәтлириниң нәтижисидә, фосфолипидлар билән биллә гликолипидлар һүжәйрә мембранисиниң тәркивигә кириду.

Гомеостаз — биологиялик системиларниң тәркиви билән хусусийәтлирини турақлиқ сақлаш қибилйити.

Гомозигота — гомологлуқ хромосомилири бир генниң бирдәк аллельлини елип маңидиған диплоидлиқ яки полиплоидлиқ һүжәйрә яки организм.

Гомология — бирдәк келип чиқишиниң бағлинишлиқ һәрхил түрләр вәкиллриниң арисидики уруқдашлиқ.

Гомологиялик хромосомилар — тәркивиде бирдәк әвлатларниң жиғиндиси бар вә морфологияси бирдәк диплоидлиқ клеткиниң хромосома жүпи.

Гормонлар — ички секреция бәзлиридә исләп чиқирилидиған биологиялик актив маддилар.

Девергенция (бөлгүләрнің ажырышы) — һәрхил шараитларға маслишиш һесавидин урукдаш түрләр бөлгүлирининң ажырышы.

Дигибридлик чекилиштуруш — ата-анилик индивидларни икки жүп бөлгүлири бойичә чекилиштуруш.

Диплоидлик — жүп хромосома жиғиндиси ($2n$).

Диффузия — бир маддининң молекулилири билән атомлирининң йәнә бир маддининң молекулилири билән атомлири арисға өзара җайлишиш җәрияни; молекулилар яки ионларниң концентрацияси жуқури тәрәптин концентрацияси төвән тәрәпкә қозғилиши, йәни концентрация градиентлик бойичә қозғилиш.

Доминантлик — бесимлик бөлгүси, латин алфавитининң чоң һәрипи билән бөлгүлиниду.

Әсәб импульселири — бу әсәб талчиқлирининң бойи билән 0,5—120 м/с илдамликта тарилидиған күчсиз биоэлектрлик ток.

Идиоадаптация (муһитқа маслишиш) — йәрлик муһит шараитлириға өзгичә маслишиш.

Ингибитор — физиологиялик вә физика-химиялик (әң муһими ферментлик) җәриянларни тохтидиған маддилар.

Интерфаза — һүжәйрә циклининң икки бөлүниш арисидики басқуч; һүжәйрә циклининң басқучи, G_1 , S — вә G_2 — фазилириға бөлүниду.

Ирсийәтлиниш — организмларниң түзүлүши билән хизмитининң алаһидиликлири ата-анидин әвлатқа берилидиған вә сақлинидиған барлик организмларға хас умумий хусусийәтлири.

Йерим консервативлик модель — ДНК молекулисининң қош тизмиси узун бойиға бөлүнидиған, бөлүнгән һәр тизма йеңи түзүлидиған тизмиға матрица болидиған ДНК репликациясининң түри.

Катобализм — озук билән чүшидиған яки организмниң өзидә еһтиятқа топланған мурәккәп организмлик маддиларни — белок, нуклеин кислоталири, майлар билән углеводларни еритишқа қаритилған җанлик организмдики ферментативлик реакцияләрниң жиғиндиси. Анаболизмға қарши җәриян.

Кимограф — бир қелиптики илдамлик билән қозғилидиған лентиға (тасмиға) һәрқандақ физиологиялик параметрниң өзгиришини йезивалидиған механикилик қурал.

Клон — бир индивидтин вегетативлик йол билән тәрәққий етиш арқилик пәйда болған генетикилик бир типлик һүжәйриләр топи.

Кодон (яки триплет) — мәлум аминокислотасини ениқлайдиған нуклеин кислотасининң үч нуклеотидтин туридиған бөлиги.

Конвергенция (охшашлик) — муһитниң охшаш шараитлириға маслишишининң тәсиридин урукдаш әмәс бөлгүләрниң мустәқил тәрәққий етиши.

Конъюгация — гомологлуқ хромосомиларниң бир-биригә йеқинлишиши.

Кроссинговер — конъюгация басқучида хромосома бөләклирининң алмишиши.

Кути — өсүмлүкләр эпидермисининң һүжәйрилири бөлидиған вә һүжәйрә қепининң сиртқи бетидә непиз кутикула түридә жиғилидиған (шилим билән биллә) шилим тәхлит мадда.

Қан топлири — бу мәлум бир антигенлар билән антитәнчиләр тәркиви бойичә айримчиликлири.

Лейкопластлар — өсүмлүкләр һүжәйрилиридә учришидиған сфера тәхлит рәңсиз (бояқсиз) пластидлар.

Лигнин — яғач қовзиғида болидиған органикилик мадда. Нәйчилик өсүм-лүкләр билән бәзибир бактерияләрниң һүжәйрилириде болидиған мурәккәп полимерлик қошулушлар.

Липидлар — биологиялик мембранилар тәркивигә киридиған майлар билән май тәхлит маддилар. Барлиқ липидлар гидрофоблуқ вә суда начар ерийду.

Макроэргиялик бағлинишлар — жанлиқ организмлар тәркивигә киридиған қошулушларда болидиған, бош энергияниң мол еһтияти бар жуқури энергетикилик химиялик бағлинишлар болуп һесаплиниду.

Маслишиш — эволюциялик амиллири тәсириниң нәтижиси.

Матрица — мәлум бир маддиниң нәқ көчәрмиси.

Мезодерма — (оттура қәвәт) көплигән көп һүжәйрилиқ һайванатларниң уруқ қепиниң оттура қәвити.

Мейоз — жинис һүжәйрилириниң бөлүниши (көпийиши).

Метоболизм — мадда алмишиш.

Микронәйчиләр — цитоскелетниң тәркивигә киридиған белок һүжәйрә ичи-лик қурулмилар. Микронәйчиләр — диаметри 25 нм болидиған йочуқ цилин-дрлар. Әсәб һүжәйрилириниң аксоглирида уларниң узунлиғи бирнәччә микро-метрдин бирнәччә миллиметрға йеқин болиду.

Микрофибрилилар — микроталчиқлар яки талчиққа охшаш, гликопро-теинлар билән целлюлозидин туридиған тәврәнмә қурулмилиқ инчикә жиплар. Тәврәнмә жиплар өзиги эластиндин туриду.

Микрофиламентлар — глобу依лиқ белок актинниң молекулилирида болидиған вә барлиқ эукариотлиқ һүжәйриләрниң цитоплазмисида учришидиған жипчилар. Булжуң һүжәйрилириде уларни “инчикә филаментлар” дәпму атайду (булжуң һүжәйрилириниң йоған филоментлири миозин бологидин туриду).

Миограмма — булжуң қисқиришиниң қәғәзгә чүширилгән графикалик схе-миси.

Митоз — эукариотлиқ һүжәйриләрниң асасий бөлүнүш йоли.

Модификация — ирсийәтләнмәйдиған өзгиришчанлиқ.

Муреин — бактерияләрниң һүжәйрилиқ қепиниң компоненти.

Мутаген — мутация чапсанлиғини ашуридиған физикилик вә химиялик амиллар.

Мутация — ирсийәтлинидиған өзгиришчанлиқ; генларниң өзгириши.

Нейрон — әсәб һүжәйрилири.

Нефрон — бәрәк тәнчиси.

Нәпәс елиш — бу организмниң һаятлиғи үчүн һажәтлик, энергия бөлүш арқилиқ маңидиған маддиларниң биологиялик оксидлиниш реакциялириниң жиғиндис.

Нуклеозид — азотлиқ асас қалдуқлири билән углерод қәнтидин туриду.

Нуклеотид — ДНК вә РНК молекулилириниң мономерлири. Үч түрлүк мад-дилар қалдуғидин туриду: азотлиқ асас, бәш углеводлиқ қәнт вә фосфор қалдуғи.

Һүжәйрә — жанлиқ системиниң элементарлиқ қурулмилиқ бирлиги.

Һүжәйрә цикли — бир митозлуқ бөлүнүштин кейин, йәнә бир бөлүнүш ари-сидики һүжәйрә һаятлиғидики арилиқ басқуч.

Һүжәйрилиқ нәпәс елиш — мурәккәп жәриян, бу чағда органикилик мад-диларниң ериши (ахирқи аддий беорганикилик маддиларғичә) маңиду.

Олигосахаридлар — бу топниң углеводлириниң тәркивидә икки (диозилар) яки үч (триозилар) молекула моносакхаридлар болиду.

Онтогенез — организмнің пайда болған мәзгилидин һаятиниң ахириғичә йәккә тәрәққий етиш жәрияни.

Органоидлар — һүжәйрә һаятлық һәрикити жәриянида алаһидә хизмәт атқуришини тәминләйдиған турақлық клеткилик қурулма. Мембарнилик ор-ганоидлар- плазмилик мембрана, ядролуқ қап, эндоплазмилик тор, Гольджи жиғиндиси, лизосомилар, митохондриялар, пластидлар. Мембранисиз органоид-лар — хромосомилар, рибосомилар, центроиллар, цитоскелетлар, талчиқлар.

Осморецепторлар — қоршиған суюқлуқниң осмослуқ концентрациясиниң өзгиришлирини қобул қилидиған рецептор.

Партоногенез — жинислик көпийишниниң бир түри. Йәни уруқланмай қалған тухум һүжәйрилиринин, анилиқ организмларниң йетилип чиқиши.

Пархон синдроми — антидиурезлик гормонниң вә вазопрессинниң дурус әмәс секрециясинин пайда болиду.

Пассивлик тошуш — маддиларниң концентрацияси жуқури тәрәптин кон-центрацияси төвән тәрәпкә энергияниң чиқинсиз өтүши.

Пектинлик маддилар — бу алма вә цитрус ширнилирида, қәнт қизилчисида, сәвзә, өрүктә, аптаппелез севәтлиридә, шундақла башқиму кәң таралған өсүм-лүкләрдә болидиған полисахаридлар.

Пептидогликанлар — бактерияләрниң тамлириниң тирәк полимерлири.

Пересинтезлик — (G_2) ($2n\ 4c$ — бу йәрдә: n — хромосома сани, c — ДНК мо-лекула сани) — һүжәйриниң өсүши, новәттики басқучқа тәйярлиниш. Һүжәйрә бөлүнүши аяқлашқандин кейин әмәлгә ашиду.

Перитонеаллик диализ — қанни тазилаш қосақ бошлуғида ичпәрдә арқилиқ әмәлгә ашиду. Қосақ бошлуғиға катетер арқилиқ мәхсус еритинда қуюлиду, еритиндиға қандин оғилиқ маддилар билән артуқ суюқлуқ өтиду.

Пиримидинлик асас — пиримидинлик һасилати — ДНК тәркивидики цито-зин билән тимин.

Плазмаферез — қан елиш, тазилаш вә уни яки қандақту бир бөлигини қанға қайта қайтуруш арқилиқ давалаш.

Плазмидлар — һүжәйрә һаятлығы үчүн һажәтсиз ДНКниң хромосомидин сирт молекулилири.

Полиплодия (һәссилиниш) — хромосомилар саниниң һәссилинип көпийиши.

Полисахаридлар — мономерлири аддий қәнт болуп һесаплинидиған жуқури молекулилик углеводлар, полимерлар.

Популяция — умумий әвлатлик еһтияти бар, мәмум бир территориядә яшайдиған бир түргә ятидиған индивидларниң жиғиндиси.

Постсинтезлик — (G_2) ($2n\ 4c$) — ДНК синтезланмайду, бирақ S басқучида синтезлиниш (репарация) вақтида әвәтилгән камчиликлар, йетишмәсликләрни түзитиш әмәлгә ашурилиду.

Протеолитикилик ферментлар — белоклардики вә пептидлардики аминокислоталири арисидики пептидлик бағлинишларни үзгүчи гидролиз классиға ятидиған ферментлар.

Пуринлик асас — пурин һасилати, уларниң ичидә нуклеин кислоталириниң тәркивигә аденин билән гуанин кириду.

Радионуклидлар — радиоактивлик ядролар вә атомлар.

Реберг—Тареев синиғи — бөрәк патологиясиниң диагностикасиниң жуқури әхбаратлик усули.

Редукция (әкси тәрәққият) — нәсиллик формиларда яки онтогензниң хелә дәсләпки басқучида тәрәққий етиватқан әзаларниң йетилмәй қелиши яки толуқ йоқап кетиши.

Резус-фактор — адамның вә бенгаллық маймунның эритроцитлирида болидиған ят тән (антиген).

Рекомбинация (қайта таритиш) — мейоздики гомологиялик хромосомиларни алмаштуруш вә таритиш нәтижесидә әвлатта ата-анилик генетикилик материални қайтидин таритип орунлаштуруш.

Рецепторлар — таллиғучиниң чәтки алаһидә бөлиги, униң арқилик энергияниң бәлгүлүк бир түри әсәб қозуш жәриянида трансформациялиниду.

Рецессивлик бәлгү — сиртқа көрүнмәйду, бирақ генотипта сақлиниду, латин алфавитиниң кичик һәриплири билән бәлгүлиниду.

Сигмоидлик (S-шәкиллик) форма — өсүшниң бир типни популяцияниң зичлиғиға беқинда, у озуклуқ ресурсларниң түгишигә вә зәһәрлик мәһсулатларниң жиғилишиға тәсир қилиду.

Синтезлик — (S) ($2n\ 4c$) — репликациси йоли билән генетикилик материалниң икки һәсилиниши әмәлгә ашиду.

Спермотозоид — атилик жинис һүжәйриси — гамета.

Спорилар — жиниссиз көпийиш хизмитини атқуридиған бәзибир өсүмлүкләр билән могуларниң мәхсус йөнилиштики һүжәйрилири.

Статистикилик иш — тән бөләклирини бир һаләттә тутуп туруш, жүк көтириш, бир һаләттә сақлаш.

Строма — хлоропласт мембраниси билән тилокоидлар арисидики бошлуқ строма дәп атилиду. Стромидә РНК хлоропласт молекулилири, пластидлик ДНК, рибосомилар болиду.

Суберин вә мом (воск) — бәзибир өсүмлүкләрниң қепада йепинча тоқулма маддиси.

Таза нәсилтармақ (яки клон) — көпчилик генлири гомозиготилик, өзини өзи уруқландуруш арқилик көпийидиған бир индивидниң әвлади.

Тарсформизм — түрләрниң өзгәргүчлиги һәққидә уқумлар системиси.

Тәбиәт ресурслири — адам пайдилинидиған тәбиәт компонентлири. Асасий түрлири: минераллик, йәр, климатлик, су, биологиялик.

Тәһлил қилғучи чеқилиштуруш — Аа гибридлиқ индивидларни рецессивлик аллельлири бойичә аа гомозиготилик индивидлар билән чеқилиштуруш.

Токсинлар — зәһәрлик маддилар.

Толуқ доминантлик — доминантлик бойичә Аа гетерозиготилик фенотип АА гомозиготилик фенотиптин айримчилиғи болмайдиган аллельлик генларниң өзара һәрикәтлиниш түри.

Толуқ әмәс доминантлик — бу доминантлик генниң рецессивлик ген бәлгүлирини толуқ басалмай қелиши.

Транплантация — тоқулмиларниң яки әзаларни авуштуруш.

Трансгенез — өсүмлүкләр, һайванатлар вә микроорганизларниң геномиға ят яки өзгәргән генетикилик әхбаратни киргүзиш.

Транслоказа — м-РНК молекулисиниң транцияция жәрияни вақтида рибосоминиң узун бойи билән һәрикәтлинишини тәминләйдиған фермент.

Транспирация — тәмәшкөз, кутикула, ясмүқчә арқилик суниң һоға айлиниши.

Тухум һүжәйриси — анилиқ тухум һүжәйриси — гамета.

Түзигүчи булжуңлар — өгидики аяқ-қолниң түзүлүшини тәминләйду.

Түр ареали — берилгән түрниң вәкиллири маканлайдиған аймақ.

Түр критерийи — берилгән түрниң башқа түрләрдин алаһидилигини көрситидиған бәлгүләр жиғиндиси.

Түр түзүлүши — йеңи түр пәйда болидиған мурәккәп эволюциялик жәриян.

Унипорт — йеникләндүрилгән диффузия жәрияниға қатниши бар ион молекулирини пассивму, активму тошуш усуллириниң бири.

Фенотип — организмларниң барлиқ бөлгүлири билән хусусийәтлириниң жиғиндиси.

Ферментлар — барлиқ жанлиқ һүжәйриләргә қатнишидиған вә биологиялик көптәргүч ролини атқуридиған алаһидә белоклар.

Фибриллярлиқ белоклар — жип тәхлит белоклар.

Фосфолипидлар — фосфори бар мурәккәп липидлар — һүжәйрә мембранисиниң скелети.

Фосфориллаш — адәттә, ферментлар арқилиқ катализланған вә фосфор кислотасиниң қалдүғини фосфорлайдиған агент-донордин субстратқа көчириш жәрияни.

Хитин — омуртқисиз вә могуларниң тирәк полисахаридлири.

Хлоропластлар — фотосинтезлийдиған эукариот һүжәйрилиридә учришидиған йешил пластидлар.

Хлорофильлар — өсүмлүкләрниң йешил пигменти, улар пигментниң ярдими билән күн йоруғиниң энергиясини пайдилиниду вә фотосинтезни әмәлгә ашуриду.

Холестерол — органикилик қурулма тәбийй полицклни липфильлиқ спирт, барлиқ һайванатлар билән адәмниң һүжәйрә мембранилирида болиду.

Хромопластлар — өсүмлүк һүжәйрилири; күздә йопурмақларға, көплигән ширнилик йемишларға, сәвзә билән қизилча йилтизлириға қизил, сериқ яки қизғуч сериқ рәнч беридиған каротиноидлардин туридиған пигменлири бар.

Хромосома хәритиси — мәлум бир хромосомиларниң орнилишиш тәртиви билән уларниң арисидики селиштурма арилиқлир көрситилидиғанн схема.

Хромосомилар — генлар орунлашқан һүжәйрә ядросида түзүлидиған қурулма.

Хромотид — ДНК икки һәссиләнгәндин кейин хромосомиларниң йерими; бир хромотид бир ДНК молекулисидин туриду.

Целлюлоза яки (ясунуқ) — әң көп таралған полимерларниң бири, өсүмлүк һүжәйрилириниң мембранилириниң асасий тирәк полисахаридлири.

Центромера — митоз вә мейоз вақтида урчуқ жиплири бәкинидиған хромосомиларниң бөләклири.

Цитоплазма — плазмилиқ мембрана билән ядро арисидики һүжәйриниң бөлүги.

Чапраслиниш — мейозлуқ профазиси вақтида гомологлиқ хромосомиларниң охшаш бөләклириниң алмишиши.

Э. Чаргафф қандиси — ДНК тәркивидики пуринлиқ асасларниң сани һәрқачан пиримидинниң саниға, аденинниң сани тиминға, гуанинниң сани цитозинға тән болиду.

Эволюция — тирикчиликниң қайтиланмай тарихий тәрәққий етиши.

Эктодерма — көп һүжәйрилиқ һайванатларниң уруғиниң сиртқи қеи.

Энтодерма — көп һүжәйрилиқ һайванатларниң уруғиниң ички қеи.

Эритроцитлар — кислородниң тошулушини тәминләйдиған қан һүжәйрилири.

Ядро — эукариотлиқ һүжәйриләрниң әһмийәтлик қурулум тәркиви.

ПАЙДИЛАНҒАН ӘДӘБИЯТЛАР

1. Альберте. — молекулярная биология клетки. — М., Мир, 1986.
2. Володин Б.Г. И тогда возникла мысль. — М.: Знание 1985.
3. Гаригов А. Становление прикладной оптики в XV — XIX вв — М.: Мир, 1983.
4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х томах — Мир, 1990.
5. Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. — М.: Мир, 1987 г.
6. Зенбуш П. Молекулярная и клеточная биология. — М.: Мир, 1982 г.
7. Медовар П., Медовар Дж. Наука о живом. — М.: Мир, 1982г.
8. Мецлер Д. Биохимия. — М.: Мир, 1980. — Т.1.
9. Новиков Ю.В., Сайфутдинов М.М. Вода и жизнь на Земле. — М.: Мир, 1981.
10. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. — М.: Просвещение, 1987.
11. Овчинников Ю.А., Шамин А.Н. Строение и функции белков. — М.: Наука, 1983.
12. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка — М.: Мир, 1980.
13. Чухрай Е.С. Молекула, жизнь, организм. — М.: Мир, 1984.
14. Бергельсон И.Д. Мембраны, молекулы, клетки. — М.: Мир, 1982.
15. Болдирева А.А. Биохимия мембран. — М.: Знание, 1986.
16. Болдирева А.А. Строение и функции биологических мембран. — М.: Знание, 1987.
17. Де Дю К. Путешествие в мир живой клетки. — М.: Мир, 1987.
18. Кагава Я. Биомембраны. — М.: Мир, 1985.
19. Либерман Е.А. Живая клетка. — М.: Мир, 1982.
20. Воробьев В.И., Воробьев Р.И. Живая химия. — М.: 1985.
21. Кемп П. Армс К. Введение в биологию. — М.: Мир, 1988.
22. Скулачев В.П. Рассказы о биоэнергетике. — М.: Знание, 1985.
23. Скулачев В.П. Этюды об энергетике М.: Знание, 1985.
24. Шмидт — Ниельсен К. Размеры животных: почему они так важны. — М.: Мир, 1986.
25. Заварзин Г.А. Микробиология двадцать первого века. — М.: Знание, 1981.
26. Либерман Е.А. Живая клетка. — М.: Наука, 1983.
27. Нейман Б.Я. Индустрия микробов. — М.: Знание, 1983.
28. Курцмен Дж., Гордон. Да сгинет смерть! — М.: Мир, 1982.
29. Лемб М. Биология старения. — М.: Мир, 1980.
30. Райцина С.С. Сперматогенез и структурные основы его регуляцию. — М.: Наука. 1985.
31. Смит Дж.М. Эволюция полового размножения. — М.: Мир, 1980.
32. Шлегель Г. Общая микробиология. — М.: Мир, 1987.
33. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. — М.: Центр, 1997.
34. Мотилёва Л.С., Скоробогатов В.А., Сударигов А.М. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов — СПб.: Издательство Союз, 2000.
35. Найдих В.М. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2000.
36. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. Ин-т биохимии. — М.: АН СССР, 1968. см.: Опарин А.И. Материя — жизнь — интеллект. М., 2000 г.
37. Учебное пособие для студентов "Концепции современного естествознания": Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Шекспир В. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 7. С. 157.
38. Дарвин Ч., Полное собрание сочинений, т. I, кн. 2 — Происхождение видов, путем естественного отбора, гл. III—Борьба за существование, М.— Л., 1926.
39. Мензбир М.А., Первые 65 лет в истории теории подбора (ibid., т. I, М.—Л., 1926).
40. Уоллэс А., Дарвинизм, М., 1898.
41. Шмидт М.Ю., Организм среди организмов, М.—Л., 1927.
42. Некрасов А.Д., Половой отбор и вторичные половые признаки, М.— Л., 1927.
43. Каутский К., Размножение и развитие в природе и обществе, М.— П., 1923.
44. Weizmann A., Vortrage Tiber Descendenzlehre, 2 Bande, Jena, 1904.
45. Plate L., Selektionsprinzip und Probleme der Artbildung, Lpz.— B., 1913.
46. Beljaefl M.M., Ein Experiment iiber die Bedeutung der Schutzfarbung, Biologisches Zentralblatt, B. XLVII, 1927.
47. Osborn H.F., The causes of extinction ol mammals, American naturalist, v. XL, 1906.
48. Weldon W.K., An attempt to measure the death rate to the selective destruction ol Carcinus moenas, Proceedings of the Royal Society of London, v. LVII, 1895. Pearson K., The chances of death, y. I, London — N. Y., 1897.

МУНДӘРИЖӘ

7. ҺҮҖӘЙРИЛИК ЦИКЛ

§ 61. Митоз. Һүжәйриде митозның һәр түрлүк басқучлиридики жәриялар	4
§ 62. Өсүмлүкләр вә һайванатлардики гаметогенез. Гаметилар. Гаметогенез басқучлири	9
§ 63. Өсүмлүкләрдики спорогенез вә гаметогенез	14
§ 64. Онкологиялик йеңи түзүлүшләрнің пәйда болуши	18
§ 65. Рак әһваллириниң пәйда болушиға тәсир қилидиған амиллар	21
§ 66. Организмнің қериш һадисилири. Қериш жәрияни тоғрисида нәзәрийәләр	26
Бөлүм бойиче билимни системиләш вә хуләсиләш соаллири билән тапшурмилири	31

8. ИРСИЙӘТЛИНИШ БИЛӘН ӨЗГИРИШЧАНЛИҚНИҢ ҚАНУНИЙӘТЛИРИ

§ 67. Модификациялик өзгиришчанлиқ	32
§ 68. Бөлгүләрнің өзгиришчанлиқтики вариациялик қатарлири	35
8-лабораториялик иш. Вариациялик қатар билән әгиргә қурулған модификациялик өзгиришчанлиқни тәтқиқ қилиш	38
§ 69. Ирсийәтлиниш бөлгүлириниң цитологиялик асаси	39
§ 70. Дигибридлик тозаңлаштуруш вақтидики хромосомиларның мустәқил ажриши	42
§ 71. Жинис билән тиркилип ирсийәтлиниш	45
§ 72. Көп аллельлик. Һесаплар чиқириш	48
§ 73. Ирсийәтлинишнің хромосомилиқ нәзәрийәси	51
§ 74. Кроссинговер нәтижисидә бөлгүләрнің ирсийәтлиниш қанунийәтлириниң бузулуши	55
§ 75. Аллельлик вә аллельлик әмәс генларның өз ара тәсирлишиши	57
§ 76. Эпистаз. Комплементарлик полимерия	61
§ 77. Хуго де Фризнің мутация һәққидики нәзәрийәси. Туюқсиз вә индукцияләнгән мутацияләр	65
§ 78. Чекитлик, хромосомилиқ, геномлуқ, ядролуқ вә цитоплазммилиқ мутацияләр	68
§ 79. Адәм хромосомиси жиғиндисиниң кариограммисини түзүш. Геномлуқ мутацияни оқуп билиш	72
§ 80. Адәмдә хромосома саниниң өзгиришигә бағлинишлиқ болидиған хромосомилиқ ағриқлар	76
Бөлүм бойиче билимни системиләштуруш вә хуләсиләш соаллири билән тапшурмилири	82

9. ЭВОЛЮЦИЯЛИК ТӘРӘҚҚИЙ ЕТИШ. СЕЛЕКЦИЯ АСАСЛИРИ. ЖАНЛИҚ ОРГАНИЗМЛАРНИҢ КӨПТҮРЛҮКЛИГИ

§ 81. Ирсийәтлинидиған өзгиришчанлиқ (мутация) билән эволюция арисидики өз ара бағлиниш	83
§ 82. Ирсийәтлинидиған өзгиришчанлиқ — эволюция асаси	87
§ 83. Комбинативлик өзгиришчанлиқ. Мутация	90
§ 84. Тәбийй бөлүнүш. Һаятлик үчүн күрәш	93
§ 85. Генлар дрейфи. Популяциялик долқунлар	97

§ 86. Эволюцияның селиштурма-анатомиялық, эмбриологиялық, палеонтологиялық дәлиллири	102
§ 87. Эволюцияның биогеографиялық, биохимиялық дәлиллири	108
§ 88. Йер бетидики һаятлықның қелиплишиш девирлири	111
§ 89. Филогенетикилік шежіре дәриғи. Кладограммилар	115
§ 90. Ахирқи аммибап умумий әждат	117
§ 91. Кладограмма қураштуруш. Модельлаш	119
§ 92. Филогенетикилік хәритиләрниң түрлүк формилири. Кладограмма билән филогенетикилік дәреқнің айримчилиғи	120
§ 93. Кладограммилар билән филогенетикилік дәреқләрниң эволюциялық әһмийити	122
§ 94. Түр түзүлүши. Түр түзүлүши механизмилри	126
§ 95. Түр түзүлүшиниң чәклигүчи механизми	129
§ 96. Түр түзүлүшидики репродуктивлік чәклиниш. Полиплоидия вә гибридлиниш	132
§ 97. Селекция пәнигә умумий обзор. Селекция усуллири	136
§ 98. Селекция усуллири арқилиқ өсүмлүкләр сортлири билән һайванатларның сүнзий нәсилни яхшилаш. Гибридизация. Полиплоидия. Ясалма мутагенез	142
§ 99. Антропогенез басқучлири. Протоантроплар. Архантроплар. Палеоантроплар. Неоантроплар	147
Бап бойичә билимни системалаш вә йөкүнләш соаллири билән тапшурмилири	151

10. КООРДИНАЦИЯ ВӘ РӘТЛӘШ

§ 100. Әсәб һүжәйрилириниң түзүлүши	152
§ 101. Мембранилық иқтидар. Һәрикәт иқтидари	156
§ 102. Һәрикәт иқтидариниң инициацияси билән трансмиссияси. Нейрон аксониниң бойи билән һәрикәтнің берилиши	161
§ 103. Рефрактерлик мәзгил вә униң роли	164
§ 104. Миелинләнмигән нейронларның артуқчилиғи	168
§ 105. Миелинләнгән вә миелинләнмигән нейронларни селиштуруш	171
§ 106. Мәркизий әсәб системисиниң түзүлүши	174
§ 107. Мейиниң түзүлүши вә хизмәтлири	177
§ 108. Жүлүнниң түзүлүши вә хизмити	182
§ 109. Механорецепторларның түрлири. Пачини тәнчиси мисалида тәсир йәткүзгүчиләрниң өзгиришигә механорецепторларның реакцияси ..	186
§ 110. Холинергиялық синапс түзүлүши билән хизмитиниң бағлиниши	190
Бап бойичә билимни системалаш вә йөкүнләш соаллири билән тапшурмилири	194

11. ҺӘРИКӘТ

§ 111. Тоғра йоллүк булжун тоқулмилириниң түзүлүши. Миофибрилл түзүлүши	195
§ 112. Булжун талчиқлириниң қисқираш механизми. Булжун талчиқлириниң Т-системиси	199
§ 113. Илдам вә аста қисқирайдиған булжун талчиқлириниң түзүлүши, орунлишиши вә умумий хусусийити	203
§ 114. Актинға бағлиқ скелет булжунлириниң түрлири	206
Бап бойичә билимни системалаш вә йөкүнләш соаллири билән тапшурмилири	211

12. БИОМЕДИЦИНА ВӘ БИОИНФОРМАТИКА

§ 115. Робототехникада биомеханиканы қоллиниш.....	212
§ 116. Медицинилік биомеханика (протезлаш). Эргометриялық биомеханика (оптимизация)	215
§ 117. Йәрдики жанлиқ организмлар қозғилишиниң биомеханикисини тәтқиқат қилиш. Модельлаш	219
§ 118. Жүрәкниң өткүзгүч системиси. Жүрәк автоматиясиниң механизми. Жүрәктики қозғилишиниң өтүш илдамлиғи. Жүрәк булжуңлириниң қисқириси	222
§ 119. Электрокардиография вә униң диагностикалиқ әһмийити.....	226
§ 120. Жүрәктә болидиған электрлиқ жәрияни тәтқиқат қилиш. Модельлаш.....	228
Бап бойичә билимни системлаш вә йәкүнләш соаллири билән тапшурмилири.....	230

13. БИОТЕХНОЛОГИЯ

§ 121. Ишләпчиқирисhta, йеза егилигидә, медицинада, турмушта микроорганизмларни қоллинишниң артуқчилиқлири билән камчилиқлири	231
§ 122. Полимеразлиқ тизмилиқ реакцияни (ПТР) қоллиниш	235
§ 123. Криминалистикида, медицинилік диагностикада, атилиқни ениқлашта, автономиялиқ медицинада полимеразлиқ тизмилиқ реакцияниң әһмийити.....	239
§ 124. Генларни клонлашта, ДНК-ни секвенирләштә, мутагенездә полимеразлиқ тизмилиқ реакцияниң әһмийити	242
§ 125. Генлиқ-инженериялиқ манипуляция этаплири	245
§ 126. Генетикилиқ инженерияниң әһмийити.....	247
§ 127. Генлиқ модификацияләнгән организмларни қоллинишниң ижабий вә сәлбий тәрәплири	252
§ 128. Генлиқ модификацияләнгән организмларни қоллинишниң этикилиқ мәсилилири (соаллири)	255
Бәлүм бойичә системлаштуруш вә нәтижиләш соаллири билән тапшурмилири.....	259
Аталғуларниң қисқичә лугити	260
Пайдиланған әдәбиятлар	267

Учебное издание

**Очкур Елена Афанасьевна
Курмангалиева Жамал Жандосовна
Нуртаева Макпал Алписбайкызы**

БИОЛОГИЯ

Часть 2

**Учебник для 10 классов естественно-математического направления
общеобразовательных школ
(на уйгурском языке)**

**Редактор С. Балинова
Бөдий редактор Л. Уралбаева
Техникилик редактор И. Тарапунец
Компьютерда сөһипилигөнлөр И. Алмабаева, Ч. Рузиева
Нөшрийтқа Қазақстан Жумһурийити Билим ве пән министрлигиниң
№ 0000001 дәләтлик лицензияси 2003-жили 7-июльда берилген**



ИБ №6057

Нәширгө 09.09.19 қол қоюлды. Формати 70x100¹/₁₆. Офсетлик қәғәз.
Һәрип түри “SchoolBook Kza”. Офсетлик нәшир. Шәртлик басма тавиғи 21,93.
Шәртлик бояқ һәжими 88,37. Һесапқа елинидиған
басма тавиғи 16,42. Тиражи 2000 данә. Буйрутма №

“Мектеп” нәшрияти, 050009, Алмұта шәһири, Абай проспекти, 143.

Факс: 8(727) 394-37-58, 394-42-30.

Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34.

E-mail: mektep@mail.ru

Web-site: www.mektep.kz