

2

ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛАР

§5. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛАР, УЛАРНИҢ ХУСУСИЙӘТЛИРИ БИЛӘН ГРАФИКЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, тригонометрия, синус, косинус, тангенс, котангенс



Тригонометриялик функцияларниң асасий хусусийәтлири билән тонушусиләр, уларниң графиклирини селишни үгинисиләр.

9-синип алгебра курсида тригонометриялик функцияларниң ениқлимилири, формулилири, вә бәзи бир хусусийәтлири билән тонуштуңлар. Мошу мәлуматларни әскә елип, график селишниң алгоритмини қоллинип, тригонометриялик функцияларниң графиклирини селишни қараштуримиз. Әнди һәрбир тригонометриялик функцияларниң графигини селишқә тохтилайли.

I. $y = \sin x$ функцияси.

1) 1) ениқлиниш даириси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in \mathbb{R}$;


2) мәналар жиғиндиси $[-1; 1]$ кесиндиси, йәни $y \in [-1; 1]$;

3) $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, периодлуқ функция, әң кичик периоды 2π .


4) Функция тағ, сәвәви $\sin(-x) = -\sin x$.

$(0; 0)$, $(\frac{\pi}{6}; \frac{1}{2})$, $(\frac{\pi}{2}; 1)$, $(\frac{5\pi}{6}; \frac{1}{2})$, $(\pi; 0)$ чекитлирини координатилиқ тәкшилиқкә чүширип, $y = \sin x$ функциясиниң $[0; \pi]$ кесиндисидики графигини салимиз (27, а-сүрәт).

$y = \sin x$ функцияси тағ функция болғанлиқтин, униң графиги баш чекиткә қариганда симметриялик. Мошу хусусийәтни қоллинип, $[-\pi; 0]$ арилиғида графикни давамлаштуримиз. Шу вақитта $y = \sin x$ функциясиниң $[-\pi; \pi]$ кесиндисидики графигини алимиз (27, ә-сүрәт).




а)



ә)

27-сүрәт

Демәк, $y = \sin x$ функциясиниң толук бир период ичидики графигини салдуқ. Әнди периодлуқ функцияниң хусусийәтлирини пайдилинип, барлиқ ениқлиниш даиридидики функция графигини селишқә болиду (28-сүрәт).



28-сүрәт

5) $y = \sin x$, $n \in \mathbb{Z}$, кесиндилеридә функция бир қелипта өскүчи, $\left[\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n\right]$, $n \in \mathbb{Z}$, кесиндилеридә бир қелипта кемигүчи. $y = \sin x$ функциясиниң графигини *синусоида* дәп атайду.

II. $y = \cos x$ функцияси.

Функцияниң:

1) ениқлиниш даириси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндис, йәни $x \in \mathbb{R}$;


2) мәналар жиғиндис $[-1; 1]$ кесиндис, йәни $y \in [-1; 1]$;

3) $\cos(x + 2\pi) = \cos x$, периодлуқ функция, әң кичик периоды 2π ;


4) функция жүп, сәвәви $\cos(-x) = \cos x$.

$(0; 1)$, $\left(\frac{\pi}{3}; \frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{\pi}{2}; 0\right)$, $\left(\frac{2\pi}{3}; -\frac{1}{2}\right)$, $(\pi; -1)$ чекитлирини координатилиқ төкшилиқкә чүширип, $y = \cos x$ функциясиниң $[0; \pi]$ кесиндисидики графигини салимиз (29-сүрәт).

$y = \cos x$ функцияси жүп функция болғанлиқтин, униң графиги ордината оқиға қарығанда симметриялик әгир сизиқ. Мошу хусусийәтни қоллинип, $[-\pi; 0]$ кесиндисидә графикни давамлаштуруп салимиз. Шунда $y = \cos x$ функциясиниң $[-\pi; \pi]$ кесиндисидики графигини алимиз (30-сүрәт).




29-сүрәт



30-сүрәт

Әнди периодлуқ функцияниң графигини селиш хусусийитини пай-дилинип, барлиқ ениқлиниш даирисидики функцияниң графигини селишқа болиду (31-сүрәт).



31-сүрәт

5) $[2\pi n; \pi + 2\pi n]$, $n \in \mathbb{Z}$, кесиндилериде бир қелипта кемигүчи вә $[-\pi + 2\pi n; 2\pi n]$, $n \in \mathbb{Z}$ кесиндилериде бир қелипта өскүчи функция.

$y = \cos x$ функциясиниң графигини *косинусоида* дөп атайду.

Шуниң билән биллө, $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ экәнлигини нәзәрдә тутуп, $y = \cos x$ функциясиниң графигини $y = \sin x$ функциясиниң графигиниң Ox оқиниң бойи билән $\frac{\pi}{2}$ арилиғиға сәлбий йөнилиштә параллель көчириш арқилиқму елишқа болиду.

III. $y = \operatorname{tg} x$ функцияси.

Функцияниң:

1) ениқлиниш даириси $\{x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}\}$ жиғиндисидин башқа барлиқ һәқиқий санлар жиғиндисиди, сәвәви $y = \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cos x \neq 0$, $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;

2) мәналар жиғиндисиди — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндисиди, йәни $\operatorname{tg} x \in \mathbb{R}$;

3) $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}(x + \pi)$ — функция периодлуқ, әң кичик ижабий периоди π сани;


4) функция тағ, сәвәви $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$.

Әнди $\operatorname{tg} x$ функциясиниң графигини салайли.


$(0; 0)$, $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, $\left(\frac{\pi}{4}; 1\right)$, $\left(\frac{\pi}{3}; \sqrt{3}\right)$ чекитлирини координатилиқ төкшилиғигә бәлгүлөп, $[0; \frac{\pi}{2})$ арилиғида $y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң графигини салимиз (32-сүрәт).

$y = \operatorname{tg} x$ функцияси тағ функция болғанлиқтин, униң графиги баш чекиткә қариғанда симметриялик әгир сизиклиғини нәзәргә елип, $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ арилиғида графикни давамлаштуримиз. Шунда $y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалидики графиги чиқиду (33-сүрәт).


5) $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n\right)$, $n \in \mathbb{Z}$, интерваллирида функция бир қелипта өскүчи.



32-сүрәт



33-сүрәт



34-сүрәт

Әнди периодлук функцияниң хусусийитини пайдилип, барлиқ ениқлиниш даирисидики функцияниң графигини селишқа болиду (34-сүрәт).

$y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң графигини *тангенсоида* дөп атайду.

IV. $y = \operatorname{ctg} x$ функцияси.



$y = \operatorname{ctg} x$ функциясиниң асасий хусусийәтлерини қоллинип, графигини селиңлар.


$y = \operatorname{ctg} x$ функциясиниң графигини *котангенсоида* дөп атайду.

Тригонометриялик функцияләрниң графиклириға аддий түрлөндүрүшләрни қоллинишқа мисал кәлтүрәйлүк.

МИСАЛ

$y = \operatorname{ctg}\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ функциясиниң графигини салайли.


Йешилиши. Алди билән $y = \operatorname{ctg} x$ функциясиниң графигини қуримиз. Униңдин кейин графикни Ox оқиниң бойи билән $\frac{\pi}{6}$ -ға тәң арилиққа сәлбий йөнилиштә параллель кәчиримиз (35-сүрәт).



35-сүрәт

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

36-сүрәттә $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$ функциясиниң графиги қандақ қурулған?



36-сүрәт



1. Синусоида әгир сизигида бир қелипта өскүчи яки бир қелипта кемигүчи бөлүкләр боламду?
2. Немишкә $y = \cos x$ функциясиниң мәналири 1 гә артуқ болмайду?
3. 1 вә -1 санлири $y = \sin x$ функциясиниң мәналири дегән чүшәнчидин башқа хусусийитини көрситиду?
4. $y = \cos x$ вә $y = \sin x$ функциялириниң алаһидиликлирини ениқ көрситидиған хусусийәтлирини атаңлар.
5. Немишкә барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси $y = \operatorname{tg} x$ вә $y = \operatorname{ctg} x$ функциялириниң ениқлиниш даирисиниң жиғиндиси болалмайду?

Көнүкмиләр

А

5.1. Функцияниң жүп яки тағ экәнлигини ениқлаңлар:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } y = x \cos x; & \text{ә) } y = \frac{\cos 5x + 1}{x}; \\ \text{б) } y = \frac{\sin^2 x}{x^2 - 1}; & \text{в) } y = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{4 - x^4}. \end{array}$$

5.2. Аддий түрлөндүрүшләрни пайдилинип, $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ функциясиниң графигини селиңлар. Мошу графикниң $y = \sin x$ функциясиниң графигидин алаһидилигини көрситиңлар.

5.3. $y = f(x)$ графигини селиңлар:

$$\text{а) } y = 1 + \cos x; \quad \text{ә) } y = \sin x - 3; \quad \text{б) } y = \operatorname{tg} x - 1; \quad \text{в) } y = -2 + \operatorname{ctg} x.$$

5.4. Функцияниң графигини селиңлар:

$$\text{а) } y = \operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right); \quad \text{ә) } y = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right).$$

В

5.5. $y = f(x)$ функциясиниң графигини селиңлар:

$$\begin{array}{lll} \text{а) } y = \sin 2x; & \text{ә) } y = \cos 3x; & \text{б) } y = \operatorname{tg} \frac{x}{2}; \\ \text{в) } y = \operatorname{ctg} \frac{x}{3}. & \text{г) } y = 3 - \sin \frac{x}{2}; & \text{ғ) } y = \cos 1,5x - 2. \end{array}$$

5.6. $y = f(x)$ функциясиниң әң кичик ижабий периодини ениқлаңлар:

$$\begin{array}{lll} \text{а) } f(x) = \sin 7x; & \text{ә) } f(x) = \operatorname{tg} \frac{2x}{3}; & \text{б) } f(x) = \cos \frac{x}{6}; \\ \text{в) } f(x) = \operatorname{ctg} 8x; & \text{г) } f(x) = \sin 0,25x; & \text{ғ) } f(x) = \cos 2,5x. \end{array}$$

5.7. Аддий түрлөндүрүшләрни қоллинип, берилгән функцияниң графигини селиңлар:

$$\text{а) } y = \cos\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) + 2; \quad \text{ә) } y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6} - \frac{x}{2}\right) - 1.$$

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛЭШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, уның ениқлиниш даириси, мәналар жиғиндиси, хусусийәтлири, әкси функция чүшәнчиси, уни қуруш усули, тригонометриялик функцияләрниң хусусийәтлири, графиклири.

§6. АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС, АРККОТАНГЕНС**Асасий чүшәнчиләр**

Функция, әкси функция, арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс



Силәр арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс чүшәнчилири билән тонушусиләр, уларниң мәналирини һесаплиғанда, ипадиләрни ихчамлиғанда, тәңму-тәңликләрни испатлиғанда қоллинишни үгинисиләр.



6-жәдвәлни толтуруңлар:

6-жәдвәл

Берилгән функция	Әкси функция
$y=2x$	
$y=x-2$	
$y=-x+3$	
$y=x^2(x \neq 0)$	

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

Немишкә жәдвәлдики төртинчи мисалда қошумчә шәрт берилгән?

Әкси функцияниң ениқлимисини вә бар болуш шәртини қоллинип, әкси тригонометриялик функцияләрниң чүшәнчисини киргүзәйли.

1. $y = \sin x$ функциясигә әкси функция.


$y = \sin x$ функцияси $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидә ениқланған, бир қелипта өскүчи вә өзиниң барлиқ мәналирини $[-1; 1]$ кесиндисидә қобул қилиду.

Демәк, $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидә $y = \sin x$ функциясигә әкси функция бар.

$y = \sin x$ функциясигә әкси функция $y = \arcsin x$ дөп бөлгүлинип, арксинус икә дөп оқулиду.

У вақитта $y = \arcsin x$ функцияси $[-1; 1]$ кесиндисидә ениқланған, $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидә өзгиридиған бир қелипта өскүчи функция.

$y = \arcsin x$ функциясиниң графиги $y = \sin x$ функциясиниң графигиға $y = x$ түзигә қариганда симметриялик әгир сизик. Демәк,



37-сүрөт

$y = x$ түзи симметрия оқи болуп ҳесап-
линиду (37-сүрөт).

Энди $y = \arcsin x$ әкси тригонометри-
ялик функциясиниң хусусийәтлерини
кәлтүрәйлүк:

1) функцияниң ениқлиниш даириси
[−1; 1] кесиндиси;

2) мәналар жиғиндиси $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесин-
диси;

3) функция тағ, йәни $\arcsin(-x) =$
 $= -\arcsin x$;

4) функция бир қелипта өскүчи.

Һәр қандақ $x \in [-1; 1]$ үчүн $\sin(\arcsin x) = x$ вә $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

$y = \sin x$ (бу йәрдә $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, $-1 \leq \sin x \leq 1$) — тоғра функция.

$y = \arcsin x$ (бу йәрдә $x \in [-1; 1]$, $-\frac{\pi}{2} \leq \arcsin x \leq \frac{\pi}{2}$) — әкси функция.

МИСАЛ

1. $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$ мәнасини тапайли.

Йешилиши. Ениқлима бойичә $y = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$ функциясини $\sin y = \frac{\sqrt{2}}{2}$

түридә язимиз вә $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$. Шуңлашқа $y = \frac{\pi}{4}$, буниндин $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\pi}{3}.$$


II. $y = \cos x$ функциясигә әкси функция.

$y = \cos x$ функцияси $x \in [0; \pi]$ кесиндидә ениқланған бир қелипта
кемигүчи вә әзиниң барлиқ мәналарини, $-1 \leq \cos x \leq 1$, қобулқилиду. Демәк,
 $x \in [0; \pi]$ кесиндидә $y = \cos x$ функциясигә әкси функция бар.

$y = \cos x$ функциясигә әкси функция $y = \arccos x$
дәп бәлгүлинип, **аркосинус** икә дәп оқилиду.

$y = \arccos x$ функцияси $[-1; 1]$ кесиндидә
ениқланған, $[0; \pi]$ кесиндидә өзгиридиған бир
қелипта кемигүчи функция.

$y = \arccos x$ функциясиниң графиги $y = \cos x$
функциясиниң графигиға $y = x$ түзигә қариганда
симметриялик әгир сизик. Демәк, $y = x$ түзи — сим-
метрия оқи (38-сүрәт).



38-сүрәт

Әнди $y = \arccos x$ әксі тригонометриялик функциясиниң хусусийәтлеригә тохтилайлуқ:

- 1) функцияниң ениқлиниш даириси $[-1; 1]$ кесиндиси;
- 2) мәналар жиғиндиси $[0; \pi]$ кесиндиси;
- 3) функция жұпму әмәс, тағму әмәс;
- 4) функция бир қелипта кемигүчи.

Һәр қандақ $x \in [-1; 1]$ үчүн $x = \cos(\arccos x)$, $0 \leq \arccos x \leq \pi$ тәңлиги орунлиниду.

Демәк, $y = \cos x$ (бу йәрдә $x \in [0; \pi]$,


$-1 \leq \cos x \leq 1$) — тоғра функция;

$y = \arccos x$ (бу йәрдә $x \in [-1; 1]$, $0 \leq \arccos x \leq \pi$) — әксі функция.

Һәр қандақ $x \in [-1; 1]$ үчүн $\arccos x + \arccos(-x) = \pi$ яки

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x \quad (1)$$

тәңму-тәңлигини елишқа болиду. Мошу тәңму-тәңликниң орунлинидиғанлигини $y = \arccos x$ функциясиниң графигидин көрүшкә болиду (39-сүрәт).



39-сүрәт

МИСАЛ

2. $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$ мәнасини тапайли.

Йешилиши. $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$ ипадисиниң мәнасини тепиш үчүн (1)

тәңму-тәңликни қоллинимиз: $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi - \arccos\frac{1}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

Жаваби: $\frac{2\pi}{3}$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

Немишкә $\arccos\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ болиду?


III. $y = \operatorname{tg} x$ функциясигә әксі функция.

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида $y = \operatorname{tg} x$ функцияси ениқланған, бир қелипта өскүчи вә өзиниң барлиқ мәналарини қобул қилиду, $\operatorname{tg} x \in (-\infty; +\infty)$.

Демәк, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида $y = \operatorname{tg} x$ функциясигә әксі функция бар.

$y = \operatorname{tg} x$ функциясигә әксі функция $y = \operatorname{arctg} x$ дәп бәлгүлинип, *арктангенс* икс дәп оқилиду.

$y = \operatorname{arctg} x$ функцияси $x \in \mathbb{R}$ жиғиндисидә ениқланған, $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида өзгиридиған бир қелипта өскүчи функция. $y = \operatorname{arctg} x$ функциясиниң графиги $y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң графигиға $y = x$ түзигә қариганда симметриялик әгир сизик (40, а-сүрәт). Демәк, $y = x$ түзи симметрия оқи болуп һесаплиниду.



40, а-сүрәт

Әнди $y = \operatorname{arctg} x$ икс әкси тригонометриялик функциясиниң хусусийәт-лиригә тохтилайли:

1) функцияниң ениқлиниш даириси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in \mathbb{R}$;

2) мәналар жиғиндиси $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервали;

3) функция тағ, йәни һәр қандақ x үчүн $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x$;

4) функция бир қелипта өскүчи.

Һәр қандақ x үчүн

$$x = \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x), \quad -\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg} x < \frac{\pi}{2}.$$

МИСАЛ

3. $\operatorname{arctg} \sqrt{3}$ мәнасини һесаплайлуқ.

Йешилиши. Ениқлима бойичә $\operatorname{tg} y = \sqrt{3}$ вә $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$. Буниндин $y = \frac{\pi}{3}$. Шунин билән, $\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$.


Жаваби: $\frac{\pi}{3}$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

Немә үчүн $\operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$ болиду?

IV. $y = \operatorname{ctg} x$ функциясиға әкси функция.

$y = \operatorname{ctg} x$ функцияси $(0; \pi)$ интервалида ениқланған бир қелипта кемигүчи вә шу арилиқта $\mathbb{R}$ жиғиндисидики өзиниң барлиқ мәналарини қобул қилиду.



40, ә-сүрәт

Демәк, мошу интервалда $y = \operatorname{ctg} x$ функциягә әкси функция бар.

$y = \operatorname{ctg} x$ функциясигә әкси функция $y = \operatorname{arcctg} x$ дәп бәлгүлинип, **арктангенс икс** дәп оқилиду.

У вақитта $y = \operatorname{arcctg} x$ функцияси $x \in \mathbb{R}$ жиғиндисиде ениқланған, $(0; \pi)$ интервалида өзгиридиған бир қелипта кемигүчи функция.

$y = \operatorname{arcctg} x$ функциясиниң графиги $y = \operatorname{ctg} x$ функциясиниң графигиға $y = x$ түзигә қариганда симметриялик әгир сизик (40, ә-сүрәт). Демәк, $y = x$ түзи — симметрия оқи. $y = \operatorname{arcctg} x$ әкси

тригонометриялик функциясиниң хусусийәтлиригә тохтилайлуқ. Функцияниң:

1) ениқлиниш даириси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in \mathbb{R}$;

2) мәналар жиғиндиси $(0; \pi)$ арилиғи;

3) функция жүпму әмәс, тағму әмәс;

4) функция бир қелипта кемигүчи.

Һәр қандақ x үчүн $x = \operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} x)$, $0 < \operatorname{arcctg} y < \pi$;

$$\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg} x \quad (2)$$

тәңму-тәңлиги орунлиниду.

МИСАЛ4. $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$ мәнасини ҳесapлайлуқ.

Йешилиши. $\operatorname{arctg}(-x) = \pi - \operatorname{arctg}x$ тәңмү-тәңлиги бойичә, $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = \pi - \operatorname{arctg}\sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Жаваби $\frac{5\pi}{6}$ **ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР**Немә үчүн $\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{6}$ болиду?

Ипадиләрни ихчамлаш, ҳесapлаш, тәңлимиләрни йешиш, тәңмү-тәңликләрни испатлаш вақтида әкси тригометриялик функцияләрниң қоллинишиға мисаллар кәлтүрәйлуқ.

МИСАЛ5. x аргументи өзгириду $[-1; 1]$, $\cos(\arcsin x)$ -ипадисини ихчамлайлуқ.

Йешилиши. $\arcsin x = y$ дөп алайлуқ. y вақитта $x = \sin y$ вә $y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Әнди $\cos y$ -ни ениқлаш үчүн $\cos^2 y + \sin^2 y = 1$ тәңмү-тәңлигини қоллинимиз. Шу чағда $\cos^2 y = 1 - \sin^2 y$, демәк, $\cos^2 y = 1 - x^2$. $y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидә $\cos y \geq 0$. Шунлашқа $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$, йәни $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$.

Жаваби: $\sqrt{1 - x^2}$.**МИСАЛ**6. $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)\right)$ ипадисиниң мәнасини ҳесapлайли.

Йешилиши. Алди билән $\arccos\left(-\frac{3}{5}\right) = \phi$ дөп бөлгүләйли. Шу чағда $\cos \phi = -\frac{3}{5}$ вә $\frac{\pi}{2} < \phi < \pi$. Әнди йерим булуңниң формулисиға мувапик $\operatorname{tg}^2 \frac{\phi}{2} = \frac{1 - \cos \phi}{1 + \cos \phi} = \frac{1 + \frac{3}{5}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{8}{2} = 4$. Шу чағда $\operatorname{tg} \frac{\phi}{2} = \pm 2$ болиду. Һесапниң шәрти бойичә $\frac{\pi}{2} < \phi < \pi$, демәк, $\frac{\pi}{4} < \frac{\phi}{2} < \frac{\pi}{2}$, ал $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида $\operatorname{tg} \frac{\phi}{2} = 2$. Демәк, $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)\right) = 2$.

Жаваби: 2.

**ӘСТӘ
САҚЛАҢЛАР:**

1. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, бу йәрдә $x \in [-1; 1]$.
2. $\arctg x + \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$.



1. Немишкә $y = \sin x$ функциясиғә әкси функцияни $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидила қараштуримиз?
2. $y = \operatorname{ctg} x$ функциясиғә әкси функция болуш үчүн қандақ шәртләр орунлиниду?

Көнүкмиләр

А

6.1. Һесаплаңлар:

$$\begin{array}{lll} \text{а) } \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}; & \text{ә) } \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}; & \text{б) } \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}}; \\ \text{в) } \arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right); & \text{г) } \arcsin \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right); & \text{ғ) } \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right). \end{array}$$

6.2. Ипадиниң мәнасини тепиңлар:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } \operatorname{arctg}(-1) - \operatorname{arctg} 1; & \text{ә) } \arcsin(-1) - \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right); \\ \text{б) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) - \operatorname{arctg} \sqrt{3}; & \text{в) } \arcsin 1 + \operatorname{arctg} \sqrt{3}. \end{array}$$

6.3. Селиштуруңлар:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ вә } \arccos \frac{\sqrt{2}}{2}; & \text{ә) } \arcsin \frac{1}{2} \text{ вә } \operatorname{arctg} 1; \\ \text{б) } \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ вә } \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}}; & \text{в) } \operatorname{arctg}(-1) \text{ вә } \operatorname{arctg}(-1). \end{array}$$

Ипадиләрниң мәналирини тепиңлар (6.4—6.7):

$$\begin{array}{ll} \text{6.4. а) } \cos\left(\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right); & \text{ә) } \operatorname{tg}\left(\operatorname{arctg}(\sqrt{3})\right); \\ \text{б) } \sin\left(\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}\right); & \text{в) } \cos\left(\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}\right). \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{6.5. а) } \operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} \sqrt{3} - \arccos\left(-\frac{1}{2}\right); & \\ \text{ә) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \operatorname{arctg} \sqrt{3}; & \\ \text{б) } \arcsin(-1) - \frac{3}{2} \arccos \frac{1}{2} + 3 \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right); & \\ \text{в) } -4 \cdot \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 8 \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 15 \cdot \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3}. & \end{array}$$

В

$$\begin{array}{ll} \text{6.6. а) } \sin\left(\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right); & \text{ә) } \cos\left(\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}\right); \\ \text{б) } \cos\left(\operatorname{arctg}\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right); & \text{в) } \sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right). \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{6.7. а) } \operatorname{tg}\left(\pi + \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right); & \text{ә) } \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \operatorname{arctg} \sqrt{3}\right); \\ \text{б) } \cos(\pi - \arcsin(-1)); & \text{в) } \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \arccos(-1)\right). \end{array}$$

Калькуляторның яки жәдвәлнің ярдими билән ипадиләрнің мәнасини тепиңлар (6.8-6.9):

6.8.a) $\arcsin 0,5005$;

ә) $\arccos 0,8091$.

6.9.a) $\arctg 3,5$;

ә) $\arccos 0,2184$.

6.10. Тәңлимини йешиңлар:

a) $\arctg 2x = \frac{\pi}{6}$;

ә) $\arctg(-3x) = \frac{\pi}{4}$;

б) $2\arcsin(5x - 1) = -\frac{\pi}{2}$;

в) $3\arccos(2x + 3) = \frac{5\pi}{2}$.

6.11. Төвәндики ипадиләрнің мәнаси барму:

a) $\arcsin \sqrt{5}$;

ә) $\arctg \sqrt{7}$;

б) $\arccos \sqrt{3}$;

в) $\arctg 0$?

ӨЗӘННИ ТӘКШҮР!

1. $y = \frac{x}{\cos x}$ функциясиниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

A. $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;

B. $x \neq 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

C. $x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

D. $x \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2. $y = 3 + 2 \cos x$ функциясиниң мәналар жиғиндисини тепиңлар:


A. $[-1; 3]$;

B. $[-5; 0]$;

C. $[1; 5]$;

D. $[3; 5]$.

3. Сүрәттә қайси функцияниң графиги тәсвирләнгән?



A. $y = \sin 2x$;

B. $y = \cos \frac{x}{2}$;

C. $y = \cos 2x$;

D. $y = \sin \frac{x}{2}$.

4. $y = \sin 4x + \frac{1}{x-3}$ функциясиниң ениқлиниш саһасини тепиңлар:

A. $(-\infty; 3)$;

B. $(-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$;

C. $[0; 3]$;

D. $(-3; +\infty)$.

5. $y = 3\cos^2 x - 1$ функциясиниң мәналар жиғиндисини ениқлаңлар:

A. $[1; 2]$;

B. $[-1; 3]$;

C. $[-1; 2]$;

D. $[0; 3]$.

6. $\arcsin \frac{1}{2} - \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$ ипадисиниң мәнаси немигә тәң?

A. $\frac{\pi}{3}$;

B. $\frac{\pi}{6}$;

C. $\frac{\pi}{4}$;

D. 0.


7. Сүрәттә қайси функцияниң графиги тәсвирләнгән?

A. $y = \cos 2x$;

B. $y = -2 \cos x$;

C. $y = 2 \cos x$;

D. $y = 2 \sin x$.



8. $\arcsin 1 - \arccos 0 - 2\arctg 0$ ипадисиниң мәнасини тепиңлар:
 A. 0; B. -1; C. 1; D. 2.
9. $\arcsin \frac{1}{2}$ вә $\arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ санлирини селиштуруңлар:
 A. $\arcsin \frac{1}{2} = \arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; B. $\arcsin \frac{1}{2} > \arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;
 C. $\arcsin \frac{1}{2} < \arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; D. $\arcsin \frac{1}{2} \leq \arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
10. $y = \cos x$ функциясиниң графигиға қанчә түрлөндүрүш арқилиқ $y = 3\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$ функциясиниң графигини елишқа болиду?
 A. 2; B. 3; C. 4; D. 5.
11. $\arctg 0 - \arccos \frac{1}{2} - \arcsin \frac{1}{2} + \arctg 0$ ипадиси мәнасиниң квадрати немигә тәң?
 A. 2; B. 1; C. 4; D. 0.

Математикалық саватлық бойичә тапшурмилар

12. Квадратниң мәйдани 81 см^2 . Төрәплириниң узунлиғи берилгән квадрат төрәплириниң 25% -ни тәшкил қилидиған иккинчи квадратниң периметрини тепиңлар:
 A. 18; B. 10; C. 4; D. 0; E. 15.
13. 15 кг нәшпүт билән 6 кг алминиң нәрқи 5 кг нәшпүт билән 18 кг алминиң нәрқи билән бирдәк. 1 кг нәшпүтниң баһаси 1 кг алминиң баһасидин қанчә һәссә артуқ?
 A. 2 һәссә; B. 3 һәссә; C. 25 һәссә; D. 1,5 һәссә; E. 1,2 һәссә.
14. 25 саниға бөлгәндә қалдуқта бир санини беридиған әң чоң үч ханилиқ санини тепиңлар:
 A. 976; B. 975; C. 974; D. 966; E. 964.
15. Жәдвәлдики санлар қандақту бир қанунийәтлик билән қурашту-рулған бөлгүсиз санини тепиңлар:

3	5
4	50

2	6
5	50

4	7
5	?

- A. 150; B. 160; C. 140; D. 130; E. 170.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тригонометриялик функцияларниң ениқлимилири, хусусийәтлири, графиклири, формулилири, әкси тригонометриялик функциялар, тәңмүтәң түрлөндүрүшләр.

ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘР БИЛӘН ТӘҢСИЗЛИКЛӘР

3

§7. АДДИЙ ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘР

Асасий чүшәнчиләр

тәңлимә, тригонометрия,
тәңлиминиң йешилиши



Силәр аддий тригонометриялик тәңлимиләр чүшәнчиси билән тонуштуңлар вә аддий тригонометриялик тәңлимиләрни чиқиришни үгинисиләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

Силәр тригонометриялик тәңму-тәңликләрни, формулиларни, тригонометриялик функцияләрниң хусусийәтлирини, алгебрилик тәңлимиләрни йешиш усуллирини билисиләр.

Өзгәрмиси тригонометриялик функцияниң аргументи ретидә (яки аргументиниң тәркивидә) берилгән тәңлимини тригонометриялик тәңлимә дәп атайду.

Мәсилән, $2\sin x = 1$; $\operatorname{ctg} x = 1$; $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = -2$; $3\cos x = 7\sin x$; $4\sin^2 x + 2\cos^2 x = 3\sin^2 x$; $\cos 5x \cdot \cos x = \cos 4x \cdot \cos 2x$ в.ш.о.

$$\sin x = a, \cos x = a, \operatorname{tg} x = a, \operatorname{ctg} x = a \quad (1)$$

(бу йәрдә a сани һәр қандақ һәқиқий сан) түридә берилгән тригонометриялик тәңлимиләрни аддий тригонометриялик тәңлимиләр дәп атайду.

Берилгән тәңлимини дурус тәңму-тәңликкә айналдуридиган аргументниң мәналирини тепши тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш дәп атилиду.

Тригонометриялик тәңлимиләрни йешишниң өзигә хас алаһидә усуллири бар:

1) тригонометриялик тәңлиминиң бир томури бар болса, у чағда униң чәксиз томурлири болиду;

2) башқа тәңлимиләр охшаш тригонометриялик тәңлимини униң икки бөлигигә умумий көпәйткүч болидиған тригонометриялик функциягә бөлүшкә болмайду, сәвәви тәңлиминиң әң болмиғанда бир йешилиши йоқилиду.

Һәр қандақ тригонометриялик тәңлимә тәңму-тәң түрлөндүрүштин кейин (1) түридики тәңлимиләрниң биригә келиду.


Әнди аддий тәңлимиләрни йешишни қараштуримиз.

I. $\sin x = a$ тәңлимисини йешәйли.

$y = \sin x$ функциясиниң ениқлиниш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in \mathbb{R}$. Мәналар жиғиндиси $[-1; 1]$ кесиндиси, йәни $|\sin x| \leq 1$, функция чәкләнгән.

Шуңлашқа $\sin x = a$ тәңлимисиниң $|a| \leq 1$ шәрти орунланғандила йешилиши болиду. әгәр a сани модули бойиче бирдин чоң, йәни $|a| > 1$ болса, у чағда $\sin x = a$ тәңлимисиниң йешилиши болмайду.

Әнди $\sin x = a$, бу йәрдә $|a| \leq 1$, тәңлимисиниң йешилишини қараштуримиз. $\sin x = a$ тәңлимисини йешиш үчүн $y = \sin x$ вә $y = a$ функция графиклирини бир координатилиқ тәкшилиқкә салимиз (41-сүрәт).



41-сүрәт

Абсцисса оқиға параллель $y = a$ түзи синусоида әгири билән чәксиз көп чекитләрдә қийилишиду. Қийилишиш чекитлириниң абсциссилири $\sin x = a$ тәңлимисиниң йешилишлири болуп һесаплиниду. $y = \sin x$ функцияси периодлуқ функция болғанлиқтин, $\sin x = a$ тәңлимисиниң бир период ичидики барлиқ йешилишлирини тапсақ йетәрлик. Қалған йешилишлири функцияниң периодлуқ хусусийити билән ениқлиниду. Аргумент $[0; 2\pi]$ кесиндисидә өзгәргәндә, $\sin x = a$ тәңлимисиниң $y = a$ түзи билән қийилишиш чекитлириниң абсциссилири $x_1 = \alpha$, $x_2 = \pi - \alpha$ болиду.

Әнди $\sin x$ функциясиниң периоды 2π -гә тәң экәнлигини нәзәргә тутуп, тәңлиминиң барлиқ йешилишлирини йезиш үчүн мону формулиларни чиқиримиз:

$$x = \alpha + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

$$x = \pi - \alpha + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad (3)$$

Мошу йешилишлирини бир формула билән беришкә болиду:

$$x = (-1)^n \alpha + \pi n; n \in \mathbb{Z}. \quad (4)$$

(4)-формулидин (2) вә (3) формулилар билән берилгән йезилған йешилишлирини елишкә болидиғанлиғиға көз йәткүзимиз.

Әгәр $n = 2k$ болса, у чағда (4)-формулидин

$$x = (-1)^{2k} \cdot \alpha + 2\pi k = \alpha + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Бу (2)-формулини бериду.

Әнди $n = 2k + 1$ болса, у чағда (4) формулидин

$$x = (-1)^{2k+1} \cdot \alpha + \pi(2k + 1) = -\alpha + 2\pi k + \pi = \pi - \alpha + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Бу (3)-формулини бериду.

$\sin \alpha = a$ болса, у чағда $\alpha = \arcsin a$ экәнлигини нәзәрдә тутуп, (4)-формулини мундақ язимиз:

$$x = (-1)^n \cdot \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad (5)$$

(5)-формула $\sin x = a$ тәңлимисиниң йешилишиниң умумий түри болуп һесаплиниду.

$\sin x = a$ тәңлимисиниң айрим йешилишлири төвәндики 7-жәдвәлдә кәлтүрүлгән.

$\sin x = 1$	$\sin x = -1$	$\sin x = 0$
$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$	$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$

МИСАЛ

1. $2 \sin x = \sqrt{3}$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $x = (-1)^n \cdot \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Әнди $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$ әскә алсақ, у чағда $x = (-1)^n \cdot \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. Бу тәңлиминиң радианлиқ йешилишлири, градуслуқ йешилишлири $x = (-1)^n \cdot 60^\circ + 180^\circ \cdot n, n \in \mathbb{Z}$.

Жаваби: $(-1)^n \cdot \frac{\pi}{3} + \pi n$ яки $(-1)^n \cdot 60^\circ + 180^\circ \cdot n, n \in \mathbb{Z}$.

Тригонометриялиқ тәңлимиләрниң йешилишини радианлиқ яки градуслиқ түрдә көрситишкә болиду. Алдидики вақитта йешилишни бирла түрдә беримиз.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$2 \sin(2x - 1) = 1$ тәңлимисиниң йешилишини чүшәндүрүңлар.

Йешилиши. $\sin(2x - 1) = \frac{1}{2}$;

$2x - 1 = (-1)^n \arcsin \frac{1}{2} + \pi n; n \in \mathbb{Z}$;

$2x = 1 + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi \cdot n; n \in \mathbb{Z}$;


$x = \frac{1}{2} + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} n, n \in \mathbb{Z}$.

Жаваби: $\frac{1}{2} + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} n, n \in \mathbb{Z}$.

II. $\cos x = a$ тәңлиминиң йешилишлирини ениқлайлуқ.

$y = \cos x$ функциясиниң ениқлиниш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси ($x \in \mathbb{R}$), функцияниң мәналар жиғиндиси $[-1; 1]$ кесиндиси, йәни $|\cos x| \leq 1$ функция чәкләнгән. Әгәр тәңлиминиң оң тәрипидики сан $|a| > 1$ болса, у чағда $\cos x = a$ тәңлиминиң йешилиши йоқ. Шуңлашқа тәңлиминиң оң тәрипидики a сани $|a| \leq 1$ шәртини қанаәтләндүриши керәк.

Әнди $\cos x = a$ (бу йәрдә $|a| \leq 1$) тәңлимисиниң йешилишини тепиш үчүн косинусоида әгирини вә ордината оқиға параллель $y = a$ түзиниң графиглирини бир координатилиқ тәкшиликкә салимиз (42-сүрәт).



42-сүрәт

Косинусоида билэн $y = a$ түзи чәксиз көп чекитләрдә қийилишиду. Қийилишиш чекитлириниң абсциссилари $\cos x = a$ тәңлимисиниң йешилишлири болиду.

$y = \cos x$ периодлуқ функция, униң әң кичик ижабий периоды 2π . Шунлашқа $\cos x = a$ тәңлимисиниң бир период ичидики барлиқ йешилишлирини тапсақ йетәрлик. Қалған йешилишлири функцияниң периодлуғи билэн ениқлиниду. Шунин билән биллә функция жүп болғанлиқтин, $[-\pi; \pi]$ кесиндисидә $y = \cos x$ функцияси билән $y = a$ ($0 < a < 1$) түзниң қийилишиш чекитлириниң абсциссилари симметриялик санлар болиду. Демәк, a сани $\cos x = a$ тәңлимисиниң бир йешилиши болса, у чағда униң иккинчи йешилиши $(-\alpha)$.

Әнди $\cos x$ функциясиниң периоды 2π тәң экәнлигини нәзәрдә тутуп,

$$x = \alpha + 2\pi n; n \in Z. \quad (6)$$

$$x = -\alpha + 2\pi n; n \in Z. \quad (7)$$

Мошу формулиларни бириктүрүп йезишқа болиду, йәни

$$x = \pm \alpha + 2\pi n; n \in Z. \quad (8)$$

Әнди $\cos \alpha = a$ болса, у чағда $\alpha = \arccos a$ экәнлигини нәзәрдә тутуп, (8) формулини мону түрдә йезишқа болиду:

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n; n \in Z. \quad (9)$$

(9)-формула $\cos x = a$ тәңлимисиниң йешилишиниң умумий түри. $\cos x = a$ тәңлимисиниң айрим йешилишлири 8-жәдвәлдә кәлтүрүлгән.

8-жәдвәл

$\cos x = 1$	$\cos x = -1$	$\cos x = 0$
$x = 2\pi n, n \in Z$	$x = \pi + 2\pi n, n \in Z$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$

МИСАЛ

2. $2\cos x = -1$ тәңлимисиниң йешилишини тапайли.

Йешилиши. Берилгән тәңлимини йешиш үчүн икки тәрәп бөлигини

2 гә бөлимиз: $\cos x = -\frac{1}{2}$, у чағда $x = \pm \arccos(-\frac{1}{2}) + 2\pi n, n \in Z$;

$$x = \pm (\pi - \arccos \frac{1}{2}) + 2\pi n, n \in Z;$$

$$x = \pm (\pi - \frac{\pi}{3}) + 2\pi n, n \in Z;$$

$$x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z.$$


$$\text{Жаваби : } \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z.$$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

Немишкә $3\cos x = 4$ тәңлимисиниң йешилиши болмайду?

III. $\operatorname{tg} x = a$ вә $\operatorname{ctg} x = a$ тәңлимилириниң йешилишлирини тапайли.

Барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси $y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң мәнәлар жиғиндиси экәнлиги бөлгүлүк, йәни $\operatorname{tg} x \in R$. Шунлашқа $\operatorname{tg} x = a$ тәңлимисиниң a ниң һәр қандақ мәнәсида йешилиши бар.



43-сүрәт

$y = \operatorname{tg} x$ функциясининң графиги тангенсоида әгири $y = a$ түзи билән, һәр қандақ период ичидә, бирла чекиттә қийилишиду. Шу қийилишиш чекитиниң абсциссиси $\operatorname{tg} x = a$ тәңлимисиниң йешилиши (43-сүрәт).

Қалған йешилишлири функцияниң периодлуқ хусусийити билән ениқлиниду.

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида $\operatorname{tg} x = a$ тәңлимисиниң йешилишини α дәп ойлисақ, у чағда тәңлиминиң барлиқ йешимлири $x = \alpha + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ формулиси билән ениқлиниду. $\operatorname{tg} \alpha = a$, әнди $\alpha = \operatorname{arctg} a$ болғанлиқтин, ахирқи формула мону түргә келиду:

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad (10)$$

(10) формула $\operatorname{tg} x = a$ тәңлимисиниң йешилишиниң умумий түри. Дәл мошундақ $\operatorname{ctg} x = a$ тәңлимисиниң йешилишлири умумий түрдә берилгән

$$x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z} \quad (11)$$

формулиси билән ениқлиниду.

$\operatorname{tg} x = a$ вә $\operatorname{ctg} x = a$ тәңлимилириниң айрим йешилишлири төвәндики 9-, 10-жәдвәлдә берилгән:

9-жәдвәл

$\operatorname{tg} x = 1$	$\operatorname{tg} x = -1$	$\operatorname{tg} x = 0$
$x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	$x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$

10-жәдвәл

$\operatorname{ctg} x = 1$	$\operatorname{ctg} x = -1$	$\operatorname{ctg} x = 0$
$x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	$x = \frac{3\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

МИСАЛ

3. $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. $x = \operatorname{arctg} \sqrt{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. Әнди $\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ экәнлигини нәзәргә алсақ, $x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Жаваби : $\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

ЧҮШЭНДҮРҮҢЛАР

$\operatorname{ctg} \frac{x}{2} = 1$ тәңлимиси қандақ йешилгән?

Йешилиши. $\frac{x}{2} = \operatorname{arctg} 1 + n\pi; \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + n\pi, n \in \mathbb{Z};$

$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

Жаваби: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

МИСАЛ

4. $2\sin x = \sqrt{3}$ тәңлимисиниң $[-\pi; \pi]$ арилиғиға тәәллүк йешилиш-лирини тапайли.

Йешилиши: Алди билән тәңлиминиң умумий йешилишини ениқлаймиз.

$$2\sin x = \sqrt{3}; \quad \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x = (-1)^n \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$x = (-1)^n \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Өнди n -ниң орниға мәнә бериш арқилиқ тәңлиминиң берилгән арилиққа тәәллүк йешилишини тапимиз.

$$n = 0, x = (-1)^0 \cdot \frac{\pi}{3} + \pi \cdot 0 = \frac{\pi}{3};$$

$$n = 1, x = (-1)^1 \cdot \frac{\pi}{3} + \pi \cdot 1 = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3};$$

$$n = -1, x = (-1)^{-1} \cdot \frac{\pi}{3} + \pi \cdot (-1) = -\frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{4\pi}{3} \text{ вә т.с.с.}$$

$$\text{Шу чағда } \frac{\pi}{3} \in [-\pi; \pi]; \quad \frac{2\pi}{3} \in [-\pi; \pi]; \quad -\frac{4\pi}{3} \in [-\pi; \pi].$$

Жаваби: $\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}.$



1. Тригонометриялик тәңлимиләр билән алгебрилик тәңлимиләрниң арисидә қандақ пәриқ бар?
2. Тригонометриялик тәңлимиләр йешилишиниң чәксиз көп болуш сәвәви немидә? Алгебрилик тәңлимиләрдә мошундақ һаләтләр учришамду? Жававиңларни чүшәндүрүңлар.
3. Тригонометриялик тәңлиминиң һәр икки қисмидики бирдәк көпәйткүч тригонометриялик функция болған һаләттә қандақ түрлиниш қолли-нилиду?
4. $2\sin x + \cos x = 3$ тәңлимиси аддий тригонометриялик тәңлимисигә ятамду?

Көнүкмиләр

А

Тәңлимини йешиңләр (7.1—7.4):

$$7.1. \text{ а) } \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \text{ә) } \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \text{б) } \cos x = \frac{1}{2}; \quad \text{в) } \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$7.2. \text{ а) } \operatorname{tg} x = 2; \quad \text{ә) } \operatorname{ctg} x = -3; \quad \text{б) } \operatorname{tg} x = -\sqrt{3}; \quad \text{в) } \operatorname{ctg} x = \sqrt{3}?$$

$$7.3. \text{ а) } \sin \frac{x}{3} = 0; \quad \text{ә) } \cos 2x = 0;$$

б) $5\cos 3x - 5 = 0$;

7.4. а) $\operatorname{tg}(x - 2) = 0$;

б) $2 \sin 3x + 1 = 0$;

в) $6\sin 5x + 6 = 0$.

ә) $\operatorname{ctg}(x + 3) = 0$;

в) $\cos \frac{x}{2} - 0,5 = 0$.

Берилген ариликқа тәәллүк тәңлиминиң йешилишлирини тепиңлар (7.5-7.6):

7.5. а) $\sin \phi = -1, \phi \in [0; 2\pi]$;

б) $\operatorname{tg} \phi = \sqrt{3}, \phi \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$;

7.6. а) $\sin \phi = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \phi \in [-\pi; \pi]$;

б) $\operatorname{tg} \phi = -\sqrt{3}, \phi \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$;

ә) $\operatorname{ctg} \phi = 1, \phi \in [-\pi; \pi]$;

в) $\cos \phi = -1, \phi \in [0; 2\pi]$.

ә) $2\cos \phi = \sqrt{3}, \phi \in [-\pi; \pi]$;

в) $\operatorname{ctg} \phi = \frac{\sqrt{3}}{3}, \phi \in (0; \pi)$.

В

Тәңлимини йешиңлар (7.7—7.12):

7.7. а) $3\operatorname{tg} 2x - \sqrt{3} = 0$;

б) $2\sin 2x - \sqrt{2} = 0$;

7.8. а) $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 0$;

б) $\operatorname{tg}\left(\pi + \frac{x}{3}\right) - 1 = 0$;

7.9. а) $3\operatorname{tg}\left(\frac{2x}{3} + 2\right) = -4$;

б) $2\sin\left(\frac{2x}{5} + 3\right) = \sqrt{3}$;

7.10. а) $\sin 3x \cdot \cos 3x = -\frac{1}{2}$;

б) $\frac{2\operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg}^2 2x} = \sqrt{3}$;

7.11. а) $\sin 6x - \sin 4x = 0$;

7.12. а) $\cos 7x - \cos 5x = 0$;

ә) $-\sqrt{3} \operatorname{ctg} 4x + 3 = 0$;

в) $-2\cos 2x + \sqrt{3} = 0$.

ә) $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right) - 1 = 0$;

в) $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{3} - 4x\right) = \sqrt{3}$.

ә) $4\operatorname{ctg}\left(\frac{3x}{2} - 1\right) - 3 = 0$;

в) $\sqrt{3} \cos\left(\frac{5x}{2} - 1\right) + 2 = 0$.

ә) $\sin^2 2x - \cos^2 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

в) $2\sin^2 4x - 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

ә) $\cos 5x + \cos 3x = 0$.

ә) $\sin 9x - \sin 13x = 0$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тригометриялик тәңлимиләр, тәңлимиләр системиси, уларни йешиши усуллири, тригонометриялик тәңму-тәңликлар, формулилар, тәңлиминиң томурлири.

§8. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘРНИ ЙЕШИШ

Асасий чүшәнчиләр

Тәңлимә, тригонометриялик тәңлимә, тәңлимини йешиш усуллары



Силәр тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш усуллары билән тонушусиләр.

Алдыңқи мавзуда аддий тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш йоллары билән тонуштуңлар. Әнди бәзи бир тригонометриялик тәңлимиләрниң түрлерини йешишниң умумий һалитини қараштуримиз. Тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш үчүн уларни тәңму-тәңлик түрләндүрүшләр арқилиқ аддий тригонометриялик тәңлимиләргә кәлтүрүш керәк экәнлиги жуқурида ейтилған.



Бирла тригонометриялик функциягә бағлиқ берилгән, алгебрилик тәңлимиләргә кәлтүрилидиған тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни үгинисиләр.

МИСАЛ

1. $2\cos^2 x + 3\cos x - 2 = 0$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. Берилгән тәңлимә $\cos x$ функциясигә нисбәтән квадратлиқ тәңлимә болуп һесаплиниду. Шуңлашқа $\cos x = u$ алмаштурушни орунлисақ, у чағда $2u^2 + 3u - 2 = 0$, квадратлиқ тәңлимини алимиз, униң томурлары $u_1 = -2$; $u_2 = \frac{1}{2}$.

Шу чағда берилгән тәңлимә $\cos x$ функциясигә нисбәтән $\cos x = -2$ вә $\cos x = \frac{1}{2}$ түридики аддий икки тәңлимигә келиду.

$\cos x = -2$ тәңлимисиниң йешилиши йоқ, сәвәви $|-2| > 1$.

$\cos x = \frac{1}{2}$, $x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi n = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Жаваби : $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.



Тригонометриялик формуларни қоллиниш арқилиқ йешилидиған тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни үгинисиләр.

МИСАЛ

2. $\sin 2x = \frac{3}{2} \sin x$ тәңлимисини йешиңлар.

Йешилиши. $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ формулисини пайдилинип, берилгән функцияни аргументлары бирдәк тригонометриялик функциягә кәлтүримиз: $2\sin x \cos x = \frac{3}{2} \sin x$, мошуниндин $2\sin x \cos x - \frac{3}{2} \sin x = 0$; $\sin x(2\cos x - \frac{3}{2}) = 0$. Тәңлимә икки аддий тәңлимигә кәлди: $\sin x = 0$, $2\cos x - \frac{3}{2} = 0$.

Шуниң билән, $\sin x = 0$, $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$2\cos x = \frac{3}{2}$; $\cos x = \frac{3}{4}$; $x = \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Жаваби : πn , $n \in \mathbb{Z}$; $\pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

МИСАЛ

3. $3\operatorname{tg}x - \operatorname{ctg}x = 0$ теңлимисини йешиңлар.

Йешилиши. $\operatorname{tg}x \cdot \operatorname{ctg}x = 1$ формулисидин елинған $\operatorname{tg}x = \frac{1}{\operatorname{ctg}x}$ ипадисини берилген теңлимиге қоямыз: $3 \frac{1}{\operatorname{ctg}x} - \operatorname{ctg}x = 0$, $3 - \operatorname{ctg}^2x = 0$, $\operatorname{ctg}^2x = 3$; $\operatorname{ctg}x = \pm\sqrt{3}$, йәни $\operatorname{ctg}x = \sqrt{3}$; $\operatorname{ctg}x = -\sqrt{3}$.

Берилген теңлиме икки аддий теңлимиге кәлди. Уның йешилишлири:

1) $\operatorname{ctg}x = \sqrt{3}$, $x = \frac{\pi}{6} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; 2) $\operatorname{ctg}x = -\sqrt{3}$, $x = \frac{5\pi}{6} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Жаваби : $\frac{\pi}{6} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

МИСАЛ

4. $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$ теңлимисини йешәйли.

Йешилиши. Берилген теңлимини йешиш үчүн қошулғучларни топлаймыз: $(\cos x + \cos 3x) + \cos 2x = 0$. Скобка ичидики ипадиге косинусларның қошундисиниң формулисини қоллинимиз: $2\cos \frac{x+3x}{2} \cdot \cos \frac{x-3x}{2} + \cos 2x = 0$; $2\cos 2x \cdot \cos(-x) + \cos 2x = 0$. Әнди умумий көпәйткүчни скобкиның сиртиға чиқиримиз: $\cos 2x(2\cos x + 1) = 0$. Шунда $\cos 2x = 0$ вә $2\cos x + 1 = 0$ теңлимилирини алимиз. Буниндин $\cos 2x = 0$; $2x = \frac{\pi}{2} + \pi n$; $x = \frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

$$2\cos x + 1 = 0; 2\cos x = -1; \cos x = -\frac{1}{2};$$

$$x = \pm \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) + 2\pi n \text{ яки } x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Жаваби : $\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$; $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

МИСАЛ

5. $\cos 4x \cos 2x = \cos 5x \cos x$ теңлимисини йешәйли.

Йешилиши. Тригонометриялик теңлимиләрни қоллинип, көпәйтіндә түридә берилген ипадиләрни қошунда билән алмаштуримиз: $\cos 4x \cos 2x = \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 2x)$, әнди $\cos 5x \cos x = \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 4x)$. У чағда берилген теңлиме мундақ йезилиду:

$$\frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 2x) = \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 4x),$$

$$\cos 6x + \cos 2x - \cos 6x - \cos 4x = 0,$$

$$\cos 2x - \cos 4x = 0.$$

Әнди косинусларни айримисиниң формулисини қоллинимиз:

$$2\sin 3x \cdot \sin x = 0.$$

Әгәр $\sin 3x = 0$ болса, у чағда $3x = \pi n$, $x = \frac{\pi}{3} n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Әгәр $\sin x = 0$ болса, у чағда $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Йешилишлириниң икки топини бир формулиға бириктүрүшкә болиду, йәни

$$x = \frac{\pi}{3} n, n \in \mathbb{Z}.$$

Жаваби : $\frac{\pi}{3} n$, $n \in \mathbb{Z}$.



Бир хил тригонометриялик теңлимиләрни йешишни үгинисиләр.

Бир хил тригонометриялик тәңлимиләр дәп һәр бир қошулғучниң дәрижә көрсәткүчилири өз ара тәң болидиған тәңлимиләрни алимиз.

МИСАЛ

6. $10\sin^2 x = 1 + 3\cos^2 x$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши . Тәңлиминиң оң төрәп белигидики 1 санини биринчи тригонометриялик тәңму-тәңлик билән алмаштуримиз.

$$10\sin^2 x = \sin^2 x + \cos^2 x + 3\cos^2 x \text{ яки } 9\sin^2 x - 4\cos^2 x = 0.$$

Мошу чиққан тәңлиминиң сол төрипидә турған қошулғучларниң һәр қайсисиниң дәрижиси 2 гә тәң. Демәк, берилгән тәңлимә — иккинчи дәрижилик бир хил тәңлимә. Бу тәңлимини йешиш үчүн тәңлиминиң икки төрипини өзалап $\cos^2 x \neq 0$ яки $\sin^2 x \neq 0$ функциясигә бөлүмиз.

Өгәр $\cos^2 x \neq 0$ -гә бөлсәк, у чағда $\operatorname{tg} x$, әнди $\sin^2 x \neq 0$ бөлсәк, у чағда $\operatorname{ctg} x$ функциясигә нисбәтән квадрат тәңлимигә келимиз. Биринчи һаләтни қараштурайли:

$$\frac{9\sin^2 x}{\cos^2 x} - \frac{4\cos^2 x}{\cos^2 x} = 0; 9\operatorname{tg}^2 x - 4 = 0.$$

$$\text{Буниндин } (3\operatorname{tg} x - 2) \cdot (3\operatorname{tg} x + 2) = 0.$$

$$3\operatorname{tg} x - 2 = 0; 3\operatorname{tg} x + 2 = 0.$$

$$\text{Шуниң билән, } 3\operatorname{tg} x = 2; \operatorname{tg} x = \frac{2}{3}, x_1 = \operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \pi k, k \in Z;$$

$$3\operatorname{tg} x = -2; \operatorname{tg} x = -\frac{2}{3}, x_2 = \operatorname{arctg} \left(-\frac{2}{3}\right) + \pi n, n \in Z;$$

$$\operatorname{arctg} \left(-\frac{2}{3}\right) = -\operatorname{arctg} \frac{2}{3} \text{ болғанлиқтин, } x_2 = -\operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \pi n, n \in Z.$$

$$\text{Җаваби : } \operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \pi k, k \in Z; -\operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \pi n, n \in Z.$$



1. Тригонометриялик тәңлимиләрниң йешилишлири немишкә чәксиз көп?
2. Тригонометриялик тәңлимиләрни йешишниң алгебрилик тәңлимиләрни йешиштин немә пәрқи бар?

Көнүкмиләр

А

Тәңлимиләрни йешиңлар (8.1-8.4):

8.1. а) $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0;$

б) $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0;$

8.2. а) $3\cos^2 x + 10\cos x + 3 = 0;$

б) $2 + \cos^2 x = 2\sin x;$

8.3. а) $\operatorname{tg} x + 3\operatorname{ctg} x = 4;$

б) $\operatorname{tg}^2 x - 1 = 0;$

8.4. а) $\cos 7x + \cos x = 0;$

б) $\sin^2 x + \sin 2x = 1;$

ә) $2\cos^2 x - 2\cos x - 1 = 0;$

в) $6\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 2 = 0.$

ә) $2\sin^2 x + 5\sin x + 2 = 0;$

в) $3 - 3\cos x = 2\sin^2 x.$

ә) $\operatorname{tg} x - 4\operatorname{ctg} x = 3;$

в) $\operatorname{ctg}^2 x - 3 = 0.$

ә) $\sin 7x - \sin x = 0;$

в) $\cos^2 x - \sin 2x = 1.$

Тәңлиминиң томурлирини тепиңлар (8.5-8.6):

8.5. а) $3\sin 2x + \sin x \cdot \cos x = 2\cos 2x;$

ә) $2\cos 2x - 3\sin x \cdot \cos x + \sin 2x = 0.$

- 8.6. а) $9\sin x \cos x - 7\cos^2 x = 2\sin^2 x$;
 ө) $2\sin^2 x - \sin x \cos x = \cos^2 x$.

В

Тәңлимиләрни йешиңләр (8.7-8.12):

- 8.7. а) $5\sin^2 x + 4\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 4$; ө) $6\cos^2 x + 5\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 7$.
 8.8. а) $4\sin^2 x - 2\sin x \cdot \cos x = 3$; ө) $\cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos x - 1$.
 8.9. а) $\sin^2 x + \frac{1}{2}\sin 2x = 0$; ө) $\cos^2 x - \frac{1}{2}\sin 2x = 0$.
 8.10. а) $2\sin^2 x = \sqrt{3}\sin 2x$; ө) $\sqrt{3}\operatorname{tg} x - \sqrt{3}\operatorname{ctg} x = 2$;
 б) $\sin 2x + 2\cos 2x = 1$; в) $3\sin 2x + \cos 2x = 2\cos^2 x$;
 г) $\cos^2 x + 4\sin^2 x = 2\sin 2x$.
 8.11. а) $6\sin^2 x = 4 + \sin 2x$; ө) $3\sin 2x + 8\cos^2 x = 7$.
 8.12. а) $\sin 2x \cdot \cos 4x = \sin 7x \cdot \sin 9x$;
 ө) $\cos 10x \cdot \cos 7x - \cos 2x \cdot \cos 15x = 0$;
 б) $\sin 5x \cdot \sin 3x + \cos 7x \cdot \cos x = 0$;
 в) $\cos x \cdot \sin 5x = \cos 2x \cdot \sin 4x$;
 г) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 0$;
 ф) $\sin 3x \cdot \sin^2 x = \sin 3x \cdot \cos^2 x$.

Тәңлиминиң томурлирини тепиңлар (8.13-8.14):

- 8.13. а) $2\sin^2 2x + 3\cos^2 2x = 5\sin 2x \cdot \cos 2x$;
 ө) $3\sin^2 2x - \sin 2x \cdot \cos 2x - 4\cos^2 2x = 0$.
 8.14. а) $3\sin^2 \frac{x}{3} + 2\cos^2 \frac{x}{3} - 7\sin \frac{x}{3} \cdot \cos \frac{x}{3} = 0$;
 ө) $2\cos^2 3x + \sin^2 3x - 3\sin 3x \cos 3x = 0$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тригонометриялик функциялар, уларниң ениқлиниш даурилири, мәналар жигиндиси, хусусийәтлири, графиклири, тригонометриялик формулилири, әкси тригонометриялик функциялар.

§ 9. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢСИЗЛИКЛӘРНИ ЙЕШИШ

Асасий чүшәнчиләр

Тәңсизлик, тригонометриялик тәңсизлик, функция графиги



Силәр тригонометриялик тәңсизликләр чүшәнчиси билән тонушусиләр, тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни үгинисиләр.

Алдинқи мавзуда тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни қараштурдуқ. Һәр қандақ тригонометриялик тәңлимиләр тәңмүтәң түрләндрүш арқилиқ аддий тригонометриялик тәңлимиләргә кәлтүрүлүп йешилидиғанлиғиға көз йөткүздүқ.

Әнди тригонометриялик тәңсизликләрни йешишкә тохтилимиз. Тригонометриялик тәңсизликләрни йешишни аддий тригонометриялик тәңсизликләрни йешиштин башлаймиз. Сөвәви, һәр қандақ тригонометриялик тәңсизликләр тәңмү-тәң түрләнгәндин кейин монү тәңсизликләрниң әң болмиғанда биригә келиду:

$$\begin{aligned} \sin x &\leq a; \sin x \geq a; \sin x < a; \sin x > a; \\ \cos x &\leq a; \cos x \geq a; \cos x < a; \cos x > a; \\ \operatorname{tg} x &\leq a; \operatorname{tg} x \geq a; \operatorname{tg} x < a; \operatorname{tg} x > a; \\ \operatorname{ctg} x &\leq a; \operatorname{ctg} x \geq a; \operatorname{ctg} x < a; \operatorname{ctg} x > a, \end{aligned} \quad (1)$$

бу йәрдә $a \in \mathbb{R}$.

(1) түридә берилгән тәңсизликләр аддий тригонометриялик тәңсизликләр дәп атилиду.

АЛГОРИТМ

Аддий тригонометриялик тәңсизликләр графиклик усул билән чиқирилиду. Атап ейтқанда, аддий тригонометриялик тәңсизликләрни йешиш үчүн функцияниң графиги вә чәмбәр қоллинилиду.

Тригонометриялик тәңсизликләрни функцияниң графиги арқилиқ йешиш алгоритми:


- 1) тригонометриялик тәңсизликләрни аддий тригонометриялик тәңсизликкә кәлтүрүш;
- 2) бир координата тәкшилигидә тәңсизликниң тәркивидә берилгән тригонометриялик функцияниң графигини селиш вә $y = a$ түзини жүргүзүш;
- 3) функцияләр графиклириниң қийилиши чекитлирини бөлгүләш;
- 4) берилгән тәңсизликни қанаәтләндүридиған әгир сизикниң бөлигини, кейин Ox оқидики асасий арилиқни (координатилар башлинишиға йеқин орунлашқан арилиқни) ениқлаш;
- 5) берилгән тәңсизликтә көрситилгән функциягә әкси тригонометриялик функцияниң мәнәсини нәзәргә елип, асасий арилиқниң чәтки чекитлириниң абсциссилариниң мәнәсини тепиш;
- 6) Тригонометриялик функцияниң периодлуқ хусусийитини пайдилинип, тәңсизликниң умумий йешилишини йезиш.

Тригонометриялик тәңсизликләрни йешишкә мисаллар қараштурайли.

МИСАЛ

1. $\sin x \geq \frac{1}{2}$ тәңсизлигини йешиңлар.

Йешилиши. Тәңсизликни йешиш үчүн $y = \sin x$ функциясиниң графиги синусоида әгири билән $y = \frac{1}{2}$ түзини координатилиқ тәкшиликкә салсақ, $y = \frac{1}{2}$ түзи чәксиз көп чекитләрни қийип өтиду (44.1-сүрәт).



44.1-сүрәт

Берилген теңсізлікті қанаәтлөндүридіған синусоида әгириниң бөлөклири $y = \frac{1}{2}$ түзидин жуқури орунлашқан. Абсцисса оқиниң оң тәрипиде орунлашқан биринчи кесиндиниң учлирини x_1, x_2 дөп бөлгүлөп, уларниң мөналирини ениқлайли. Униң үчүн $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ экәнлигини һесапқа алимиз. Шу чағда $x_1 = \frac{\pi}{6}, x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$ чиқиду.

Демөк, $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$. Берилген теңсізліктің толук йешилишини йезиш үчүн $y = \sin x$ функциясиниң периодлуқ хусусийитини пайдилинимиз: $\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Жавави : $\left[\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$.

АЛГОРИТМ

Аддий тригонометриялик теңсізліктің бирлик чөмбөр арқилиқ чиқариш алгоритми:

- 1) Бирлик чөмбөр селиш;
- 2) Оң тәрәплик аргументниң аркфункциясиниң мөнасини чөмбөр доғисидә бөлгүлөш;
- 3) Аркфункцияниң мөнаси арқилиқ Ox (Oy) оқиға параллель түзни жүргүзүш;
- 4) Тригонометриялик теңсізліктің йешилишләр жиғиндисини болидиған чөмбөр доғисиниң бөлигини көрситиш;
- 5) Жававини йезиш.


МИСАЛ

2. $\sin x \geq \frac{1}{2}$ теңсізлігини бирлик чөмбөр арқилиқ чиқарайли.

$$\alpha = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}; \beta = \pi - \arcsin \frac{1}{2} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Йешилиши: Демөк, $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$ (44.2-сүрөт). Өнди функцияниң периодлуғини нөзөргө елип, $\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, алимиз.

Жавави : $\left[\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$.




44.2-сүрөт

МИСАЛ

3. $\tan x < 1$ теңсізлігини йешимиз.

Йешилиши. $\tan x < 1$ теңсізлігини йешиш үчүн $y = \tan x$ функциясиниң графиги билән $y = 1$ түзини бир координатилиқ төкшиликке салсақ, $y = 1$ түзи билән тангенсоидини чөксіз көп чекитлөрдө (һөр бир периодта бир қетим) қийип өтиду (45-сүрөт).



45-сүрөт

Берілген теңсізлікті қанаәтлөндүрідіған тангенсоидиниң бөлөклири $y = 1$ түзидин төвөн орунлашқан. Өнди $\text{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$ экөнлигини нөзөрдө тутсақ, y чағда графикларниң $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалидики қийилишиш чекитиниң абсциссиси $x = \frac{\pi}{4}$. Демөк, берілген теңсізлік йөшилишиниң асасий арилиғи $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right)$, йөни $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{4}$ өнди $y = \text{tg} x$ функциясиниң периодлуғини нөзөргө елип, берілген теңсізліктің барлық йөшилишлирини ениқлаймиз: $-\frac{\pi}{2} + \pi n < x < \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.


$$\text{Жаваби} : \left(-\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{4} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}.$$

МИСАЛ

4. $\text{ctg} x \geq \sqrt{3}$ теңсізлікті йөшиш үчүн.

Йөшилиши. Теңсізлікті йөшиш үчүн $y = \text{ctg} x$ функциясиниң графигини вө $y = \sqrt{3}$ түзиниң графигини бир координатилик төкшиликке салсақ, $y = \sqrt{3}$ түзи котангенсоида әгирини чөксіз көп чекитлөрдө (һөр периодта бир қетим) қийип өтиду (46-сүрөт).

Берілген теңсізлікті қанаәтлөндүрідіған котангенсоидиниң бөлөклири $y = \sqrt{3}$ түзидин жуқури ятиду.



46-сүрөт

$\text{arccotg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$ экөнлигини нөзөрдө тутсақ, берілген теңсізлікті қанаәтлөндүрідіған асасий арилиқ $\left(0; \frac{\pi}{6}\right]$ яки $0 < x \leq \frac{\pi}{6}$ болиду.


$\text{ctg} x \geq \sqrt{3}$ теңсізлігиниң толук йөшилишини ениқлаш үчүн $y = \text{ctg} x$ функциясиниң периодлуқ хусусийитини қоллинимиз, йөни $\pi n < x \leq \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

$$\text{Жаваби} : \left(\pi n; \frac{\pi}{6} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}.$$

МИСАЛ

5. $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ теңсізлігини йөшөйли.

Йөшилиши. Теңсізлікті йөшиш үчүн косинусоида билөн $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ түзини бир координата төкшилигигө салсақ, $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ түзи косинусоидани чөксіз көп чекитлөрдө қийип өтиду (47-сүрөт).



47-сүрөт

Берілген теңсізлікті қанаәтлөндүрідіған косинусоидиниң бөлөклири $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ түзидин жуқури орунлашқан. Демөк, асасий арилиқ $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$. Демөк, $-\frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{4}$.

$+\frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{4}$. Өнди $y = \cos x$ функциясиниң периодлуғини пайдилинип, мону тәңсизликни алимиз: $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Ахирқи тәңсизликниң һәр бир бөлигидин $\frac{\pi}{6}$ -ни алсақ, $-\frac{5\pi}{12} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{12} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Жаваби : $\left[-\frac{5\pi}{12} + 2\pi n, \frac{\pi}{12} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$.



1. Тригонометриялик тәңсизликләрни йешиш билән алгебрилик тәңсизликләрни йешишниң қандақ пәрқи бар?
2. Тригонометриялик тәңсизликни йешиш билән тригонометриялик тәңлимини йешишниң арисидә охшашлиқ барму? Жавабини чүшәндүрүңлар.
3. Тригонометриялик тәңсизликләрни йәшкәндә тригонометриялик функцияниң хусусийәтлирини пайдилинамду?

Көнүкмиләр

А

Тәңсизликләрни йешиңлар (9.1-9.2):

- 9.1. а) $\sin x > 0$; ә) $\cos x \leq 0$;
 б) $\operatorname{tg} x \leq 0$; в) $\operatorname{ctg} x > 0$.
- 9.2. а) $\sin x \geq 0,5$; ә) $2\cos x \geq -\sqrt{3}$;
 б) $\sin x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$; в) $-3\operatorname{tg} x \leq \sqrt{3}$;
 г) $\sin 3x > -\frac{1}{2}$; ғ) $\cos 2x < -\frac{1}{2}$;
 д) $\operatorname{tg} 5x \geq -1$; е) $\operatorname{ctg} 4x \leq -1$.

Тәңсизликләрниң көрситилгән арилиқтики йешилишлирини тепиңлар (9.3-9.4):

- 9.3. а) $\cos 2x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}, x \in [-\pi; \pi]$; ә) $\sin \frac{x}{3} < \frac{1}{2}, x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.
- 9.4. а) $\operatorname{ctg} \frac{x}{2} \geq 1, x \in (0; \pi)$; ә) $\operatorname{tg} 4x > -\sqrt{3}, x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

В

9.5. Функцияниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

- а) $y = \sqrt{\cos \frac{x}{4}} + 2$; ә) $y = \sqrt{\sin \frac{x}{3}} - 2$.

Тәңсизликләрни йешиңлар (9.6—9.8):

- 9.6. а) $\cos \frac{\pi}{4} \cdot \sin x - \sin \frac{\pi}{4} \cdot \cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$;
 ә) $\sin x \cdot \sin \frac{\pi}{5} - \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{5} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$;

- б) $\sin 4x \cdot \cos 4x \leq 0,25$;
 в) $\sin^2 3x - \cos^2 3x > -0,5$.
- 9.7. а) $2\cos 2x > -1$; ө) $2\sin 4x < -1$;
 б) $-\sqrt{3} \operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$; в) $\sqrt{3} \operatorname{ctg}\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geq 1$.
- 9.8. а) $\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \leq 1$; ө) $2\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \leq \sqrt{2}$;
 б) $3\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) > \sqrt{3}$; в) $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) < -1$.
- 9.9. а) $4\sin x - 2 \geq 0$; ө) $2\operatorname{tg} 2x + 2 > 0$; б) $5\cos 3x + 2 \leq 7$
 тәңсизлигиниң йешилиши барму?

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. $y = \sqrt{\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}}$ функциясиниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

- A. $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 B. $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 C. $-\frac{\pi}{3} + \pi n \leq x \leq \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 D. $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2. $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = 1$ тәңсизлигини йешиңлар:

- A. $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; B. $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 C. $-\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; D. $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

3. $\cos \frac{x}{2} = 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

- A. $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} n, n \in \mathbb{Z}$; B. $\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 C. $\pi + 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$; D. $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

4. $y = \sqrt{\operatorname{tg} x}$ функциясиниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

- A. $0 \leq x < \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$; B. $0 < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 C. $\pi n \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; D. $0 \leq x \leq \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

5. $\sqrt{2} \sin x - 1 = 0$ тәңлимисиниң томурини тепиңлар:

- A. $\pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; B. $(-1)^n \cdot \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 C. $(-1)^n \cdot \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; D. $\frac{\pi}{2} + 3\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

6. $\operatorname{tg} x \leq \sqrt{3}$ теңсізлігінің шешімдері:
- A. $\left[-\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$; B. $\left[-\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$;
 C. $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{3} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$; D. $\left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}$.
7. $\operatorname{ctg} x = 7$ теңлігінің шешімдері:
- A. $-\operatorname{arctg} 7 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$; B. $\operatorname{arctg} 7 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$;
 C. $\operatorname{arctg} 7$; D. $-\operatorname{arctg} 7 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
8. $y = \operatorname{tg} x$ функциясы графигінің Oy оқи билен қийилишіш чекит-лірінің нүктелері:
- A. 0; B. $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; C. $\pi n, n \in \mathbb{Z}$; D. $-\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
9. $\operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ теңлігінің шешімдері:
- A. $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; B. $\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$;
 C. $\frac{7\pi}{12} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$; D. $\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
10. $\cos x = \frac{1}{2}$ теңлігінің $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесіндісінің арилиғіда нәччә томури бар?
- A. 4; B. 3; C. 2; D. 1.
11. $4 \sin^2 x = \cos^2 x$ теңлігінің шешімдері:
- A. $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; B. $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 C. $\pm \operatorname{arctg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; D. $\pm \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
12. $\sin x + \cos x = 0$ теңлігінің шешімдері:
- A. $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; B. -1 ; C. 1; D. $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
13. $0 \leq \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ теңсізлігінің шешімдері:
- A. $\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}$;
 B. $\left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$;
 C. $\left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right] \cup \left(\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{5\pi}{2} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}$;
 D. $\left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n\right) \cup \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$.
14. $\cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ теңлігінің шешімдері:
- A. $\pm \frac{\pi}{2} + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$; B. $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$;
 C. $(-1)^k \frac{\pi}{4} + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$; D. $\pm \frac{\pi}{8} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Математикалық саватлық бойынша тапшырма

15. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 сандар тізбегінде 5-ке бөлінетін сандар қанша пайызды құрайды?
 А. 50%; В. 75%; С. 20%; D. 25%; E. 30%.
16. 400 механизмнің 15-і қателіксіз. Төраде елінген механизмнің қателіксіз болу ықтималдығын табыңыз:
 А. $\frac{1}{20}$; В. $\frac{3}{300}$; С. $\frac{3}{80}$; D. $\frac{1}{80}$; E. $\frac{1}{100}$.
17. $x^2 - 6x + 5 = 0$ теңдеуінің түбірлері қайсы аралыққа тиістілік береді?
 А. (0; 5); В. [2; 3]; С. [0; 5]; D. (1; 6); E. (2; 3).
18. Сандар қандай бір заңдылықпен құрылған. Белгісіз санды табыңыз:

5	10	30	80	?
---	----	----	----	---

- А. 100; В. 200; С. 150; D. 240. E. 220.

ТАРИХИЙ МӘЛУМАТЛАР

XVII ғ. бешидики тригонометрияның төрөқият дәвриде йеңи аналитикилік йөниліш қелиплишішқа башлиди. XVII ғ. өсиргиче тригонометрия үчбулуңлуқларни йөшиш, геометриялық фигуриларниң элементлирини һесаплаш үчүн қоллинилған болса, XVII-XIX ғ. өсирләрде тригонометрия математикилік анализниң бир бөлиги ретиде қараштурулушқа башлиди. У механика, физика билән техникада болупму төврәнмә һәрикәтләр билән башқиму периодлуқ жәриянларни тәтқиқ қилишта кәң қоллиниди. Ф. Виет өзиниң дәсләпки математикилік тәтқиқатлирида тригонометриялық функцияләрниң периодлуқ хусусийити тоғрилиқ ейтқан. Швейцариялық математик И. Бернулли (1667-1748) шу вақитниң өзидила тригонометриялық функцияләрниң бөлгүлирини қолланди. Өгөр алгебрилік бөлгүләшләрниң риважлиниши қариму-қарши санлар билән йөнәлгән кесиндиләрни киргүзүш, булуң билән доға чүшәнчилириниң кәң төрөққий етишигә кәлсәк, у чағда төврәнмә һәрикәтләр, тавуш, йорук вә электромагнитлиқ долқунлар тоғрилиқ илимниң риважлиниши тригонометрия мәзмуниниң асаси — төврәнмә жәриянларни тәтқиқ қилиш билән төрөққиятиға елип кәлди. Гармониялық төвренишниң (мәсилән, маятникниң, өзгөрмә электр токиниң төврениши)

$$y = A \sin (\omega t + \alpha) \quad (1)$$

екәнлиги физика курсидин мәлум.

Гармониялық төвренишләрниң графиги синусоидилар болғанлиқтин, физика билән техникада гармониялық төвренишләрни *синусоидилиқ төвренишләр* дөп атайду.

$\arcsin$ билән $\arctg$ бөлгүләшлирини 1792жили веналиқ математик Г.М. Шерфер билән атаклиқ француз алыми Ж.Л. Лагранж өз әмгәклириде пайдиланған. Д. Бернулли мошу бөлгүләшләрни қедимйда башқиче қараштурған еди. Лекин, бу бөлгүләшләр XVII ғ. өсирде қоллинилишқа башланди. “Арк” қошумчиси латинниң $\arcsin$ — “доға” дегән сөзидин чиққан. $\arcsin x$ сөзи (доға дөп ейтсәкму болиду) синуси x -қа тәң болидиған булуң чүшәнчисигә мувапиқ келиду.

Тригонометриялық функцияләр тоғрилиқ пикирләрниң төрөққий етиши йеңи аналитикилік базиниң қелиплишішигә елип кәлди, йөни тригонометриялық функцияләр геометрияға беқинмай дәрижилик қатарлар билән математикилік анализниң башқиму чүшәнчилириниң ярдими билән ениқлиниду.

Тригонометриялық функцияләрниң аналитикилік нәзәрийәсиниң асасини селишқа үлүш қошқанлар И.Ньютон билән Л. Эйлер. Бирақ бу нәзәрийәниң асасини салған Л. Эйлер дөп ейтишқа болиду. XIX ғ. өсирде бу нәзәрийәни төрөққий өткүзүшни кейинирәк Н.И. Лобачевский вә башқа алимлар давамлаштурған.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Вақиә, элементар вақиә, чапсанлиқ, селиштурма чапсанлиқ, еһтималлиқ, статистика, статистикилік еһтималлиқ, еһтималлиқниң классикилік ениқлимиси.

§ 10. ВАҚИӘНИҢ ЕҢТИМАЛЛИҒИ ВӘ УНИҢ ХУСУСИЙӘТЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

еҗтималлиқ, вақиә, вақиә түрлири, еҗтималлиқниң хусусийәтлири



Силәр тәсадиби вақиә чүшәнчиси, тәсадиби вақиәниң түрлири билән тонущисиләр; еҗтималлиқниң хусусийәтлирини пайдилинип, тәсадиби вақиәниң еҗтималлиғини тепишни үгинисиләр.

Вақиә дегинимиз қандақту бир тәҗрибиниң нәтиҗиси.

Тәҗрибә нәтиҗисидә орунлинидиған яки орунланмайдиган вақиә тәсадиби дәп атилиду.

Тәсадиби вақиәниң бөлгүлиниши: $A, B, C, \dots$

Тәҗрибә нәтиҗисидә миннәтлик түрдә орунлинидиған вақиә һәқиқий вақиә дәп атилиду.

Тәҗрибә нәтиҗисидә орунланмайдиган вақиә мүмкин әмәс (ялған) вақиә дәп атилиду.

А вақиәсиниң орунлиниш нәтиҗисидә В вақиәсиму орунланса, у чағда А вақиәси В вақиәсиниң айрим түри дәп атилиду.

Әгәр А вә В вақиәлири бир-бириниң айрим түри болса, у чағда вақиәләр тәң вақиәләр дәп атилиду.

А вә В вақиәлириниң тәңлигиниң йезилиши: $A = B$.

А вақиәсигә қариму-қарши вақиә дәп А вақиәси орунланмиғанда орунлинидиған А вақиәсини ейтиду.

Тәҗрибә мабайнида икки вақиә бирдәк орунлинидиған болса, у чағда мундақ вақиәләр *маслашқан вақиәләр* дәп атилиду.

Тәҗрибә мабайнида икки вақиәниң бири иккинчисиниң орунлинишини йоққа чиқарса, у чағда мундақ вақиәләр *маслашмиған вақиәләр* дәп атилиду.

Иш йүзидә бир әһвалда бир әмәс бир нәччә тәҗрибә жүргүзилиду. Тәҗрибиләр сани көп болуши мүмкин. Қандақту бир вақиәниң пәйда болушиниң чапсанлиғини ениқлаш үчүн тәҗрибиләр санини ашуриду.

А вақиәсиниң еҗтималлиғи $P(A)$ символи билән бөлгүлиниду.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

А вақиәсиниң еҗтималлиғи төвәндики формула билән һесаплиниду:

$$P(A) = \frac{m}{n}, \text{ бу йәрдә } m - \text{тәҗрибиниң } A \text{ вақиәсигә қолайлиқ}$$

нәтиҗиләр сани, n – барлиқ нәтиҗиләр сани.

Мәсилән, тийинни ташлиғанда A — “герб тәрипиниң чүшиши” яки B — “сан тәрипиниң чүшиши” болса, у чағда $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,5$ яки $P(A) = 50\%$, $P(B) = 50\%$.

Еһтималлиқниң хусусийәтлири

1-хусусийәт. Һәқиқий вақиәниң еһтималлиғи 1 гә тәң.

2-хусусийәт. Мүмкин әмәс (ялған) вақиәниң еһтималлиғи 0 гә тәң.

3-хусусийәт. Толуқ топни қураштуридиған вақиәниң еһтималлиғи 1 гә тәң.

4-хусусийәт. Қариму-қарши вақиәниң еһтималлиғи 1 билән берилгән вақиә еһтималлиғиниң айримисиға тәң, йәни $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Вақиәниң еһтималлиғиниң әһмийити — вақиәниң еһтималлиғини тәҗрибә ясимайла, логикилик таллашлар ясаш арқилиқ тепишқа болиду.



1. Қандақ әһвалларда вақиәниң еһтималлиғини тәҗрибә ясимай тепишқа болиду?
2. Вақиәниң еһтималлиғи қандақ мәналарға тәң болалайду?

Көнүкмиләр

А

10.1. Оюн сүйиғини ташлиғанда 1 дин 6 ғичә болған санлар чүшиду.

Төвәндики вақиәләрниң еһтималлиқлирини тепиңлар:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| а) 3 саниниң чүшиши; | ә) 2 яки 3 саниниң чүшүши; |
| б) 1 вә 5 саниниң чүшиши; | в) тағ саниниң чүшүши. |

10.2. Коробкида 3 ақ вә 7 қизил шар бар. Коробкидин тәсадиқи елинған бир шарниң: а) ақ; ә) қизил болушиниң еһтималлиғини тепиңлар.

10.3. Коробкида 2 қизил вә 6 көк шар бар. Коробкидин тәсадиқи елинған бир шарниң: а) қизил; ә) көк болушиниң еһтималлиғини тепиңлар.

10.4. Синипта 30 оқуғучи бар. Уларниң ичидә 6 оқуғучи әла баһа, 16 оқуғучи яхши баһа алди. Синиптин тәсадиқи таллап елинған бир оқуғучи баһасиниң : а) әла болушиниң; ә) яки яхши болушиниң; б) әла баһа болмишиниң еһтималлиғини тепиңлар.

В

10.5. Бир тийин икки қетим ташланди. Әң болмиса бир қетим «бәлгү» чүшишиниң еһтималлиғини тепиңлар.

10.6. Үч қетим тийин ташланди. Икки “герб” чүшишиниң еһтималлиғини тепиңлар.

10.7. Тәсадиқи икки ханилик сан таллап елинди. Төвәндики вақиәләрниң еһтималлиғини тепиңлар: ә) елинған сан нөл билән аяқлишиду;

- ә) елінған сан бирдәк рәқәмләрдін қурулған;
- б) елінған сан пүтүн санның квадрати болмайду.

10.8. Әркин икки ханилик санны ойлиди. Ойлиған санның 2 билән 5 санлириға һәссилик болушиниң еһтималлиғини тепиңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тәжрибә, вақиә, тәсадини вақиә чапсанлиғи, еһтималлиқ, статистика, статистикилик мәлуматлар, асасий жигинда, таллаш, статистикилик хуласә.

§ 11. ЕҢТИМАЛЛИҚЛАРНИ ҚОШУШ ВӘ КӨПӘЙТИШ ҚАИДИЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Еһтималлиқ вақиә, қошуш қайдиси, көпәйтиш қайдиси



Силәр вақиәләр қошундиси, вақиәләрниң көпәйтіндиси чүшәнчилири билән, шуниң билән биллә еһтималлиқларни қошуш вә көпәйтиш теоремилери билән тонушисиләр; уларни қоллинип һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

Силәр еһтималлиқниң қандақту бир вақиәниң бәлгүлүк әһвалда пәйда болуш мүмкинчилигиниң тәриплимиси экәнлигини билисиләр.

Мону нәтижиләрни өскә чүширәйли:

- 1) Әгәр вақиә мүмкин болмиса, у чағда униң еһтималлиғи нөлгә тәң;
- 2) Әгәр вақиәниң орунлиниши мүмкин болса, у чағда униң еһтималлиғи биргә тәң;
- 3) Әгәр бир вақиәниң орунлиниши мүмкин, бирақ чүшиши абсолют һәқиқәт болмиса, униң еһтималлиғи 0 вә 1 санлириниң арисидә орунлашқан сан. Мәсилән, тийинни ташлиғанда униң “герб” вә “сан” тәрипи чүшүши мүмкин әмәс вақиәләр.

А вә В вақиәлириниң $A + B$ қошундиси дәп А вақиәсиниң яки В вақиәсиниң яки иккисиниң орунлинишидин туридиган вақиәни ейтиду.

Айрим әһвалда, әгәр А, В вақиәлири маслашмиған болса, у чағда $A+B$ мошу икки вақиәниң бириниң орунлинишиниң вақиәси.

Дәл мошундақ бир нәччә вақиәниң орунлиниши ениқлиниду.

А вә В вақиәлири маслашмиған болсун. А вақиәсиниң орунлиниш еһтималлиғини $P(A)$, В вақиәсиниң пәйда болушини $P(B)$ дәп бәлгүләйли. А вақиәсиниң яки В вақиәсиниң $P(A + B)$ еһтималлиғини қандақ тепишқә болиду? Бу соалға жавапни төвәндики қошуш теоремиси бериду.

1-теорема (маслашмиған вақиәләрниң еһтималлигини қошуи).

Маслашмиған икки вақиәниң һәр қандақ бириниң орунлинишиниң еһтималлиги мошу вақиәләрниң қошундисига тәң:

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

МИСАЛ

1. Ящиктә 30 шар бар, униң 15и қизил, 10и көк вә 5и йешил. Ящиктин елинған һәр қандақ шарниң йешил болмишиниң (A вақиәси) еһтималлигини тепиңлар.

Йешилиши. Ящиктин елинған шар қизил (B вақиәси) яки көк (C вақиәси) болған өһвалда A вақиәсиниң орунлиниши мүмкин, йәни A вақиәси маслашмиған B вә C вақиәлириниң қошундисига тәң. Шуңлашқа 1- теоремига мувапик монун алимиз:

$$P(A) = P(B + C) = P(B) + P(C) = \frac{15}{30} + \frac{10}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}.$$

Жаваби : $\frac{5}{6}$.

Бир тәҗрибиниң хуласиси үчүн топниң пәқәт бирла вақиәси болидиған

$$A_1, A_2, \dots, A_n \quad (1)$$

вақиәләр системиси вақиәләрниң толук топи дәп атилиду.

Башқичә ейтқанда, (1) толук топ вақиәлири үчүн монун шәртләр орунлиниду:

1) 1 дин n -ғичә һәр қандақ i үчүн A_i вақиәси һәқиқәт;

2) A_i вә A_j ($i \neq j$) вақиәләр жүпи маслашмиған, йәни $A_i A_j = 0$ ($i \neq j$), бу йәрдә 0 — мүмкин әмәс вақиә. Вақиәләрниң толук топиға $\bar{A}$ вә A вақиәлири мисал болиду. Бу йәрдә A вақиәси — $\bar{A}$ вақиәсигә қариму-қарши вақиә.

2-теорема. Толук топ вақиәлириниң еһтималлигиниң қошундисиги 1 гә тәң.

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1. \quad (2)$$

A вә B вақиәлириниң көпәйтиндисиги дәп мошу икки вақиәниң қатар орунлинишидин туридиған AB вақиәсини ейтиду.

Мәсилән, ящиктә №1 вә №2 заводлар тәйярлиған кнопкилар бар, A — стандарт кнопкиларниң чүшүши, B — №1 завод тәйярлиған кнопка, у чағда $A \cdot B$ — №1 завод тәйярлиған кнопкилар.

A вә B маслашмиған вақиәләр вә уларниң еһтималлиқлири $P(A)$ вә $P(B)$ бөлгүлүк болсун. A вә B вақиәлириниң маслашқанлигини қандақ тепишқа болиду?

3-теорема (беқинда әмәс вақиәләрниң еһтималлиқлириниң көпәйтиндисиги).

А вә В мустәқил вақиәләрниң бирдәк орунлиниш еһтималлиғи мошу вақиәләрниң көпәйтиндисигә тәң:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

МИСАЛ

2. Әгәр оюн сүйиги билән тийинни ташлиса, тийинниң “герб” төрипи билән оюн сүйигидики 5 саниниң чүшүш еһтималлиғи қандақ?

Йешилиши. $\frac{1}{2}$ — тийиндики “гербниң” вә $\frac{1}{6}$ — оюн сүйигидики 5 саниниң чүшүш еһтималлиғи. У чағда 3-теорема бойичә:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

Жаваби: $\frac{1}{12}$.

Еһтималлиқларни көпәйтиш теоремиси вақиәләрниң сани иккидин ошқуқ әһвалдиму қараштурилиду.

МИСАЛ

3. Тийинни 10 қетим ташлиғанда 10 қетим гербниң чүшүш еһтималлиғи қандақ?

Йешилиши. Һәр бир ташлаш пәйтидә бөлгүниң чүшиши алдинқи хуләсигә бағлиқ әмәс. Шуңлашқа бу йәрдә 10 маслашмиған вақиәниң маслашқанлиғи тоғрилиқ ейтилған. Бир қетим ташлиғанда бөлгүниң чүшүш еһтималлиғи $\frac{1}{2}$ гә тәң. Шуңлашқа издилидиған еһтималлиқ $\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$ гә тәң, йәни $\frac{1}{1024}$.

Жаваби: $\frac{1}{1024}$.

Бу йәрдә еһтималлиқ — наһайити аз миқдар, сәвәви тийинни 10 қетим ташлиғанда 10 қетим “гербниң” чүшүши мүмкин әмәс.

А вақиәси орунланғандин кейин ениқланған В вақиәсиниң еһтималлиғини $P_A(B)$ шәртлик еһтималлиқ дәп атайду.

А, В — беқинда вақиәләр вә $P(A)$, $P_A(B)$ еһтималлиқлири бөлгүлүк болсун. Мошу вақиәләрниң маслашқанлиғини ениқлайлуқ?

4-теорема. *Беқинда икки вақиәниң орунлиниш еһтималлиғи биринчи вақиәниң еһтималлиғини биринчи вақиә орунланғандин кейин ениқланған иккинчи вақиәниң шәртлик еһтималлиғига көпәйткәнгә тәң:*

$$P(AB) = P(A) \cdot P_A(B).$$

Бу теорема беқинда вақиәләрниң сани иккидин артуқ болғанда орунлиниду. Мәсилән, үч беқинда вақиә үчүн

$$P(ABC) = P(A) \cdot P_A(B) \cdot P_{AB}(C)$$

орунлиниду. $P_{AB}(C)$ бөлгүси А вә В вақиәлири орунланғандин кейинки С вақиәсиниң еһтималлиғини бериду.

МИСАЛ

4. Технилик лицейнің чевәрханисиде үч станокта кнопкилар ясилиду. Кнопкини биринчи станокта ясаш еһтималлиғи 0,6 гө тәң. Биринчи станокта ярамлик кнопка ясаш еһтималлиғи 0,8 гө тәң. Ярамлик кнопкиның биринчи станокта ясилишиниң еһтималлиғини тепиңлар.

Йешилиши. A — “биринчи станокта ясалған кнопка”, B — “ярамлик кнопка” болсун. Һесапниң шәрти бойичә $P(A) = 0,6$, $P_A(B) = 0,8$.

Әнди 4-теоремини қоллинимиз:

$$P(AB) = P(A)P_A(B) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48.$$

Жаваби: 0,48.



1. Беқинда вақиәниң мустәқил вақиәдин нема пәрқи бар?
2. Маслашмиған вақиәләр еһтималлиқлириниң қошундиси билән беқинда әмәс вақиәләр еһтималлиқлириниң көпәйтиндисини һесаплаш арисиде қандақ охшашлиқ бар?

Көнүкмиләр

А

- 11.1. Нишан (I) дүгләк вә (II вә III) икки төңгидин төшкил тапидиған үч концентрлик дүгләктин туриду. Оқниң I, II вә III әтрапиға чүшүш еһтималлиқлири мувапик 0,45; 0,30; 0,15. Оқниң нишанға тегиш еһтималлиғини ениқлаңлар.
- 11.2. Күнниң очуқ болуш еһтималлиғи $P(A) = 0,75$. Күнниң булутлуқ болушиниң еһтималлиғини тепиңлар.
- 11.3. Университетниң сирттин оқуш бөлүмигә синаш ишлири A , B вә C шәһәрлиридин келип чүшти. Уларниң A шәһиридин келиш еһтималлиғи 0,6, B шәһиридин келиш еһтималлиғи 0,1. Нөвәттики ишниң C шәһиридин келиш еһтималлиғини тепиңлар.
- 11.4. Икки оюн сүйиги ташланди. Чүшкән санларниң қошундиси бәштин ошуқ болушиниң еһтималлиғи қандақ?
- 11.5. Икки мәргән бир нишанни көзлиди. Биринчи мәргәнниң нишанға төккүзүш еһтималлиғи 0,9, иккинчисиниң 0,8. 1) иккилә мәргәнниң; 2) әң болмиғанда бир мәргәнниң нишанға дәл төккүзүш еһтималлиғи қандақ?

В

- 11.6. Икки оюн сүйиги бирдәк ташланди. Икки төрт саниниң бир мәзгилдә чүшүш еһтималлиғи қандақ?
- 11.7. Тәсадипи елинған фабрика мәһсулатиниң ярамлик еһтималлиғи $\frac{92}{100}$, тәсадипи елинған ярамлик мәһсулатниң биринчи сорт болуш еһтималлиғи $\frac{72}{100}$. Елинған фабрика мәһсулатиниң биринчи сорт болуш еһтималлиғи қанчә?

- 11.8. 1) Ящиктө өлчәмлири бирдөк 2 ақ, 3 қизил вә 5 көк шар бар. Ящиктин тәсадиби елинған шарниң боялған (ақ әмәс) болуш еһтималлиғини тепиңлар.
- 2) Ящиктө 7 ақ вә 3 қара шар бар. Ящиктин ақ (В вақиә) яки қара (С вақиә) шар елинғандин кейин иккинчи қетим елинған шарниң ақ болуш еһтималлиғини тепиңлар.
- 11.9. Ящиктө 4 ақ вә 7 қара шар бар. Ящиккә қайтидин қайтурулмай икки шар нөвәт билән елинған. Биринчи шарниң ақ, иккинчи шарниң қара болуш еһтималлиғи қандақ?

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Һәқиқий санлар жиғиндиси, функция, ениқлинши даириси, мәналар жиғиндиси, графиги, функцияниң чеки, үзүлүшсизлиги, чекитниң әтрапи.

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

- Тәжрибә нәтижисидә бир мәзгилдә орунлинидиған вақиәләр:
А. Һәқиқий; В. Мүмкин әмәс; С. Мувәпиқ әмәс;
D. Қариму-қарши; E. Тәң мүмкинлик.
- Тәжрибә нәтижисидә мәжбүрий түрдә орунлинидиған вақиәләр:
А. Һәқиқий; В. Мүмкин әмәс; С. Мувәпиқ әмәс;
D. Қариму-қарши; E. Тәң мүмкинлик.
- Тәжрибә нәтижисидә бир вақиәниң орунлишиши иккинчи вақиәниң орунлишишини йоққа чиқиридиған вақиәләр:
А. Һәқиқий; В. Мүмкин әмәс; С. Мувәпиқ әмәс;
D. Қариму-қарши; E. Тәң мүмкинлик.
- Мүмкин әмәс вақиәниң орунлишиниң еһтималлиғи:
А. 1 гә тәң; В. 0 гә тәң; С. -1 гә тәң;
D. Ижабий санға тәң; E. Сәлбий санға тәң.
- Ящиктө 3 ақ вә 12 қизил шар бар. Ящиктин бир шар елинди. Елинған шарниң қизил рәңлик болушиниң еһтималлиғини тепиңлар:
А. 0,7; В. 0,2; С. 0,8; D. 0,75; E. 0,4.
- Ящиктө 3 ақ вә 12 қизил шар бар. Ящиктин бир шар елинди. Елинған шарниң ақ рәңлик болушиниң еһтималлиғини тепиңлар:
А. 0,7; В. 0,2; С. 0,8; D. 0,75; E. 0,4.
- Ящиктө 9 серик, 9 ақ вә 12 қизил шар бар. Ящиктин бир шар елинди. Елинған шарниң ақ рәңлик болушиниң еһтималлиғини тепиңлар:
А. 0,7; В. 0,2; С. 0,8; D. 0,75; E. 0,4.

8. Тийин билән оюн сүйигини ташлиғанда тийинниң “герб” тәрипи билән вә сүйәкниң 12 саниниң бөлүнгүчи болидиған “сан” тәрипи билән чүшүшиниң еһтималлиғини тепиңлар.

А. $\frac{5}{6}$; В. $\frac{5}{6}$; С. 1; D. 0,75; Е. 0,5.

9. Үч оюн сүйигини ташлиғанда бир мәзгилдә иккисидә бәш саниниң, биридә жүп саниниң чүшүшиниң еһтималлиғини тепиңлар:

А. $\frac{7}{6}$; В) $\frac{1}{12}$; С. 1; D. 0,75; Е. 0,5.

Математикалық саватлық бойичә тапшуруқлар

10. Инфузория аддий микроби иккигә бөлүнүш арқилиқ көпийиду. Әгәр төрт қетим бөлүнгәндин кейин уларниң сани 96 гә тәң болса, у чағда дәсләпкидә қанчә инфузория болған?

А. 3; В. 4; С. 6; D. 5; Е. 7.

11. 2 кг алма вә 5 кг нәшпүт 3100 тг туриду. 20 кг нәшпүт билән 8 кг алма қанчә туриду?

А. 12 000 тг; В. 9300 тг; С. 12 400 тг; D. 15 500 тг; Е. 16 000 тг.

12. 165; 175; 385 санлириниң қайсилирини үч санидин чоң һәр түрлүк аддий санларниң көпәйтиндиси түридә йезишқа болиду?

А. 165; 175; В. 175; 385; С. 165; D. 175; Е. 385.

13. Цифрлири қайтилинидиған болса, у чағда 6; 9; 0 цифрлиридин қанчә икки ханилиқ сан қураштурушқа болиду?

А. 3; В. 4; С. 6; D. 5; Е. 7.

14. Квадратниң периметри 5 см болидиған бирдәк төрт квадратқа бөлүнгән. Берилгән квадратниң периметри чиққан квадратниң периметридин қанчә пайизға артүқ?

А. 20% -қа; В. 100% -қа; С. 25% -қа; D. 50% -қа; Е. 150% -қа.

15. Синиптики бәш оқуғучиниң исми “А” һәрипидин башлиниду. Әгәр синипта 35 оқуғучи болса, у чағда тахтиға чиққан оқуғучиниң исми “А” һәрипидин башлинишиниң еһтималлиғини тепиңлар:

А. $\frac{7}{6}$; В) $\frac{6}{7}$; С. 1; D. $\frac{1}{7}$; Е. 0,5.

§ 12. ФУНКЦИЯНИҢ ЧЕКИТТИКИ ЧЕКИ. ФУНКЦИЯНИҢ ҮЗҮЛҮШСИЗЛИГИ

Асасий чүшәнчиләр

функция, функцияниң чеки, функцияниң үзүлүшсизлиги, үзүлүш чекити



Силәр функцияниң чекиттики чеки, функцияниң үзүлүшсизлиги билән үзүлүш чекитлири, үзүлүшсиз функция вә униң хусусийәтлири билән тонушусиләр, функцияниң чекини тепиш, уни үзүлүшсизликкә тәкшүрүшкә һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

Функцияниң чекиттики чеки тоғрилиқ чүшәнчини мисаллар қараштуруш арқилиқ киргүзәйли.

МИСАЛ

1. $y = f(x)$ функциясиниң x чекити 2 гә интилғандики ($x \rightarrow 2$) чекини ениқлайли: а) $f(x) = 1 + x^2$; ө) $f(x) = \frac{x+2}{x}$.

Йешилиши. $x = 2$ чекити функцияниң ениқлиниш даирисигә тәәллүк болғанлиқтин, униң $x = 2$ чекитидики чекини тепиш үчүн функцияниң мошу чекиттики мәнасини һесаплаймиз: а) $f(2) = 1 + 2^2 = 5$; ө) $f(2) = \frac{2+2}{2} = 2$.

Шуниң билән, x аргументи интилидиған сан $f(x)$ функциясиниң ениқлиниш даирисигә тәәллүк болса, у чағда униң шу чекиттики мәнаси функцияниң чәклик мәнаси болуп һесаплиниду.

Мошу тәстиқлимини мундақ йезишқә болиду:

әгәр $x \rightarrow x_0$ болса, у чағда $f(x) \rightarrow f(x_0)$.

Функцияниң чекини униң ениқлиниш даирисигә тәәллүк әмәс чекитләрдә тепиш һажәт болидиған һаләтләрму учришиду. Бу әһвалда $x \rightarrow x_0$, $f(x) \rightarrow a$, бу йәрдә a — һәқиқий сан.

а сани тепилмишиму мүмкин, у чағда функцияниң $x = x_0$ чекитидә чеки йоқ дәйду.

$f(x_0)$ вә a мәналири x_0 чекиттики функцияниң чәклик мәналири дәп атилиду.

Әгәр x аргументи a саниға (оң тәрипидин яки сол тәрипидин) интилғанда $f(x)$ функциясиниң мәнаси b саниға интилса, у чағда b сани $f(x)$ функциясиниң x аргументи a саниға интилғанда (a чекитидики) чеки дәп атилиду.

Алдин-ала берилгән һәр қандақ $\varepsilon > 0$ сани үчүн $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ сани тепилип, өзгәрмә x -ниң $|x - a| < \delta$ тәңсизлигини қанаәтләндүридиған барлиқ мәналири үчүн $|f(x) - b| < \varepsilon$ тәңсизлиги орунланса, у чағда b сани $f(x)$ функциясиниң x аргументи a саниға интилғандики (a чекитидики) чеки дәп атилиду.

МИСАЛ

2. $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ функциясинин $x \rightarrow 2$ чекитиге интилгандики чөклик мәнәсини тапайли.

Йөшилиши . $x = 2$ чекити функцияниң ениқлиниш даирисиге тәәллүк әмәс. Шунлашқа $x \rightarrow 2$ интилгандики функциялиринин чекини тепиш үчүн уларни түрлөндүримиз:

$$a) f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2, \text{ мошуниндин } f(2) = 2 + 2 = 4.$$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$x \rightarrow 2$ интилгандики функцияниң чеки қандақ тепилиду?

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x + 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x + 3}{x + 2}, \quad f(2) = \frac{2 + 3}{2 + 2} = \frac{5}{4}.$$

Әгәр $f(x)$ функциялиринин x_0 чекитидә ениқланған вә функцияниң чөклик мәнәси $x \rightarrow x_0$ x_0 чекитидики мәнәсигә тәң болса, у чағда функция x_0 чекитидә үзүлүшсиз функция дәп атилиду.

Ениқлимидики x_0 чекитини функцияниң үзүлүшсизлик чекити дәп атайду.

Үзүлүшсиз функцияниң ениқлимисидин чиқидиған үч һаләткә тохтилайли:

- 1) $f(x)$ функцияси x_0 чекитидә ениқланған болиду;
- 2) x_0 чекитидә функцияниң чеки болуш керәк;
- 3) Функцияниң чөклик мәнәси x_0 чекитидики мәнәсигә тәң, йәни $x \rightarrow x_0$ интилғанда $f(x) \rightarrow f(x_0)$.

Әгәр мошу шәртләрниң бири орунланмиса, у чағда $f(x)$ функцияси x_0 чекитидә үзүлүшсиз болиду. Бу һаләттә x_0 чекити функцияниң үзүлүшсиз чекити дәп атилиду.

Әгәр $y = f(x)$ функцияси үзүлүшсиз болса, у чағда униң графиги туташ әгир сизик болиду.

Чекиттики үзүлүшсиз функцияләр үчүн мону теорема орунлуқ болиду:

әгәр $f(x)$ вә $\phi(x)$ функциялири x_0 чекитидә үзүлүшсиз болса, у чағда уларниң қошундиси $f(x) + \phi(x)$, көпәйтиндиси $f(x) \cdot \phi(x)$ вә бөлүндиси $\frac{f(x)}{\phi(x)}$ ($\phi(x_0) \neq 0$) x_0 чекитидә үзүлүшсиз функцияләр болиду.

Әгәр $f(x)$ функцияси X жиғиндисиниң һәр қандақ чекитидә үзүлүшсиз болса, у чағда уни мошу X жиғиндисидә (кесиндидә) үзүлүшсиз функция дәп атайду.

Кесиндидики үзүлүшсиз функцияларның хусусийәтлери:


1) Әгәр $[a; b]$ кесиндисидә функция үзүлүшсиз вә нөлгә айланмайдыған болса, у чағда мошу интервалда турақлық бәлгүсини сақлайду;

2) әгәр $y = f(x)$ функцияси $x \in [a; b]$ кесиндисидә үзүлүшсиз функция болса, у чағда: а) мошу кесиндидә чәкләнгән функция болиду; ә) мошу кесиндидә функция өзиниң әң чоң вә әң кичик мәналирини қобул қилиду, йәни $m \leq f(x) \leq M$, бу йәрдә m — функцияниң әң кичик, M — функцияниң әң чоң мәнаси;


3) әгәр $y = f(x)$ функцияси $x \in [a; b]$ кесиндисидә үзүлүшсиз функция болса вә униң чәтки чекитлиридә һәр түрлүк бәлгүдики мәналар қобул қилса, у чағда $[a; b]$ кесиндисиниң ичидә функция әң болмиғанда бир чекиттә нөлгә айланиду.

МИСАЛ

3. $f(x) = \frac{1}{x}$ функциясини алайли. Бу функция силәргә бәлгүлүк әкси пропорционаллик беқиндилиқ. Функцияниң ениқлишин даириси нөлдин башқа барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси. Демәк, $x = 0$ чекити функцияниң үзүлүш чекити, йәни функция — үзүлидиған функция. Уни функцияниң графигидин көрүшкә болиду (48-сүрәт).



48-сүрәт



49-сүрәт

МИСАЛ

4. $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{әгәр } x \geq 0, \\ x - 1, & \text{әгәр } x < 0 \end{cases}$ функциясиниң графигини селип,

$x = 0$ чекитидә үзүлүшсиз болмайдығанлиғини ениқлайли.

Йешилиши. Функция икки формула билән берилгән: $g(x) = x + 1, x \geq 0$ вә $\phi(x) = x - 1, x < 0$. Бу икки функцияниңму графиги түз сизик болиду. Шуңлашқа $g(x) = x + 1$ функцияси үчүн $x \geq 0$, әнди $\phi(x) = x - 1, x < 0$ болғанда икки чекитниң координатисини ениқлаймиз. Шу чағда биринчи әһвалда $(0; 1)$, $(1; 2)$ вә икинчи әһвалда $(-1; -2)$, $(-0,5; -1,5)$ чекитлири арқилиқ өтүдиған түзләрни салимиз (49-сүрәт). Сүрәттин көрүнүп турғандәк, берилгән функцияниң графиги туташ әгир сизик әмәс. Демәк, $x = 0$ чекитидә функция үзүлидиған болиду.



1. Функцияниң чекиттики чеки билән чекиттики үзүлүшсизлиғиниң пәрқи неמידә?
2. Әгәр x_0 чекитидә $f(x)$ функцияси үзүлидиған болса, у чағда мошу чекиттә функцияниң чеки болмайду дегән хуләсә дурусму? Жававини чүшөндүрүңлар.

3. Әгәр x_0 чекитидә $f(x)$ функцияси үзүлүшсиз, $g(x)$ функцияси үзүлидиган болса, у чағда уларниң қошундисиниң, көпәйтиндисиниң, бөлүндисиниң мошу чекиттики үзүлүшсизлиги тоғрилиқ немә ейтишқа болиду?

Көнүкмиләр

А

12.1. $y = f(x)$ функциясиниң $x \rightarrow x_0$ интилғандики чекини тепиңлар:

а) $f(x) = 3x + 2, x \rightarrow 2;$ ә) $f(x) = 4x^3 - 3x, x \rightarrow -1;$

б) $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 3}, x \rightarrow -3;$ в) $f(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 4}, x \rightarrow 2.$

12.2. а) $f(x) = 4x - 5;$ ә) $f(x) = 5x - 2$ функциясиниң $x_0 = -2;$ $x_0 = -0,5$ чекитлиридики чекини тепиңлар.

12.3. $y = f(x)$ функциясиниң графигини селип, униң x_0 чекитидики үзүлүшсизлигини ениқлаңлар:

а) $y = \begin{cases} x, & \text{әгәр } x \geq 0, \\ x+1, & \text{әгәр } x < 0, \end{cases} \quad x_0 = 0;$ ә) $y = \begin{cases} x+1, & \text{әгәр } x \geq 0, \\ -x, & \text{әгәр } x < 0, \end{cases} \quad x_0 = 0.$

12.4. $y = f(x)$ функциясини үзүлүшсизликкә төкшүрүңлар:

а) $y = \frac{6}{x-3};$ ә) $y = \frac{x}{2,5+x};$ б) $y = \frac{5}{x(x+1)};$ в) $y = \frac{x}{x^2-9}.$

12.5. $y = f(x)$ функциясини үзүлүшсизликкә төкшүрүңлар:

а) $y = \frac{5}{\cos x};$ ә) $y = -\frac{2}{\sin x}.$

В

12.6. $y = f(x)$ функциясиниң $x \rightarrow x_0$ интилғандики чекини тепиңлар:

а) $f(x) = \frac{2x - x^2}{x - 2}, x \rightarrow 2;$ ә) $f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 1}{x + 1}, x \rightarrow -1;$

б) $f(x) = \frac{x^3 - 27}{x - 3}, x \rightarrow 3;$ в) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^4 - 16}, x \rightarrow 2;$

г) $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 5x + 4}, x \rightarrow 1;$ ғ) $f(x) = \frac{3x^2 - 4x - 4}{3x^2 - 7x - 6}, x \rightarrow -\frac{2}{3};$

д) $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}, x \rightarrow 4;$ е) $f(x) = \frac{4x - x^3}{2x^2 + 3x - 2}, x \rightarrow -2.$

12.7. Функцияниң графигини селип, үзүлүш чекитини ениқлаңлар:

а) $f(x) = \begin{cases} -3, & \text{әгәр } x < 0, \\ x, & \text{әгәр } x \geq 0; \end{cases}$ ә) $f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{әгәр } x < 0, \\ x^2 + 2, & \text{әгәр } x \geq 0; \end{cases}$

б) $f(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{әгәр } 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ x - 4, & \text{әгәр } x \leq 0; \end{cases}$ в) $f(x) = \begin{cases} \operatorname{tg} x, & \text{әгәр } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{4}, \\ x - \frac{\pi}{4}, & \text{әгәр } x \geq \frac{\pi}{4}. \end{cases}$

12.8. $y = f(x)$ функциясыни үзүлүшсизликкө төкшүрүңлар:

а) $y = \frac{25}{3x^2 + 25}$; ө) $y = \frac{1}{x^2 + 4x + 4}$; б) $y = \frac{4x}{x^2 + x}$; в) $y = \frac{x}{1 - \cos x}$.

12.9. Сан түзиниң һәр қандақ чекитидө: а) $x = 0$ чекитидин башқа чекитлөрдө; ө) $x = 0$ вө $x = 1$ чекитлиридин башқа чекитлөрдө үзүлүшсиз болидиған функциягө мисаллар көлтүрүңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӨШТҮРҮШКӨ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Аргумент, функция, функцияниң ениқлиниш даириси, функцияниң чекиттики чеки, чекиттики үзүлүшсизлиги.

§ 13. ҺАСИЛАТНИҢ ЕНИҚЛИМИСИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, һасилат, өсүмчө, дифференциал



Силәр һасилатниң ениқлимисини билисиләр, һасилатниң ениқлимисини қоллинип, һасилат елишни үгинисиләр.

Функцияни аддий һәрикәтләр, һадисиләр вө жәриянларниң математикилик модели түридө қараштуруш мәхситидө қоллинигду.


Алди билән аргумент билән функция өсүмчилири чүшәнчилирини ениқлап алайлуқ.

Үзүлүшсиз $y = f(x)$ функцияси берилгән. Аргументниң x_1 вө x_2 мәналири функцияниң ениқлиниш даирисидин елинсун.

$x_2 - x_1$ айримисини аргументниң x_1 чекитидики өсүмчиси дәп атайду.

Өсүмчө Δx бөлгүси билән бөлгүлинип, “дельта икс” дәп оқилиду.

Функцияниң аргументи x -қа Δx өсүмчисини берәйли. Δx өсүмчисини қобул қилғандин кейин аргументниң мәнаси $x + \Delta x$ болиду. Өсүмчиниң бөлгүси ижабийму, сәлбийму болуши мүмкин. Әгәр $\Delta x > 0$ болса, y чағда $x + \Delta x$ чекити x чекитиниң оң тәрипигә, $\Delta x < 0$ болса, y чағда $x + \Delta x$ чекити x чекитиниң сол тәрипигә орунлишиду (50-сүрәт).



50-сүрәт

Шуниң билән, аргумент өсүмчисидин

$$\Delta x = (x + \Delta x) - x \quad (1)$$

тәңлиги билән ипадиләшкө болиду.

Демәк, аргументниң өсүмчиси униң икки чекитидики мәналириниң айримисиға тәң.

Аргумент x -қа Δx өсумчисини бәргәндә $y = f(x)$ функциясыму өсумчә қобул қилиду. Бу функцияның өсумчиси Δy билән бәлгүлинип,

$$\Delta y = (y + \Delta y) - y$$

яки

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \quad (2)$$

тәңлиги билән ениқлиниду.

Шу чағда функция өсумчиси функцияның икки чекиттики мәналириниң айримисиға тәң.

МИСАЛ

1. $y = x^3$ функциясиниң аргументи x мәнасиниң $x + \Delta x$ мәнасиға авушқандики өсумчисини тапайли.

$$\text{Йешилиши. } \Delta y = (x + \Delta x)^3 - x^3 = x^3 + 3x^2 \Delta x + 3x \Delta x^2 + \Delta x^3 - x^3 = 3x^2 \Delta x + 3x \Delta x^2 + \Delta x^3.$$

$$\text{Шуниң билән, } \Delta y = (3x^2 + 3x \Delta x + \Delta x^2) \Delta x.$$

Функция һасилатиниң ениқлимисини берәйли. Униң үчүн функция өсумчисини аргумент өсумчисигә бөлүмиз:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad (3)$$

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ ипадисиниң аргумент өсумчиси $\Delta x \rightarrow 0$ интилғандики чеки бар болса, у чағда у чәклик $y = f(x)$ функциясиниң x чекитидики һасилати дәп атайду.

Һасилатниң бәлгүлиниши: $y' = f'(x)$.

$$\Delta x \rightarrow 0 \text{ интилғандики } \frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow y' \text{ яки } \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \rightarrow f'(x). \quad (4)$$

Оқулиши: $f'(x)$ — “ x -тин эф штрих”.

Функцияның һасилатини тепиш әмәлини функцияни дифференциаллаш дәп атайду.

x чекитидә функцияның һасилати бар болса, у чағда $f(x)$ функциясини мошу чекиттә дифференциалланған функция дәп атайду. Әгәр функция арилиқниң барлиқ чекитлиридә дифференциаллинидиган болса, у чағда уни арилиқта дифференциаллинидиган функция дәп атайду.

$y = f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидә һасилати бар болса, у чағда униң мошу чекиттә функция үзүлүшсиз болиду. Әкси тәстиқлимә барлиқ һаләтләрдә дурус боливәрмәйду.

АЛГОРИТМ

Ениқлима бойичә һасилат тепиш алгоритми:

1) аргументқа Δx өсумчисини бериш;

2) Δx өсумчигә мувапик $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ функция өсумчисини ениқлаш;

3) функция өсумчисиниң аргумент өсумчисигә нисбитини тепиш, йәни

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x};$$

4) аргумент өсумчиси Δx нәлгә интилғандики нисбәтниниң чекини йәни $\Delta x \rightarrow 0$ һаләттики $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ мәнасини тепиш.

Алгоритмни қоллинип, һасилат тепишқа мисаллар қараштурайли.

МИСАЛ

2. а) $f(x) = x^2$; ө) $f(x) = \sqrt{x}$; б) $f(x) = \frac{1}{x}$ функциясиниң x чекитидики һасилатини тапайлуқ.

Йешилиши: а) $f(x) = x^2$ функциясиниң һасилатини тапайли. Алгоритм бойиче:

1) $x + \Delta x$;

2) $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^2 - x^2 = x^2 + 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2 - x^2 = 2x \Delta x + (\Delta x)^2$;

3) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x$;

4) $\Delta x \rightarrow 0$ һаләттө $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow 2x$, ундақ болса $f'(x) = 2x$, йәни $(x^2)' = 2x$;

ө) $f(x) = \sqrt{x}$ функциясиниң һасилатини тапайли. Алгоритм бойиче:

1) $x + \Delta x$;

2) $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x} =$
 $= \frac{(\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x})(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{x + \Delta x - x}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{\Delta x}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$;

3) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} : \Delta x = \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$;

4) $\Delta x \rightarrow 0$ һаләттө $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}$, у чағда $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, йәни $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$;

б) $f(x) = \frac{1}{x}$ функциясиниң һасилатини тапайли. Алгоритм бойиче:

1) $x + \Delta x$;

2) $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x} = \frac{x - x - \Delta x}{x(x + \Delta x)} = -\frac{\Delta x}{x(x + \Delta x)}$;

3) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{\Delta x}{x(x + \Delta x)} : \Delta x = -\frac{1}{x(x + \Delta x)}$;

4) $\Delta x \rightarrow 0$ өһвалида $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow -\frac{1}{x^2}$, у чағда, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, яки $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

Мошу қараштурулған мисаллардин мону нәтижини алимиз:

$$(x^2)' = 2x, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

Дәл мошундақ $f(x) = C$ (C — турақлиқ) вә $f(x) = x$ функциялириниң һасилатлири мувапик $C' = 0$, $(x)' = 1$ болиду.



1. Аргумент билән функцияниң өсүмчилири арисидә қандақ бағлиниш бар? Жававини чүшәндүрүңлар.
2. Функцияниң чекиттики вә арилиқтики дифференциаллиниши дегән чүшәнчиләрниң пәрқи немидә?
3. Функцияниң чекиттики дифференциаллиниши билән үзүлүсизлигиниң арисидики бағлинишни қандақ чүшәндүрүшкә болиду?

Көнүкмиләр

А

13.1. $f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики өсүмчисини тепиңлар:

а) $f(x) = 1 + 2x$, $x_0 = 4$, $\Delta x = 0,01$;

ө) $f(x) = -5x + 1,6$, $x_0 = -5$, $\Delta x = -0,1$;

б) $f(x) = 3x^2 - 1$, $x_0 = 2$, $\Delta x = 0,1$;

в) $f(x) = 0,5x^2$, $x_0 = -3$, $\Delta x = -0,3$.

13.2. а) Тиктөртбулуңлуқның төрәплири 5 см вә 12 см. Уның кәңлигини 0,8 см-ға, узунлуғини 0,6 см-ға ашурғанда периметр билән мәйданның өсүмчисини ениқлаңлар. ә) тик төртбулуңлуқ үчбулуңлуқның катетлири 3 см, 4 см. Әгәр катетлирини мувапик 0,4 см вә 0,2 см-ға ашурса, уның мәйданиниң өсүмчиси қандақ болиду?

13.3. Функцияның x_0 чекитидики Δx вә Δf өсүмчилирини тепиңлар:

а) $f(x) = \cos x$, $x_0 = \frac{\pi}{4}$; $x = \frac{\pi}{3}$;

ә) $f(x) = \operatorname{tg} x$, $x_0 = \frac{\pi}{6}$; $x = \frac{\pi}{4}$.

В

13.4. $f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики өсүмчисини Δx вә x_0 арқилиқ ипадиләңлар:

а) $f(x) = x^2 + x$;

ә) $f(x) = 2x^2 - x$.

13.5. Алгоритмни пайдилинип, $f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = 3x^2 + 1$, $x_0 = -2$;

ә) $f(x) = x^2 - 2$, $x_0 = -1$.

13.6. Функцияның x_0 чекитидики Δx вә Δf өсүмчилирини тепиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{2} + \sin x$; $x_0 = \frac{3\pi}{4}$; $x = \frac{2\pi}{3}$;

ә) $f(x) = \operatorname{ctg} x - \sqrt{3}$; $x_0 = \frac{\pi}{4}$; $x = \frac{\pi}{3}$.

13.7. Функцияның аргументи Δx өсүмчисини қобул қилғанда x_1 -гә тәң. Функцияның өсүмчисини тепиңлар:

а) $f(x) = \sqrt{x}$, $\Delta x = 0,29$, $x_1 = 2,25$;

ә) $f(x) = \sqrt{x}$, $\Delta x = 0,25$, $x_1 = 1,69$.

13.8. Бир әлниң аһалисиниң сани t вақитида $f(t)$ -қа тәң. t_0 дин $t_0 + \Delta t$ ғичә болған вақит арилиғида функция өсүмчисиниң мәнаси қандақ болиду?

13.9. Чивикниң сол төрәп четидин x жирақлиқтики чекитниң температуриси $f(x)$ -қа тәң. x_0 чекити $x_0 + \Delta x$ чекитигә авушқанда $f(x)$ функцияси өсүмчисиниң физикилик маһийити қандақ?

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияның чеки, өсүмчиси, һасилат, дәрижилик функция.

§ 14. ҺАСИЛАТНИ ТЕПИШ ҚАИДИЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, Һасилат, Һасилат тегиш қайди-лири



Силәр Һасилатни тегиш қайдилири билән тонушисиләр, қайдиләрни қоллинип, Һасилат тегиш-ни үгинисиләр.

$u(x)$ вә $v(x)$ функциялириниң x чекитидики мәналирини қисқичә мундақ бөлгүләйли: $u(x) = u$, $v(x) = v$, $u'(x) = u'$, $v'(x) = v'$.

1-қайдә. Әгәр x чекитидә u вә v функциялириниң u' , v' Һасилатлири бар болса, y чағда мошу чекиттә уларниң қошундилириниңму Һасилати бар болиду вә y

$$(u + v)' = u' + v' \quad (1)$$

формулиси билән ениқлиниду.

Испатлаш. Испатлаш үчүн Һасилатниң ениқлимиси билән Һасилатни тегиш алгоритмини қоллинимиз.

Униң үчүн икки функцияниң қошундиси $u(x) + v(x) = F(x)$ функциясини алайли вә аргумент x -қа Δx өсүмчисини берәйли. Шу чағда $\Delta F(x) = F(x + \Delta x) - F(x) = u(x + \Delta x) - u(x) + v(x + \Delta x) - v(x)$ алимиз. Функцияниң өсүмчисини аргументниң өсүмчиси Δx -қа бөлсәк,

$$\frac{\Delta F(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} + \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

Әнди $\Delta x \rightarrow 0$ функцияниң чекини тапимиз вә Һасилатниң ениқлимиси бойичә $F'(x) = u' + v'$ алимиз. Шу чағда $(u + v)' = u' + v'$. 

2-қайдә. Әгәр x чекитидә u вә v функциялириниң u' , v' Һасилатлири бар болса, y чағда мошу чекиттә уларниң айримлириниң Һасилати бар болиду вә y

$$(u - v)' = u' - v' \quad (2)$$

формулиси билән ениқлиниду.



(2)-формулиниң испатлаш йолини өзәңлар қараштуруңлар.

МИСАЛ

1. $f(x) = x^2 - x + 5$ функциясиниң Һасилатини тапайли.

Йешилиши. $f'(x) = (x^2 - x + 5)' = (x^2)' - (x)' + (5)' = 2x - 1 + 0 = 2x - 1.$

Жаваби: $2x - 1.$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$(10 + x - x^2)' = 1 - 2x$ функциясиниң Һасилати қандақ тепилған?

3-қаидә. Әгәр x чекитидә u вә v функциялириниң һасилатлири бар болса, y чағда мошу чекиттә уларниң көпәйтиндилириниңму һасилати бар болиду вә y

$$(u \cdot v)' = u'v + v'u \quad (3)$$

формулиси билән ениқлиниду.

Нәтижиләр. Әгәр v функциясиниң x чекитидә һасилати бар, C турақлиқ сан болса, y чағда Cv функциясиниңму мошу x чекитидә һасилати бар вә y

$$(Cv)' = C \cdot v' \quad (4)$$

формулиси билән ениқлиниду.



(4)-формулини үчинчи қаидини пайдилинип испатлаңлар.

МИСАЛ

2. $y = 15x^2$ функциясиниң һасилатини тапайли.

Йешилиши: Бу йәрдики $C = 15$, $v = x^2$, демәк, (4)-формулини пайдилинимиз: $y' = (15x^2)' = 15 \cdot (x^2)' = 15 \cdot 2x = 30x$.

Жавави : $30x$.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$y = 6x^2 - 3x + 1$ функциясиниң һасилати $12x - 3$ болидиғанлиғини чүшәндүрүңлар.

4-қаидә. Әгәр x чекитидә u вә v функциялириниң һасилатлири бар вә $v \neq 0$ болса, y чағда мошу чекиттә уларниң бөлүндисиниңму һасилати бар болиду вә y

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (5)$$

формулиси билән ениқлиниду.

МИСАЛ

3. $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ функциясиниң һасилатини һесаплайли.

$$\begin{aligned} \text{Йешилиши: } y' &= \left(\frac{x^2}{x^2 + 1}\right)' = \frac{(x^2)' \cdot (x^2 + 1) - x^2 \cdot (x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} = \\ &= \frac{2x \cdot (x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

Жавави : $\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$.

1 дин чоң һәр қандақ $n \in N$ үчүн $y = x^n$ дәрижилик функцияниң һасилати

$$(x^n)' = nx^{n-1} \quad (6)$$

формулиси билән һесаплиниду.

МИСАЛ

4. а) $y = x^6$; ә) $y = 5x^4 + x^9$; б) $y = \frac{1}{2}x^8 - \frac{3}{x^7}$ функциялирининг ҳасилатини тапайли.

Йешилиши. а) $y' = (x^6)' = 6 \cdot x^{6-1} = 6x^5$;

ә) $y' = (5x^4 + x^9)' = 5(x^4)' + (x^9)' = 5 \cdot 4x^3 + 9x^8 = 20x^3 + 9x^8$;

б) $y' = \left(\frac{1}{2}x^8 - \frac{3}{x^7} \right)' = \frac{1}{2} \cdot (x^8)' - 3 \cdot (x^{-7})' = \frac{1}{2} \cdot 8x^7 - 3 \cdot (-7) \cdot x^{-7-1} = 4x^7 + \frac{21}{x^8}$.

Жаваби : а) $6x^5$; ә) $20x^3 + 9x^8$; б) $4x^7 + \frac{21}{x^8}$.



1. Қошулғучларның сани иккидин ошуқ болидиған қошундининг ҳасилатини қандақ тепишқа болиду?
2. Бөлүндининг ҳасилатини ҳесаплиғанда қандақ шәрт орунлиниши керәк?
3. Бөлүндининг ҳасилатини икки функциянинг көпәйтиндисининг ҳасилати ретидә қараштурушқа боламду?

Көнүкмиләр

А

14.1. Функцияләрнинг ҳасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 4$;

ә) $f(x) = 4x^8 + \sqrt{x}$;

б) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^4$;

в) $f(x) = 4x^6 + 7x^5 + 1$;

г) $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 3x - 4$;

ғ) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x$;

д) $f(x) = 2\sqrt{x} - 2$;

е) $f(x) = -5x^2 + x + 1$.

14.2. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

а) $f(x) = 4x^2 + 2x$;

ә) $f(x) = 3x^2 - 4x$;

б) $f(x) = x^2 + x - 1$;

в) $f(x) = -0,5x^2 - 4x + 0,1$.

14.3. $y = f(x)$ функциялирининг x_0 чекитидики ҳасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = x^2(x - 1)$, $x_0 = -1$; ә) $f(x) = \frac{2x+1}{x}$, $x_0 = -1$;

б) $f(x) = 3x(x + 1)$, $x_0 = -\frac{2}{3}$; в) $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$, $x_0 = 1$.

14.4. $f'(x) > 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = 18x^2 - 7x + 1$;

ә) $f(x) = \frac{x^2}{2} - 5x + 2$;

б) $f(x) = 1 + 3x - x^2$;

в) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{6}{7}$.

14.5. Функцияләрнинг ҳасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = (x + 5)(x - 4)$;

ә) $f(x) = \sqrt{2}x^2 - (3x - 2)(5x + 1)$;

б) $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x - 1}$;

в) $f(x) = \frac{3x - x^2}{x + 2}$.

В

14.6. Функцияларның hasилатини тепиңлар:

$$а) f(x) = \frac{x^2 - 2x}{3 + x^2};$$

$$ө) f(x) = \frac{16 - x^4}{x^2 + 4}.$$

$$б) f(x) = \frac{3x^3 - 1}{x^3};$$

$$в) f(x) = \frac{x^2}{x^4 + 1}.$$

14.7. $f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики hasилатиниң мәнасини тепиңлар:

$$а) f(x) = 4x^4 - 5x^2, \quad x_0 = 1; \quad ө) f(x) = 2x^5 - 3x^3 + 1, \quad x_0 = -2.$$

14.8. $y = f(x)$ функциясиниң $x = -1$ болғандики hasилатиниң мәнасини тепиңлар:

$$а) f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1};$$

$$ө) f(x) = \frac{x}{2x - 1};$$

$$б) f(x) = \frac{3}{2x + 2};$$

$$в) f(x) = \frac{x + 4}{2x - 1}.$$

14.9. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

$$а) f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1; \quad ө) f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 1.$$

14.10. $f'(x) > 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

$$а) f(x) = 12x^3 + 18x^2 - 7; \quad ө) f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x.$$

14.11. $f'(x) \leq 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

$$а) f(x) = x^3 + 0,5x^2 - 4x + 2; \quad ө) f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 0,5x^2 + 2x.$$

14.12. Әгәр $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$ вә $g(x) = x^4 - 3x^3 - 3x$ болса, у чағда $f'(0)$ вә $g'(0)$ мәналирини селиштуруңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияниң графиги, функция вә аргументниң өсүмчиси, hasилат, яндашма, hasилат тепиш қайдилири.

§ 15. НАСИЛАТНИҢ ФИЗИКИЛИҚ ВӘ ГЕОМЕТРИЯЛИК МАҢИЙИТИ. ФУНКЦИЯ ГРАФИҒА ЖҮРГҮЗҮЛГӘН ЯНДАШМИНИҢ ТӘҢЛИМИСИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, һасилат, функция графиги, яндашма



Силәр һасилатниң физикилик вә геометриялик маһийитини билесиләр; яндашминиң тәңлимиси билән тонушисиләр, һасилатниң физикилик вә геометриялик маһийитини қоллинип, һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

Һасилатниң физикилик маһийити

Түз сизик бойи билән һәрикәтләнгән физикилик жисимниң t вақит ичидики жүрүп өткән йоли $s(t)$ функцияси билән берилсун. Һәрикәттики жисимниң $t + \Delta t$ өткәндин кейинки йоли $s(t + \Delta t)$ функцияси билән ениқлиниду. Әнди вақит t -дин $t + \Delta t$ миқдариға өзгәргәндә, йолниң миқдари

$$s(t + \Delta t) - s(t)$$

айримисиға тәң. Әнди мошу айримини Δt вақитқа бөлсәк, һәрикәттики жисимниң оттура илдамлиғини алимиз:

$$\frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}, \text{ яки } v_{\text{орт}} = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}.$$

Ахирқи ипадидин Δt нөлгә интилғандики чәккә көчсәк, оттура илдамлиқ t вақитидики илдамлиққа интилиду $v_{\text{орт}} \rightarrow v(t)$ яки

$$v(t) = s'(t) \quad (1)$$

тәңлимисини алимиз.

Бу йөрдә $s(t)$ — һәрикәттики жисимниң t вақит ичидики жүргән йоли, әнди $v(t) = s'(t)$ — һәрикәттики жисимниң t вақит мәзгилидики *дәқиқий илдамлиғи*.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

Егизликтин әркин чүшкән жисимниң t вақит ичидики жүргән йоли $h(t) = g \frac{t^2}{2}$ функцияси билән ениқлинидиғанлиғи физика курсидин бәлгүлүк.

t вақит мәзгилидики жисимниң чүшүш илдамлиғи $v(t) = h'(t) = \left(g \frac{t^2}{2} \right)' = g \frac{2t}{2} = gt$, йәни $h'(t) = v(t) = gt$, бу йәрдики $g = 9,81 \text{ м/с}^2$ — әркин чүшкән жисимниң иштиклиши.

Демәк, $v(t) = gt$ ипадиси берилгән $h(t) = \frac{g}{2} t^2$ тәңлимисигә мувапик һәрикәтлинидиған жисимниң (функцияниң) илдамлиғиниң тезлишини бериду.

Умумән, $y = f(x)$ функциясиниң x чекитидики һасилати униң x чекитидики өзгириш илдамлиғини ениқлайли. Бу һасилатниң физикилик маһийити.

Әгәр $v(t)$ илдамлығындың һасиләт тапидыған болсақ, у чағда $v'(t) = (gt)' = g$ чиқиду. Демәк, илдамлығын елинған һасиләт иштикләшкә тәң.

МИСАЛ

1. Һәрикәттики жисимниң жүргән йоли $S(t) = t^2 + 2$ формулиси билән берилгән. Мошу жисимниң $t = 5$ с пәйтидики тезлишиш илдамлығы билән иштиклишини тапайли.

Йешилиши. Тезлишиш илдамлығы $S(t) = t^2 + 2$ функциясиниң $t = 5$ аргумент мәнәсидики һасиләтигә тәң: $v(t) = S'(t) = 2t$, $v(5) = 2 \cdot 5 = 10$.

Иштикләшни һесаплаш үчүн тезлишиш илдамлығын һасиләт алимиз, шу вақитта $a(t) = v'(t) = (2t)' = 2$, $a(5) = 2$.

Жаваби : 10 м/с; 2 м/с².

Һасиләтниң геометриялик маһийити

$y = f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики $y' = f'(x)$ һасиләти бар дөп ойлап, униң геометриялик маһийитини ениқлайли. 51-сүрәттики AB әгир сизиги $y = f(x)$ функциясиниң графиги болсун. N_0 вә N чекитлири — AB әгир сизигиниң бойида ятқан чекитләр. Мошу икки чекит арқилиқ жүргүзүлгән TT' — қийғучи түз. Ox оқиниң ижабий йөнилиши билән TT' түзиниң арисидики булуңни β дөп бөлгүләйли. Ox оқиға параллель N_0E , әнди N чекити арқилиқ Oy оқиға параллель NE түзлирини жүргүзимиз. Шу чағда N_0EN тик үчбулуңлуқ чиқиду. $\angle N_0EN = 90^\circ$, $\angle EN_0N = \beta$, $MN_0 = E_1E = f(x_0)$, сәвәви $N_0(x_0, f(x_0))$ вә $MN_0 \parallel E_1E$.

$$N_0E = \Delta x, E_1N = f(x_0 + \Delta x), EN = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta y.$$

$\frac{EN}{N_0E} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg} \beta$. AB әгириниң бойидики N_0 силжымайдыған чекит болсун, әнди N чекитини әгирниң бойи билән силжитқанда N_0 чекити билән қәвәтләшсун дөп пәрәз қилайли.


Шу чағда қийғучи TT' әгирниң N_0 чекитидики яндашмиси, йәни FF' түзигә айлениду. Қийғучи билән Ox оқиниң ижабий йөнилишиниң арисидики β булуңи яндашма ва Ox оқиниң ижабий йөнилишиниң арисидики α булуңиға айлениду, йәни $\Delta x \rightarrow 0$ интилғанда $\beta \rightarrow \alpha$ (51-сүрәт).

Мошу жуқурида ейтилғанларни мону тәңлимә билән йезишқә болиду, $\Delta x \rightarrow 0$ болғанда $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \rightarrow f'(x_0)$. Ундақ болса, $\beta \rightarrow \alpha$ интилғанда $\operatorname{tg} \beta \rightarrow \operatorname{tg} \alpha = k$.

Демәк, $y = f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики һасиләти $f'(x_0)$ мошу функция графигиниң $(x_0; f(x_0))$ чекити арқилиқ өтидиған яндашминиң булуңлуқ коэффициентигә тәң:

$$f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha = k. \quad (2)$$

(2)-формула һасиләтниң геометриялик маһийитини бериду.



51-сүрәт

Насилатның геометриялық маңыыты — функцияның графигига жүргүзүлген яндашмининң булуңлуқ коэффициенти.

МИСАЛ

2. $y = x^2$ параболисига $N_0(1; 1)$ чекитиде жүргүзүлген яндашма билән Ox оқиниң ижабий йөнилишиниң арасидики булуңни тапайли.

Йешилиши. $y = x^2$ функциясиниң насилати $y' = 2x$. (2)-формула бойиче $f'(1) = \operatorname{tg} \alpha = 2 \cdot 1 = 2$, яндашма билән Ox оқиниң ижабий йөнилишиниң арасидики булуң $\alpha = \operatorname{arctg} 2$.

Жаваби : $\operatorname{arctg} 2$.

Функцияниң графигида берилгән чекиттә жүргүзүлгән яндашма билән Ox оқиниң арасидики булуң:

- а) тар болса, y чағда берилгән чекиттики насилат ижабий;
- ә) кәң болса, y чағда берилгән чекиттики насилат сәлбий;
- б) нөлгә тәң болса, y чағда берилгән чекиттики насилат нөлгә тәң.

Берилгән чекиттә функция графигига жүргүзүлгән яндашмининң тәңлимиси.

$y = f(x)$ функцияси вә униң графигига тәәлуқ $N_0(x_0; y_0)$ чекитидики $f'(x_0)$ насилатиниң мәнаси берилсүн.

Яндашма түз болғанлиқтин, яндашмининң тәңлимисини $y = kx + b$ сизиклиқ функция түридә издәймиз. Бу йөрдә $k = \operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$, демәк $y = f'(x_0)x_0 + b$. Мошу тәңлимигә $N_0(x_0; f(x_0))$ чекитиниң координа-тилирини қоюмиз: $f(x_0) = f'(x_0)x_0 + b$, буниңдин $b = f(x_0) - f'(x_0)x_0$. Ахирқи ипадини $y = f'(x_0)x + b$ тәңлимисигә қойсақ, $y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ чиқиду. Демәк,

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (3)$$

(3)-тәңлимә *яндашмининң тәңлимиси* болуп һесаплиниду.

$A_1(a; f(a))$, $C_1(c; f(c))$ чекитлири арқилиқ өтүдиған қийғучисиға параллель болидиған $f(x)$ функциясиниң графигига $(a; c)$ интервалидин елинған абсцисса b -ға тәң B чекитиде жүргүзүлгән AC яндашмининң бар экәнлигини чүшәндүрүш үчүн насилатниң геометриялиқ маңыитини пайдилинимиз.


$y = f(x)$ функциясиниң B чекити арқилиқ өтидиған AC яндашмисига параллель A_1C_1 түзини жүргүзүмиз (52-сүрәт). Шу чағда α булуңи A_1C_1 қийғучиниң янту булуңига тәң, йәни $f'(b) = \operatorname{tg} \alpha = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$.

Шуниң билән, әгәр $f(x)$ функцияси $(a; c)$ арилиғида дифференциаллинидиған болса, y чағда

$$f'(b) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}. \quad (4)$$

тәңлиги орунлинидиғандәк $b \in (a; c)$ чекити тепилиду.

Бу формула *Лагранж формулиси* дөп атилиду.



52-сүрәт

АЛГОРИТМ

$f(x)$ функциясының графигіне абсциссисі x_0 -ге тең чекітте жүргүзүлген яндашминің теңлімисіні йезиш алгоритми:

- 1) x_0 -ге мувапик $f(x_0)$ -ни һесаплаш;
- 2) $f(x)$ функциясының һасилатини тегиш;
- 3) x_0 -тики һасилатниң мәнасини $f'(x_0)$ һесаплаш;
- 4) тепилған мәналарни (3)-формулиға қоюп, яндашминің теңлімисіні йезиш.

МИСАЛ

3. $y = x^2 - 2x - 1$ функциясыне абсциссисі $x_0 = 3$ болидиған чекит арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисіні язайли.

Йешилиши. Яндашминің теңлімисіні йезиш алгоритмини қоллинимиз:

- 1) $x_0 = 3$, у чағда $f(3) = 3^2 - 3 \cdot 2 - 1 = 2$;
- 2) $f'(x) = (x^2 - 2x - 1)' = 2x - 2$;
- 3) $f'(3) = 2 \cdot 3 - 2 = 4$;
- 4) өнди тепилған мәналарни (2) теңлімиге қоюмиз: $y = 2 + 4(x - 3) = 2 + 4x - 12 = 4x - 10$. Демөк, яндашминің теңлімисі $y = 4x - 10$ болиду.

Жаваби: $y = 4x - 10$.

МИСАЛ

4. $y = 2x^2 - 4x + 5$ параболисига $(0; 5)$ вә $(2; 5)$ чекитлири арқилиқ жүргүзүлген яндашмиларниң қандақ чекитте қийилишидиғанлиғини ениқлайли.

Йешилиши. 1) Берилген функция графигинің $(0; 5)$ чекити арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисіні язимиз.

$$x_0 = 0, f(0) = 5; f'(x) = (2x^2 - 4x + 5)' = 4x - 4; f'(0) = 4 \cdot 0 - 4 = -4.$$

Өнди тепилған мәналарни (2)-теңлімиге қоюмиз: $y = 5 + (-4) \cdot (x - 0) = 5 - 4x$. Демөк, графикқа $(0; 5)$ чекити арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисі $4x + y = 5$ болиду.

2) Берилген функция графигіне $(2; 5)$ чекити арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисіні язимиз. $x_0 = 2, f(2) = 5$;

$$f'(x) = (2x^2 - 4x + 5)' = 4x - 4; f'(2) = 4 \cdot 2 - 4 = 4.$$

Өнди тепилған мәналарни (3)-теңлімиге қоюмиз. Шу вақитта $y = 5 + 4(x - 2) = 4x - 3$. Демөк, $(2; 5)$ чекити арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисі $4x - y = 3$ болиду.

3) Өнди яндашмиларниң $4x + y = 5$ вә $4x - y = 3$ теңлімилиридин теңлімиләр системисіні түзүп вә уни йешип, $x = 1, y = 1$ алимиз. Демөк, яндашмиларниң қийилишиш чекити $(1; 1)$.

Жаваби : $(1; 1)$.



1. Һасилатниң физикилик маһийити тезлишиш илдамлиқму яки оттура илдамлиқму?
2. Функцияниң һәр қандақ чекити арқилиқ өтидиған яндашма билән һасилат чүшәнчисиниң арисида қандақ бағлиниш бар?

Көнүкмиләр**А**

15.1.а) $x(t) = 2t^2 + 3$ қануни бойичө һәрикәтлинидиған жисимниң $t = 2$ с мәзгилидики һәрикәт илдамлиғини тегиңлар.

ә) Чекит $x(t) = 15t^2 + 6t$ қануни бойичө һәрикәтлиниду. Һәр қандақ t вақит мәзгилидө илдамлиқни һесаплашқа беғишланған

Насилатның геометриялық маңыыты — функцияның графигига жүргүзүлген яндашмининң булуңлуқ коэффициенти.

МИСАЛ

2. $y = x^2$ параболисига $N_0(1; 1)$ чекитиде жүргүзүлген яндашма билән Ox оқиниң ижабий йөнилишиниң арисидики булуңни тапайли.

Йешилиши. $y = x^2$ функциясиниң насилати $y' = 2x$. (2)-формула бойиче $f'(1) = \operatorname{tg} \alpha = 2 \cdot 1 = 2$, яндашма билән Ox оқиниң ижабий йөнилишиниң арисидики булуң $\alpha = \operatorname{arctg} 2$.

Жаваби : $\operatorname{arctg} 2$.

Функцияниң графигида берилгән чекиттә жүргүзүлгән яндашма билән Ox оқиниң арисидики булуң:

- а) тар болса, y чағда берилгән чекиттики насилат ижабий;
- ә) кәң болса, y чағда берилгән чекиттики насилат сәлбий;
- б) нөлгә тәң болса, y чағда берилгән чекиттики насилат нөлгә тәң.

Берилгән чекиттә функция графигига жүргүзүлгән яндашмининң тәңлимиси.

$y = f(x)$ функцияси вә униң графигига тәәлуқ $N_0(x_0; y_0)$ чекитидики $f'(x_0)$ насилатиниң мәнаси берилсүн.

Яндашма түз болғанлиқтин, яндашмининң тәңлимисини $y = kx + b$ сизиклиқ функция түридә издәймиз. Бу йөрдә $k = \operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$, демәк $y = f'(x_0)x_0 + b$. Мошу тәңлимигә $N_0(x_0; f(x_0))$ чекитиниң координа-тилирини қоюмиз: $f(x_0) = f'(x_0)x_0 + b$, буниңдин $b = f(x_0) - f'(x_0)x_0$. Ахирқи ипадини $y = f'(x_0)x + b$ тәңлимисигә қойсақ, $y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ чиқиду. Демәк,

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (3)$$

(3)-тәңлимә *яндашмининң тәңлимиси* болуп һесаплиниду.

$A_1(a; f(a))$, $C_1(c; f(c))$ чекитлири арқилиқ өтүдиған қийғучисиға параллель болидиған $f(x)$ функциясиниң графигига $(a; c)$ интервалидин елинған абсцисса b -ға тәң B чекитиде жүргүзүлгән AC яндашмининң бар экәнлигини чүшәндүрүш үчүн насилатниң геометриялиқ маңыитини пайдилинимиз.


$y = f(x)$ функциясиниң B чекити арқилиқ өтидиған AC яндашмисига параллель A_1C_1 түзини жүргүзүмиз (52-сүрәт). Шу чағда α булуңи A_1C_1 қийғучиниң янту булуңиға тәң, йәни $f'(b) = \operatorname{tg} \alpha = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$.

Шуниң билән, әгәр $f(x)$ функцияси $(a; c)$ арилиғида дифференциаллинидиған болса, y чағда

$$f'(b) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}. \quad (4)$$

тәңлиги орунлинидиғандәк $b \in (a; c)$ чекити тепилиду.

Бу формула *Лагранж формулиси* дәп атилиду.



52-сүрәт

АЛГОРИТМ

$f(x)$ функциясының графигіне абсциссисі x_0 -ге тең чекітте жүргүзүлген яндашминің теңлімисіні йезиш алгоритми:

- 1) x_0 -ге мувапик $f(x_0)$ -ни ҳесаплаш;
- 2) $f(x)$ функциясының ҳасилатини тегиш;
- 3) x_0 -тики ҳасилатниң мәнасини $f'(x_0)$ ҳесаплаш;
- 4) тепилған мәналарни (3)-формулиға қоюп, яндашминің теңлімисіні йезиш.

МИСАЛ

3. $y = x^2 - 2x - 1$ функциясиге абсциссисі $x_0 = 3$ болидиған чекит арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисіні язайли.

Йешилиши. Яндашминің теңлімисіні йезиш алгоритмин қоллинимиз:

- 1) $x_0 = 3$, у чағда $f(3) = 3^2 - 3 \cdot 2 - 1 = 2$;
- 2) $f'(x) = (x^2 - 2x - 1)' = 2x - 2$;
- 3) $f'(3) = 2 \cdot 3 - 2 = 4$;
- 4) өнди тепилған мәналарни (2) теңлімиге қоюмиз: $y = 2 + 4(x - 3) = 2 + 4x - 12 = 4x - 10$. Демек, яндашминің теңлімисі $y = 4x - 10$ болиду.

Жаваби: $y = 4x - 10$.

МИСАЛ

4. $y = 2x^2 - 4x + 5$ параболисиге $(0; 5)$ вә $(2; 5)$ чекитлири арқилиқ жүргүзүлген яндашмиларниң қандақ чекитте қийилишидиғанлиғини ениқлайли.

Йешилиши. 1) Берилген функция графигинің $(0; 5)$ чекити арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисіні язимиз.

$$x_0 = 0, f(0) = 5; f'(x) = (2x^2 - 4x + 5)' = 4x - 4; f'(0) = 4 \cdot 0 - 4 = -4.$$

Өнди тепилған мәналарни (2)-теңлімиге қоюмиз: $y = 5 + (-4) \cdot (x - 0) = 5 - 4x$. Демек, графикқа $(0; 5)$ чекити арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисі $4x + y = 5$ болиду.

2) Берилген функция графигиге $(2; 5)$ чекити арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисіні язимиз. $x_0 = 2, f(2) = 5$;

$$f'(x) = (2x^2 - 4x + 5)' = 4x - 4; f'(2) = 4 \cdot 2 - 4 = 4.$$

Өнди тепилған мәналарни (3)-теңлімиге қоюмиз. Шу вақитта $y = 5 + 4(x - 2) = 4x - 3$. Демек, $(2; 5)$ чекити арқилиқ жүргүзүлген яндашминің теңлімисі $4x - y = 3$ болиду.

3) Өнди яндашмиларниң $4x + y = 5$ вә $4x - y = 3$ теңлімилиридин теңлімиләр системисіні түзүп вә уни йешип, $x = 1, y = 1$ алимиз. Демек, яндашмиларниң қийилишиш чекити $(1; 1)$.

Жаваби : $(1; 1)$.



1. Ҳасилатниң физикилик маһийити тезлишиш илдамлиқму яки оттура илдамлиқму?
2. Функцияниң һәр қандақ чекити арқилиқ өтидиған яндашма билән ҳасилат чүшәнчисиниң арисида қандақ бағлиниш бар?

Көнүкмиләр**А**

15.1.а) $x(t) = 2t^2 + 3$ қануни бойичә һәрикәтлинидиған жисимниң $t = 2$ с мәзгилидики һәрикәт илдамлиғини тегиңлар.

ә) Чекит $x(t) = 15t^2 + 6t$ қануни бойичә һәрикәтлиниду. Һәр қандақ t вақит мәзгилидә илдамлиқни ҳесаплашқа беғишланған

формула арқилиқ чекитнің $t = 1$ с мәзгилидики илдамлығыни вә иштиклишини тепиңлар.

б) Жқисим $x(t) = t^2 + 4t - 1$ қануни бойичө һәрикәтлиниду. Һәрикәт башланғандин 1 с кейинки илдамлығыни тепиңлар.

15.2. $y = f(x)$ функцияси графигиниң берилгән А чекитидин өтидиған яндашминиң абсцисса оқиға янту булуңиниң тангенсини тепиңлар:

а) $f(x) = 2x^2 + 2$, $A(0; 2)$;

ә) $f(x) = 3x^2 - 1$, $A(2; 11)$;

б) $f(x) = 4x^2 + 3x$, $A(1; 7)$.

15.3. $y = f(x)$ функциясиниң графигиға абсциссиси x_0 болидиған чекиттө жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = 4x^2 - 2$, $x_0 = -1$;

ә) $f(x) = 3x^2 + 1$, $x_0 = 1$;

б) $f(x) = 1 - 5x^2$, $x_0 = 1$.

15.4. $y = f(x)$ функцияси графигиға берилгән А чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + 1$, $A(0; 1)$;

ә) $f(x) = 3 - x^2$, $A(-1; 2)$.

В

15.5. $y = f(x)$ функцияси графигиға абсциссиси x_0 болидиған чекиттө жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 5$, $x_0 = -1$;

ә) $f(x) = -\frac{1}{8}x^4 + 3$, $x_0 = 1$.

15.6. Берилгән $f(x)$ функцияси графигиға абсциссиси $x = a$ болидиған чекиттө жүргүзүлгән яндашминиң абсцисса оқиға янту булуңиниң мәнәсини тепиңлар:

а) $f(x) = x^2 - 0,5x + 1$, $a = 1$;

ә) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{7}$, $a = 1,5$.

15.7. $y = f(x)$ функциясиниң графигиға $(x_0; f(x_0))$ чекитидө жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = 3x + 2x^2$, $x_0 = 1$;

ә) $f(x) = 4x^2 + x - 1$, $x_0 = 2$.

15.8. $y = f(x)$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгән яндашма абсцисса оқиға параллель болидиғандөк түзниң тәңлимисини йезиңлар:

а) $y = 2 + x^2$;

ә) $y = -x^2$;

б) $y = x^2 - 3$;

в) $y = x^2 - 2x$.

15.9. $y = \frac{1}{2}(x - 1)^2$ параболисига $(-1; 2)$ вә $(2; 0,5)$ чекитлири арқилиқ жүргүзүлгән яндашмилар қандақ чекитлөрдө қийилишиду?

15.10. $y = f(x)$ функциясы графигиниң ордината оқи билән қийилишиш чекити арқилиқ өтүдиған яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $y = -2x + x^2$; ө) $y = -\frac{1}{2}x^2 - x$.

15.11. $y = x + 1$ түзигә параллель болидиған $y = 3 - x^2$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, ениқлиниш даириси, мәналар жигиндиси, һасилат тепши қаидилири.

§ 16. МУРӘККӘП ФУНКЦИЯНИҢ ҺАСИЛАТИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, мурәккәп функция, һасилат



Силәр мурәккәп функцияниң һасилатини тепиш формулиси билән тонушисиләр, формулини қоллинип мурәккәп функцияниң һасилатини тепишни үгинисиләр.

ӘСКӘ ЧҮШИРӘЙЛИ!

1) $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$ болса, y чағда $f(g(x))$, $g(f(x))$ функциялирини қураштуруңлар.

2) $y = 3 + \sqrt{x}$ болса, y чағда $f(x)$ вә $g(x)$ йезиңлар.

Әгәр $y = f(u)$ функциясиниң u чекитидә, $u = g(x)$ функциясиниң x чекитидә һасилатлири бар болса, y чағда мурәккәп функцияниң x аргументи бойичә һасилати бар болуп вә y һасилат

$$y' = f'(g(x)) g'(x) \quad (1)$$

формулиси билән ениқлиниду.

МИСАЛ

1. а) $y = (6x - 13)^5$; ө) $y = \sqrt{1 - x^3}$ функциясиниң һасилатини тапайли.

Йешилиши. а) Бу йәрдики $f(u) = u^5$, $u(x) = 6x - 13$. U чағда $f'(u) = 5u^4$, $u'(x) = 6$.

U чағда $y' = 5u^4 u' = 5(6x - 13)^4 \cdot 6 = 30(6x - 13)^4$;

ө) Бу йәрдики $f(u) = \sqrt{u}$, $u(x) = 1 - x^3$, y чағда $f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$, $u'(x) = -3x^2$;

Шу чағда $y' = \frac{1}{2\sqrt{u}} u' = \frac{1}{2\sqrt{1 - x^3}} (-3x^2) = -\frac{3x^2}{2\sqrt{1 - x^3}}$.

Жаваби : $30(6x - 13)^4$; ө) $-\frac{3x^2}{2\sqrt{1 - x^3}}$.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$(x^5 + 3x - \sqrt{x+1})' = 5x^4 + 3 - \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$ мурәккәп функцияниң һасилати қандақ тепилған?



1. $y = x^n$, $y = (3x + 5)^n$, $y = \cos x$, $y = \cos(1 + 3x^2)$ функциялири мурәккәп функция боламду?

Көнүкмиләр

А

16.1. $y = f(g(x))$ мурәккәп функциясини төшкил қилидиған f вә g функциялирини ениқлайли:

а) $y = (2x - 1)^2$; ә) $y = \sqrt{3x + 2}$; б) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$; в) $y = \operatorname{tg} 4x$.

16.2. $y = f(g(x))$, $y = g(f(x))$ мурәккәп функциялирини йезиңлар:

а) $f(x) = \cos x$, $g(x) = 2x$; ә) $f(x) = x^3$, $g(x) = 3x + 1$;

б) $f(x) = \sin x$, $g(x) = 4x - 1$; в) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{2}{x + 1}$.

Функцияниң һасилатини тепиңлар (16.3-16.4):

16.3. а) $f(x) = \sqrt{x + 15}$;

ә) $f(x) = \sqrt{7 - 8x}$;

б) $f(x) = (-x^2 + 5)^3$;

в) $f(x) = (-8x^2 + 1)^4$.

16.4. а) $f(x) = 5(3x + x^3 - 4x^4)^3$;

ә) $f(x) = (4x^2 - x^4)^2$;

б) $f(x) = (3\sqrt{x} - 2x^2 + x^5)^5$;

в) $f(x) = (4\sqrt{x} + 6x^2 - 5x)^5$.

В

16.5. $y = f(g(x))$, $y = g(f(x))$ мурәккәп функциялирини йезиңлар:

а) $f(x) = \sin x$, $g(x) = \frac{2}{x^3 - 1}$; ә) $f(x) = 3x^3 + 2x^2$, $g(x) = \operatorname{tg} x$.

16.6. Функцияниң һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = (7x^5 - 3x^7)^{17} + (6 - 3x^3)^{13}$;

ә) $f(x) = \left(\frac{1}{3} - 9x^3\right)^{27} - \left(\frac{1}{5}x - 9\right)^{30}$;

б) $f(x) = (4 - 5x)^{10} - (5 - 4x)^{20}$;

в) $f(x) = (x^5 - 4x)^{13} + \left(\frac{1}{6} - 9x^6\right)^{14}$.

Функцияниң һасилатини тепиңлар (16.7—16.9):

16.7. а) $f(x) = \left(4 + \frac{1}{x^2}\right)^3$;

ә) $f(x) = \left(5 - \frac{4}{x}\right)^2$.

16.8. а) $f(x) = \frac{12}{x - \sqrt{x}} - (x - 6)^2$; ә) $f(x) = \frac{10}{x + \sqrt{x}} + (\sqrt{x} - 1)^3$.

16.9. а) $f(x) = \sqrt{1 - 3x^2} + \frac{1}{x^2 + 4}$;

ә) $f(x) = (8 - 3x^6)^3 - \frac{x^2}{5 - x^2}$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Һасилат, һасилатниң ениқлимиси, һасилатни тепиши қайдилири, мурәккәп функцияниң һасилати, тригонометриялик функцияләр, тригонометрия формулилири.

§ 17. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛӘРНИҢ ҲАСИЛАТЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, һасилат, тригонометриялик функцияләр.



Силәр тригонометриялик функцияләрниң һасилатини тепиш формулиси билән тонушусиләр; формулиларни қоллинип тригонометриялик функцияләрниң һасилатини тепишни үгинисиләр.

I. $y = \sin x$ функциясиниң һасилати.

Аргумент x -қа Δx өсүмчә бәрсәк, функция аргументиниң өсүмчисигә мувапиқ өсүмчә алиду, $y + \Delta y = \sin(x + \Delta x)$.

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \cdot \sin \frac{x + \Delta x - x}{2} \cdot \cos \frac{x + \Delta x + x}{2} = 2 \cdot \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right).$$

Әнди функция өсүмчисини аргумент өсүмчисигә бөлүмиз:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x} = 2 \cdot \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \cdot \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right).$$

Ахирқи тәңлимидин аргумент өсүмчиси Δx нөлгә интилғандики чөккә көчсәк, у чағда $y' = 1 \cdot \cos x = \cos x$ алимиз, сәвәви $\Delta x \rightarrow 0$ болғанда, $\frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \rightarrow 1$

($x \rightarrow 0$ болғандики $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ формулиси бойичә. Бу формула алий математика курсида қараштурилиду, әнди $\Delta x \rightarrow 0$ һалитидә $\cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \rightarrow \cos(x + 0) = \cos x$.

Демәк,

$$(\sin x)' = \cos x. \quad (1)$$

II. $y = \cos x$ функциясиниң һасилати.

Униң үчүн $\cos x = \sin \left(\frac{\pi}{2} + x \right)$ формулисини вә мурөккәп функцияниң һасилатини тепиш формулисини қоллинимиз: $y' = (\cos x)' = \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \right)' = \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \cdot \left(\frac{\pi}{2} + x \right)' = -\sin x \cdot 1 = -\sin x$.

Демәк,

$$(\cos x)' = -\sin x. \quad (2)$$

III. $y = \operatorname{ctg} x$ функциясиниң һасилати.

$\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $\sin x \neq 0$, $x \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ экәнлиги бөлгүлүк, демәк, үчинчи қайдини қоллинимиз.

$$(\operatorname{ctg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \cdot \sin x - \cos x \cdot (\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} =$$

$$= -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Шу чағда

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}. \quad (3)$$

IV. $y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң һасилати.

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}. \quad (4)$$



(4)-формулиниң дәлиллинишни өзәңлар қараштуруңлар.

Елинған формулиға мисаллар қараштурайли.

МИСАЛ

1. а) $y = 3\sin x$; ә) $y = 7,5 - \cos 4x$; б) $y = 2\sin^2 x$;
в) $y = \operatorname{ctg} 3x - \operatorname{tg} 3x$ функциясиниң һасилатини һесаплайли.

Йешилиши.

а) $y' = (3\sin x)' = 3\cos x$;

ә) $y' = (7,5 - \cos 4x)' = (7,5)' - (\cos 4x)'(4x)' = 0 - (-\sin 4x) \cdot 4 = 4\sin 4x$;

б) $y' = (2\sin^2 x)' = 2(\sin^2 x)' = 2 \cdot 2\sin x(\sin x)' = 4\sin x \cos x = 2(2\sin x \cos x) = 2\sin 2x$;

в) $y' = (\operatorname{ctg} 3x - \operatorname{tg} 3x)' = (\operatorname{ctg} 3x)' - (\operatorname{tg} 3x)' = -\frac{1}{\sin^2 3x} \cdot (3x)' - \frac{1}{\cos^2 3x} \cdot (3x)' = -\frac{3}{\sin^2 3x} -$
 $-\frac{3}{\cos^2 3x} = -\frac{3(\cos^2 3x + \sin^2 3x)}{\sin^2 3x \cos^2 3x} = -\frac{3}{\frac{1}{4} \sin^2 6x} = -\frac{12}{\sin^2 6x}.$

Жаваби : а) $3\cos x$; ә) $4\sin 4x$; б) $2\sin 2x$; в) $-\frac{12}{\sin^2 6x}.$

ӘСТӘ САҚЛАҢЛАР!

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \cos x; & (\cos x)' &= -\sin x \\ (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$



1. $y = \sin x$ вә $y = \cos x$ функциялириниң ениқлиниш даирисиниң һәр қандақ чекитидә һасилати бар дәп ейтишқа боламду?
2. $y = \operatorname{tg} x$ вә $y = \operatorname{ctg} x$ функциялириниң ениқлиниш даирисиниң һәр қандақ чекитидә һасилати бар дәп ейтишқа боламду? Жавабиңларни чүшәндүрүңлар.
3. $y = \sin x$ функцияси һасилатиниң бар болушиниң геометриялик маһийитини қандақ чүшәндүрисиләр?

Көнүкмиләр

А

Функцияның һасилатини тепиңлар (17.1—17.4):

17.1. а) $f(x) = 3\sin x + 2\cos x$;

ә) $f(x) = \operatorname{ctgx} - 1$;

б) $f(x) = \operatorname{tg} x + \sin x$;

в) $f(x) = 2\cos x - \operatorname{tg} x$.

17.2. а) $f(x) = 2x + 2\operatorname{tg} x$;

ә) $f(x) = 4x \operatorname{ctg} x$;

б) $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$;

в) $f(x) = \operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

17.3. а) $f(x) = -\cos 2x + \sin 2x$;

ә) $f(x) = 3x + \cos 4x$;

б) $f(x) = x^3 - 2\sin 2x$;

в) $f(x) = 2\operatorname{tg} 2x$.

17.4. а) $f(x) = 3\operatorname{ctg} x - 4x^3$;

ә) $f(x) = \sin 2x + \operatorname{tg} x$;

б) $f(x) = 4 - \frac{1}{4}\operatorname{tg} x$;

в) $f(x) = x^2 \operatorname{ctg} x$.

17.5. Функцияның һасилатиниң берилгән чекиттики мәнасини һесаплаңлар:

а) $f(x) = \cos x + 1, x = \frac{\pi}{6}$;

ә) $f(x) = \operatorname{tg} x - 2, x = \frac{\pi}{3}$;

б) $f(x) = \frac{2\sin x}{3}, x = \frac{\pi}{3}$;

в) $f(x) = \operatorname{ctg} x + \frac{1}{3}\operatorname{tg} x, x = \frac{\pi}{3}$.

17.6. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

а) $f(x) = -\sin x - 1$;

ә) $f(x) = \cos 4x + 1$.

17.7. $f(x)$ функциясиниң графигиға абсциссиси x_0 болидиған чекиттә жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = \sin x; x_0 = \frac{2\pi}{3}$;

ә) $f(x) = \operatorname{tg} x; x_0 = \frac{\pi}{4}$.

17.8. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

а) $f(x) = 3\sin 2x$;

ә) $f(x) = 4\cos 2x$.

В

Функцияның һасилатини тепиңлар (17.9—17.11):

17.9. а) $f(x) = \cos x \cdot (\cos x - 1)$;

ә) $f(x) = \operatorname{tg} x (\cos x + 2)$;

б) $f(x) = \sin x (\operatorname{ctg} x - 1)$;

в) $f(x) = (4x - 1) \cdot \sin x$.

17.10. а) $f(x) = \cos^2 x - 1$;

ә) $f(x) = 3\sin^2 2x + 2x$;

б) $f(x) = (\sin 2x + 1)^2$;

в) $f(x) = (\cos 2x + \sin 2x)^3$.

17.11. а) $f(x) = \frac{3x + 4}{\cos x}$;

ә) $f(x) = \frac{5x - 2}{\sin x}$;

б) $f(x) = \frac{\operatorname{tg} x}{3 + x}$;

в) $f(x) = \frac{x - 2}{\operatorname{ctg} x}$.

17.12. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

а) $f(x) = 3\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{3\sqrt{3}}{2}x$;

ә) $f(x) = \sqrt{2}(x - 1) + \cos 2x$.

17.13. $f'(x) > 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = \cos x + \frac{x}{2}$;

ә) $f(x) = \sin x - \frac{x}{2}$.

$f(x) = \sqrt{x}$ болсун. $x_0 = 1$ дөп алсақ, $x = x_0 + \Delta x = 1 + \Delta x$ болиду.

У чағда $f(x_0) = \sqrt{1} = 1$ вә $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, буниндин $f'(x_0) = f'(1) = \frac{1}{2}$. Шу чағда (1) формула бойичә, $f(x) = \sqrt{1+\Delta x} \approx 1 + \frac{1}{2}\Delta x$ алимиз.

МИСАЛ

2. а) $\sqrt{0,98}$; ә) $\sqrt{25,5}$ мәналирини тепиңлар.

Йешилиши. а) $\sqrt{0,98} = \sqrt{1+(-0,02)} \approx 1 + \frac{1}{2}(-0,02) = 0,99$;

ә) $\sqrt{25,5} = \sqrt{25+0,5} = \sqrt{25(1+0,02)} = 5\sqrt{1+0,02} \approx 5(1 + \frac{1}{2} \cdot 0,02) = 5,05$.

Жавави: а) 0,99; ә) 5,05.

Йеқинлаштуруп һесаплашның умумий формулиси:

$$(1 + \Delta x)^n \approx 1 + n \Delta x, \text{ бу йәрдики } n \text{ — пүтүн сан.} \quad (3)$$

Испатлиши. $f(x) = x^n$ болсун. $x_0 = 1$ дөп алсақ, $x = x_0 + \Delta x = 1 + \Delta x$ чиқиду. У чағда $f(x_0) = f(1) = 1$ вә $f'(x) = nx^{n-1}$. Буниндин $f'(x_0) = f'(1) = n$.

(1)-формула бойичә $f(x) = (1 + \Delta x)^n \approx 1 + n \cdot \Delta x$ алимиз. 

МИСАЛ

3. $(1,007)^{200}$ мәнасини тапайли.

Йешилиши. $(1,007)^{200} = (1 + 0,007)^{200} \approx 1 + 200 \cdot 0,007 = 2,4$.

Жавави: 2,4

МИСАЛ

4. $\sin 33^\circ$ ипадисиниң мәнасини тапайли.

Йешилиши. (1)-формула бойичә $\sin x \approx \sin x_0 + \cos x_0 \cdot (x - x_0)$. Әнди градуслуқ өлчәмни радианлиқ өлчәм билән алмаштурайли.

$$33^\circ = 30^\circ + 3^\circ = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{180} \cdot 3^\circ = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{60} \text{ у чағда } x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{60}; x_0 = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{Буниндин } \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{60}\right) = \sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6} \cdot \frac{\pi}{60} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{60} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\pi\sqrt{3}}{60}\right) \approx \frac{1}{2} \cdot 1,0907 = 0,5454.$$

Жавави: 0,5454.



1. Йеқинлаштуруп һесаплаш формулирини елиш қандақ формулиға асасланған?
2. Йеқинлаштуруп һесаплаш формулиси немишкә бир нәччә түрдә берилгән? Жававиңларни чүшөндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

18.1. (1) формулиниң ярдими билән аргументниң берилгән x_1 вә x_2 мәналириға мувапик $f(x)$ функциясиниң мәнасини һесаплаңлар:

а) $f(x) = x^3 + 3x$, $x_1 = 1,998$, $x_2 = 6,002$;

ә) $f(x) = x^2 - x^5$, $x_1 = 3,03$, $x_2 = 2,997$;

б) $f(x) = 2x - x^4$, $x_1 = 5,002$, $x_2 = 3,995$;

в) $f(x) = 3x^2 + 2x^3$, $x_1 = 4,996$, $x_2 = 7,02$.

18.2. (2) вә (3) формулиларни қоллинип, ипадиләрниң йеқинлашқан мәналирини тепиңлар:

а) $1,003^{100}$; ә) $0,996^{16}$;

б) $0,997^{40}$; в) $1,002^{200}$;

г) $\sqrt{1,003}$; ғ) $\sqrt{1,004}$; д) $\sqrt{4,008}$.

В

(1)—(3) формулиларини қоллинип, ипадиләрниң йеқинлашқан мәналирини ҳесаплаңлар (18.3-18.4):

18.3. а) $\sin\left(\frac{\pi}{6} + 0,004\right)$; ә) $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + 0,02\right)$; б) $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - 0,05\right)$.

18.4. а) $\frac{1}{1,002^{40}}$; ә) $\frac{1}{0,015^{50}}$; б) $\frac{1}{0,996^6}$.

18.5. а) $\sqrt{9,27}$; ә) $\sqrt{4,16}$; б) $\sqrt{16,32}$.

18.6. а) $\cos 35^\circ$; ә) $\operatorname{tg} 46^\circ$; б) $\operatorname{ctg} 87^\circ$.

18.7. $f(x)$ вә $g(x)$ функциялириниң x_0 чекитидики йеқинлашқан мәналирини селиштуруңлар:

а) $f(x) = x^2 - 4x^5$, $g(x) = x^3 - 3x^4$, $x_0 = 3,998$;

ә) $f(x) = x^5 - 1$, $g(x) = 1 - x^4$; $x_0 = 1,999$.

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. $y = 3x^3 - 4x^2$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:

А. $\frac{3}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^3$; В. $9x - 9$; С. $9x^2 - 9x$; D. $9x^2 - 8x$.

2. $y = x - 2$ түзи $y = f(x)$ функциясиниң графигини $x_0 = -1$ абсциссисида йеқинлишиду. $f(-1)$ -ни тепиңлар:

А. -3 ; В. 2 ; С. 3 ; D. -2 .

3. $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$ функциясиниң һасилатини тепип, $f'(0) + f'(-1)$ ипадиниң мәнасини тепиңлар:

А. -40 ; В. 20 ; С. 25 ; D. -10 .

4. $y(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:

А. $\frac{1}{\sqrt{(x^2 + 1)^3}}$; В. $\frac{1}{2\sqrt{(x^2 + 1)^3}}$; С. $-\frac{1}{\sqrt{(x^2 + 1)^3}}$; D. $\frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}}$.

5. $y = \left(\frac{1}{2}x + 5\right)^{10}$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:

А. $10\left(\frac{1}{2}x + 5\right)^{11}$; В. $5\left(\frac{1}{2}x + 5\right)^9$; С. $\left(\frac{1}{2}x - 6\right)^9$; D. $8\left(\frac{1}{2}x - 6\right)^9$.

6. $y(x) = \operatorname{ctg} x$ функциясиниң $x = \frac{\pi}{6}$ чекитидики ҳасилатиниң мәнасини тепиңлар:
- A. $\frac{3}{4}$; B. $\frac{4}{3}$; C. -4 ; D. 4 .
7. $f(x) = 3x^3 - 4x$ функциясиниң графигини $M(1; 1)$ чекитидә жүргүзүлгән яндашминиң янтулуқ булуңиниң тангенсини тепиңлар:
- A. $\operatorname{tg} \alpha = 5$; B. $\operatorname{tg} \alpha = 1$; C. $\operatorname{tg} \alpha = 13$; D. $\operatorname{tg} \alpha = -1$.
8. $f(x) = (x^2 - 1) \cdot (x^2 + 1)$ функциясиниң ҳасилати немигә тәң?
- A. $2x^8$; B. $4x^3$; C. $8x^2$; D. $4x^5$.
9. $y = \sin 3x$ функциясиниң ҳасилатини тепиңлар:
- A. $\sin 3x$; B. $3\cos 3x$; C. $-\sin 3x$; D. $-3\sin 3x$.
10. $f(x) = (1 - 2x) \cdot (2x + 1)$ функцияси ҳасилатиниң $x = 1$ болғандики мәнасини тепиңлар:
- A. -8 ; B. -4 ; C. 2 ; D. 0 .
11. Абсциссиси $x_0 = -1$ болидиған чекиттә $y = x^4 + x$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини көрситиңлар:
- A. $y = 3x + 3$; B. $y = -3x - 3$; C. $y = 3x + 7$; D. $y = x - 7$.
12. Абсциссиси $x = 1$ болидиған чекиттә $f(x) = \sqrt{x}$ функциясиниң графигиға яндашма жүргүзүлгән. Ординатиси $y = 8,5$ болидиған яндашма чекитиниң абсциссисини тепиңлар:
- A. 17 ; B. 19 ; C. 16 ; D. 15 .
13. $f(x) = x^2 + \sqrt{x}$ функциясиниң ҳасилати:
- A. $2x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$; B. $2x^2 + 2\sqrt{x}$; C. $-2x^2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$; D. $2x^2 + \frac{1}{x}$.
14. $f(x) = -2\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ функцияси ҳасилатиниң $x = -\frac{3}{4}\pi$ болғандики мәнасини ҳесаплаңлар:
- A. Мәнаси йоқ; B. $-\frac{3}{4}$; C. 2 ; D. -2 .
15. Чекит түзниң бойи билән $s = t^3 + 2t^2 - 4$ қануни бойичә һәрикәтлиниду. $t = 2$ пәйтидә чекитниң илдамлиғини ениқлаңлар:
- A. 10 ; B. 20 ; C. 34 ; D. 16 .
16. $f(x) = \frac{1}{\cos 5x}$ функциясиниң ҳасилатини тепиңлар:
- A. $\frac{5\operatorname{tg} 5x}{\cos 5x}$; B. $\operatorname{tg} 5x + 1$; C. $\frac{1}{\operatorname{tg} 5x}$; D. $-\frac{\sin 5x}{5\cos^2 5x}$.
17. $f(x) = \operatorname{tg} \frac{x}{4}$ функциясиниң ҳасилатини тепиңлар:
- A. $\frac{4}{\cos^2 \frac{x}{4}}$; B. $\frac{4}{\sin^2 \frac{x}{4}}$; C. $\frac{1}{4\sin^2 \frac{x}{4}}$; D. $\frac{1}{4\cos^2 \frac{x}{4}}$.
18. $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x + 10$ функцияси берилгән. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

A. $-3; -1$; B. $-3; 1$; C. $3; -1$; D. $2; -3$.

19. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x$ функцияси берилгән. $f'(x) \geq 0$ тәңлимисини йешиңлар:

A. $(-2; 2)$; B. $(-\infty; -2]$; C. $(2; +\infty)$; D. $[2; +\infty)$.

20. $f(x) = \cos 10x \cos 6x + \sin 10x \sin 6x$ функциясиниң һасилати немигә тәң?

A. $-4\cos 4x$; B. $-4\sin 4x$; C. $4\sin 4x$; D. $4 \cos 4x$.

Математикалық саватлық бойычә тапшурмилар

21. Цифрлири қайтиланмайдиғандәк 2; 3; 8 цифрлиридин қанчә үч ханилик жүп санны қураштурушқа болиду?

A. 3; B. 4; C. 6; D. 5; E. 7.

22. Сетип алғучи товарни 10%-лик йеникчилик билән елип 9050 тг төлиди. Товарниң дәсләпки баһасини тепиңлар.

A. 10 050 тг; B. 10 500 тг; C. 15 000 тг;
D. 10 005 тг; E. 10 550 тг.

23. Әгәр $x \cdot y = x^3 - y^2$ болса, у чағда $5 \cdot (4 \cdot 8)$ ипадисиниң мәнасини тепиңлар.


A. -61 ; B. 253; C. 61; D. -3 ; E. 125.

24. Ящиктә 9 серик, 9 ақ вә 12 қизил шар бар. Ящиктин 1 шар елинди. Елинған шарниң серик рәңги болмаслиғиниң еһтималлиғини тепиңлар.

A. 0,7; B. 0,2; C. 0,8; D. 0,75; E. 0,4.

25. Диаграммида мәйрәмгә сетип елинған төрт түрлүк шарниң сани көрситилгән (53-сүрәт). Йешил рәңлик шарлар сани қизил рәңлик шарларниң санидин қанчә пайизға кам.

A. 50%; B. 25%; C. 15%; D. 40%; E. 65%.



ТАРИХИЙ МƏЛУМАТЛАР

Дифференциаллық Һесаплашның асасий чүшәнчиси — Һасилат физика, механика вә математика Һесаплирини, атап ейтсак, түз сизиклик бир хил әмәс Һәрикәтнің илдамлығы билән Һәр қандақ әгиргә яндашма жүргүзүшкә бағлиқ Һесапларни йешиш вақтида XVII әсирдә пәйда болған. XV-XVII әсирләрдә Һәр қандақ чекиткә яндашма жүргүзүшнің умумий Һасилатини тепиш мәсилеси көплигән математикларни қаттиқ ойландуриду.

Умумий Һесапларни йешишнің бәзи бир айрим Һаләтлири қедимий заманда берилгән еди. Мәсилән, Евклиднің «Башланмилар» әмгигидә чәмбәргә яндашма жүргүзүш усули берилгән. Архимед өз ети билән атилидиған спиральға яндашма жүргүзсә, Апполоний яндашмини эллипс, гипербола вә параболиға жүргүзгән. Лекин қедимий грек алимлири Һесапни ахиригичә йөшмиди, йәни қандақту бир әгирнің Һәр қандақ чекитигә яндашма жүргүзүшнің қолайлиқ умумий усулини тапмиди.

XVII ә. бешида бәзи бир алимлар, уның ичидә Э.Торричелли, В.Вивiani, Ж.Роберваль, И. Барроу бу соалның йешилишини кинематикилик тәрәптин издәшкә башлиди. Алгебрилик әгиргә яндашма жүргүзүшнің биринчи умумий усули Р. Декартның «Геометрия» намлиқ әмгигидә көрситилгән. П.Ферманиң яндашмилар жүргүзүшнің усули дифференциаллық Һесаплашларни тәрәққий әткүзүштики умумий вә әһмийәтлик усул болуп тепилиду. П. Ферманиң нәтижилири билән бәзи бир хуласилиригә асаслинип Г.В. Лейбниц мувапиқ алгоритм қурған вә Һесапни алдинқи алимларға қариганда толугирақ йөшкән.

Һазирқи вақитта қоллинип жүргән $\frac{dy}{dx}$ Һасилат символини Г.В. Лейбниц көрсәткән.

Бирақ у асасий чүшәнчини Һасилат әмәс, дифференциал дөп бәргән.

XVIII ә. оттурисида Л.Эйлер өзгәрмә миқдарның әсүмчилирини бәлгүләш үчүн грекның Δ Һәрипини қолланған, йәни $\Delta y = y_2 - y_1$, $\Delta x = x_2 - x_1$ вә ш.о. Бу бәлгүләш Һазиргичә сақланған.

Һасилатның y' вә $f'(x)$ бәлгүләшлирини Ж.Л. Лагранж киргүзгән.

Һасилат чүшәнчисиниң илим вә техникада қандақ чоң роль әтқуридиғанлығыни көрситидиған мисалларни көпләп кәлтүрүшкә болиду. Мәсилән, иштикләш-вақит бойичә илдамлиқның Һасилати, жисимнің иссисиклик сифдурушлиғи—температура бойичә иссиклик Һәжiminiң Һасилати, радиоактивлик парчилиниш илдамлиғи—вақит бойичә радиоактивлик мадда массисиниң Һасилати болуп Һесаплиниду вә ш.о. Һасилатларни Һесаплаш усуллири билән хусусийәтлирини өзләштүрүш вә уларни функцияләрни тәкшүрүштә қоллиниш дифференциаллық Һесаплашның асасини тәшкил қилиду.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияның ениқлиниш даириси, мәналар жигиндиси, Һасилат, координатилиқ түз, сан арилиқлири, интерваллар усули.

6

НАСИЛАТНИҢ ҚОЛЛИНИЛИШИ

§ 19. ФУНКЦИЯНИҢ ӨСҮШ ВӘ КЕМІЙІШ БӘЛГҮЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, өсүш
арилиғи, кемийиш
арилиғи, насилат




Силәр функцияниң өсүш вә кемийиш бәлгүлири билән тонушусиләр, насилатниң ярдими билән функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тепишни үгинисиләр.

СИЛӘР
БИЛИСИЛӘР:

Функцияниң геометриялик тәсвири, униң графиги, координата тәкшилигидики $(x; y)$ чекитлириниң геометриялик орнини куридиған әгир сизик экәнлигини билимиз. Өсүдиған вә кемийдиған функцияләрниң ениклимилирини қоллинип, графиклар бойичә униң бирхил өсидиған һәм бирхил кемийдиған арилиқлирини ениклашни үгәндиңлар.



$y = f(x)$ функциясиниң графиги берилгән (54-сүрәт).



54-сүрәт

График бойичә функцияниң:

- 1) ениклиниш даирисини;
- 2) мәналар жиғиндисини;
- 3) өсүш арилиқлирини;
- 4) кемийиш арилиқлирини тепиңлар.

Функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини насилатниң насилатниң ярдими билән тепишни қараштуримиз. Униң үчүн алди билән функцияниң арилиқтики өсүши билән кемийишиниң йетәрлик шәртини берәйли.

Әгәр дифференциаллинидиған $f(x)$ функциясиниң насилати X арилигиниң һәр бир чекитидә ижабий бәлгүлүк, йәни $f'(x) > 0$ (сәлбий бәлгүлүк, йәни $f'(x) < 0$) болса, у чағда функцияниң шу арилиқта өсидиған (кемийдиған) болиду.

Испатлиниши. Испатлаш үчүн Лагранж формулисини қоллинимиз. X арилиғидин һәр қандақ x_1 вә x_2 (бу йәрдә $x_1 < x_2$) чекитлирини алайли. Лагранж формулиси бойичә

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(a) \quad (1)$$

тәңлиги орунлинидиған $(x_1; x_2)$ арилиғиға тәәллүк a санини елишқа болиду. x_1, x_2 чекитлири X арилиғиға тәәллүк болғанлиқтин, a саниму мошу арилиққа тәәллүк, йәни $x_1 < a < x_2$.

Әгәр X арилиғиға тәәллүк һәр қандақ x үчүн $f'(x) > 0$ болса, у чағда $f'(a) > 0$ болиду вә елишимиз бойичә $x_2 - x_1 > 0$ болғанлиқтин, (1) тәңлиминиң сол тәрипидики $f(x_2) - f(x_1) > 0$ яки $f(x_1) < f(x_2)$ чиқиду, йәни $f(x)$ — өсидиған функция.

Әгәр X арилиғида һәр қандақ x үчүн $f'(x) < 0$ болса, у чағда $f'(a) < 0$, (1) формулидики $f(x_1) > f(x_2)$ болиду, сәвәви $x_2 - x_1 > 0$. Демәк, X арилиғида $f(x)$ функцияси кемийдиған. ■

Шуниң билән, һасилатниң ярдими билән $f(x)$ функцияси өсидиған (кемийдиған) экәнлигини испатлап, униң өсүш вә кемийиш арилиқлирини ениқлашқа болиду.

АЛГОРИТМ

Функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тепиш алгоритми:

- 1) функцияниң ениқлиниш даирисини тепиш;
- 2) функцияниң һасилатини тепиш;
- 3) $f'(x) > 0$ яки $f'(x) < 0$ тәңсизлигини йешиш;
- 4) берилгән теореминиң йөкүнлимиси бойичә функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини йезиш, йәни ахирқи тәңсизликләр йешилишлири функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлири болиду.

Әскәртиш. Әгәр $f(x)$ функцияси арилиқниң чәтки чекитлиридә үзүлүшсиз болса, у чағда у чекитләр шу арилиққа тәәллүк чекитләр болиду.

МИСАЛ

1. $f(x) = 3x^2 - 12x$ функциясиниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тапайли.

Йешилиши.

- 1) Функцияниң ениқлиниш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндисини.
- 2) $f'(x) = (3x^2 - 12x)' = 6x - 12$.
- 3) $f'(x) > 0$, йәни $6x - 12 > 0$, $6x > 12$, $x > 2$. У чағда ениқлиниш даирисиниң $x < 2$ бәлигидә $f'(x) < 0$ болидиғанлиғи ениқ.
- 4) Теорема бойичә $(2; +\infty)$ арилиғида функция өскүчи, $(-\infty; 2)$ арилиғида болса функция кемигүчи.

Жаваби: $(-\infty; 2)$ — кемийду, $(2; +\infty)$ — өсиду.


МИСАЛ

2. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x + 2$ функциясиниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тапайли.

Йешилиши. 1) $D(f) = R$; 2) $f'(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - 4x + 2\right)' = x^2 - 4$;

3) $f'(x) > 0$, $x^2 - 4 > 0$.

Елинған тәңсизлиқни интерваллар усули билән йешәйли. Шу чағда $x^2 - 4 = 0$, $x_{1,2} = \pm 2$. Өнди ± 2 чекитлири арқилиқ координатилар түзи үчүн үч интервалға бөлүп, һәрқайсисидики һасилат бөлгүсини ениқлаймиз. Униң үчүн $x = 3$ дөп елип, һасилатниң бөлгүсини ениқлаймиз. $f'(3) = 3^2 - 4 = 5 > 0$, йәни $x > 2$ болғанда, $f'(x) > 0$. Демәк, $x = 3$ сани тәәллүк интервалда һасилат бөлгүси ижабий болиду, қалған интервалларда болса ижабий вә сәлбий бөлгүләр нөвәт билән қоюлиду (55, а-сүрәт). Демәк, $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ арилиғида $f'(x) > 0$, ал $[-2; 2]$ арилиғида $f'(x) < 0$.



55.а-сүрәт

Жаваби: $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ — өсиду, $[-2; 2]$ — кемийду.

МИСАЛ

3. $f(x) = 0,25x^4 - x$ функциясиниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тапайли.

Йешилиши. 1) Функцияниң ениқлиниш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси.

2) $f'(x) = (0,25x^4 - x)' = x^3 - 1$.

3) $f'(x) > 0$, $x^3 - 1 > 0$. $x^3 - 1 = 0$, $x^3 = 1$, $x = 1$. Сан түзини $x = 1$ чекити арқилиқ икки арилиққа бөлүмиз. $x = 0$ болғанда $f'(0) = 0^3 - 1 = -1$.

Интерваллардики һасилатниң бөлгүсини сан түзигә салимиз (55, ө-сүрөт).

4) $(-\infty; 1]$ арилиғида функция кемийдиған, $[1; +\infty)$ — функция өсидиған.



55. ө-сүрөт

Жаваби: $(-\infty; 1]$ — кемийду; $[1; +\infty)$ — өсиду.

МИСАЛ

4. $f(x) = \sin x - 2x$ функциясиниң бирхил өскүчи, бирхил кемигүчи арилиқлирини тапайли.

Йешилиши. 1) Функцияниң ениқлиниш даириси барлиқ санлар жиғиндиси.

2) $f'(x) = (\sin x - 2x)' = \cos x - 2$.

3) Һасилатниң бөлгүсини ениқлаймиз. $|\cos x| \leq 1$ болғанлиқтин, $\cos x - 2$ ипадисиниң мәнаси x -ниң һәр қандақ мәнасида 0 дин кичик. Шунлашқа $x \in \mathbb{R}$ болғанда $f'(x) < 0$. Демәк, берилгән функция — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндисидә бирхил кемигүчи функция.

Жаваби: функция $\mathbb{R}$ жиғиндисидә кемигүчи.




1. Немишкә $y = \operatorname{ctg} x$ функцияси $(0; \pi)$ арилиғида кемийду? Жавабини чүшөндүрүңлар.
2. Қайси бир арилиқта функция бирхил өсидиған болсун. Мошу арилиқта функцияниң һасилати ижабий бөлгүлүк боламду?
3. һәқиқий санлар жиғиндисидә һасилати 1гә төң болидиған функцияниң графиги немә болиду? Жавабини чүшөндүрүңлар.


Көнүкмиләр

А

19.1. 56, а-сүрөттә $y = f(x)$ функциясиниң графиги берилгән. Функцияниң һасилати: а) ижабий бөлгүлүк; ө) сәлбий бөлгүлүк болидиған арилиқларни көрситиңлар.



а)



ө)

56-сүрөт

19.2. 56-сүрөттө $y = f(x)$ функциясыңа наслатының графиги берилгән. Сүрөтни пайдилип, $y = f(x)$ функциясының: а) өсүш; ә) кемийиш; арилиқлирини тепиңлар.

19.3. $f(x)$ функциясының бирхил өскүчи вә бирхил кемигүчи арилиқлирини тепиңлар:

а) $f(x) = x + 4$; ә) $f(x) = 3x + x^2$;

б) $f(x) = 2x^2 - x$; в) $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

19.4. Берилгән функцияның ениқлиниш даирисидә өсидигән болидиғанлиғини испатлаңлар:

а) $y = \frac{1}{5} + 3,1x$; ә) $y = -\frac{4}{x}$; б) $y = 2x^3 + 1,4$; в) $y = 3 - \frac{2}{x}$.

19.5. $y = f(x)$ функциясы ениқлиниш даирисидә кемигүчи болидиғанлиғини испатлаңлар:

а) $y = 7 - 5x$; ә) $y = 2 - 3x^3$; б) $y = \frac{2}{x}$; в) $y = 6 + \frac{3}{x}$.

В

19.6. Функцияның өсүш (кемийиш) арилиқлирини тепиңлар:

а) $f(x) = x^3 + 4x - 7$; ә) $f(x) = 5x^2 - 3x - 8$;

б) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$; в) $f(x) = 3x^3 - x - 2$.

19.7. $y = f(x)$ функциясының өскүчи функция экәнлиғини испатлаңлар:

а) $y = x^3 + x$; ә) $y = -\frac{4}{x}$.

19.8. $f(x)$ функциясының өсүш вә кемийиш арилиқлирини ениқлаңлар:

а) $f(x) = x^3 - 3x + 5$; ә) $f(x) = x^3 - 4x + 7$;

б) $f(x) = x^5 + 5$; в) $f(x) = x^4 - 4x$.

19.9. Барлиқ һәқиқий санлар жиғиндисидә $f(x)$ функциясының кемигүчи, $g(x)$ ниң болса өскүчи функция болидиғанлиғини испатлаңлар:

а) $f(x) = 5 - x^7$; ә) $g(x) = 4 + \frac{2}{3}x^3$;

б) $f(x) = -8x - \sin 2x$; в) $g(x) = -\cos 6x + 7x$.

19.10. a -ниң қандақ мәнасида $f(x) = \frac{x^3}{3} + ax^2 + x$ функциясы һәқиқий санлар жиғиндисидә өскүчи болиду?

19.11. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 1$ функциясының бирхил кемигүчи арилиғидики x -ниң пүтүн мәналириниң санини тепиңлар.

19.12. Насилати $f'(x) = (x - 3)(x - 1)(x - 2)^2$ болидиған функцияның кемийиш арилиқлири узунлуқлириниң қошундисини тепиңлар.

19.13. $y = f(x)$ функциясының насилати $f'(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 9)(x^2 - 16)$ түридә берилгән. Функцияның бирхил кемигүчи арилиқлири узунлуқлири қошундисини һесаплаңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияның ениқлиниш даириси, һасилат, функцияның өсүш вә кемийиш бәлгүлири.

§ 20. ФУНКЦИЯНИҢ КРИТИКИЛИҚ ЧЕКИТЛИРИ БИЛӘН ЭКСТРЕМУМ ЧЕКИТЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, функцияның ениқлиниш даириси, критикилик чекитләр, функция экстремуми



Силәр функцияның санлиқ чекитлири ениқлимиси, функцияның экстремум ениқлимилири, функция экстремуминиң бар болуш шәрти билән тонушусиләр; критикилик вә экстремум чекитлирини тепишни үгинисиләр.

Алдыңқи параграфта функцияның өсүш вә кемийиш арилиқлирини ениқлашни үгинисиләр.

ӘСКӘ ЧҮШИРИҢЛАР!

55-56-сүрәтләрни қоллинип, экстремум чекитлирини көрситиңлар, минимум вә максимум чекитлиригә тохтилимиз.

Функцияни тәтқиқ қилиш вә графигини селиш давамида өсүш вә кемийиш арилиқлири билән биллә функцияның вә экстремум чекитлирини тепишини билиш керәк.

Функцияның һасилати нөлгә тәң яки һасилати болмайдиган ениқлиниш даирисиниң ички чекитлири критикилик чекитләр дән атилиду.

Критикилик чекитләрла экстремум болуши мүмкин.

Функцияның экстремум болушиниң һажәтлик шәртини берәйли.

Теорема. Әгәр x_0 чекити $f(x)$ функциясиниң экстремуми вә мошу чекитниң әтрапида $f'(x)$ һасилати бар болса, у чагда һасилатниң x_0 чекитидики мәнаси нөлгә тәң, йәни $f'(x_0) = 0$.

Һәр бир критикилик чекиттә экстремум чекити болувәрмәйду.


МИСАЛ

1. $y = x^3 - 1$ функциясини алайли. Бу функцияның һасилати $f'(x) = 3x^2$. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешәйли, йәни $3x^2 = 0$ яки $x = 0$. Шуниң билән, $f'(x) = 3 \cdot 0 = 0$.

Бирақ бу чекиттә функцияның экстремуми болмайду (57-сүрәт).

Экстремумның максимум вә минимум болушының йетәрлик шәрти.

Теорема. Әгәр x_0 чекитидә $f(x)$ үзүлүшсиз, $(a; x_0)$ арилиғида $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) вә $(x_0; b)$ арилиғида $f'(x) < 0$ ($f'(x) > 0$) болса, у чағда x_0 чекитидә $f(x)$ функциясиниң максимум (минимум) чекити болиду.



57-сүрөт

Көп ҳаләттә бу теореминиң йеникләштүрүлгән йөкүнлимисини қолланған қолайлиқ, йәни әгәр x_0 чекитидә һасилат бөлгүсини плюстин минусқа (минустин плюсқа) алмаштурса, у чағда x_0 чекити максимум (минимум) чекити болиду.

Испатлиниши: Теоремини максимум чекити үчүн испатлайли. Интерваллар усулини қоллинип, һәр бир арилиқтики һасилатниң бөлгүсини ениқлаймиз.

Теореминиң шәрти бойичә $(a; x_0)$ арилиғида $f'(x) > 0$, x_0 чекитидә үзүлүшсиз болғанлиқтин, $(a; x_0]$ арилиғида өсиду, шуңлашқа мошу арилиқта барлиқ x үчүн $f(x) < f(x_0)$. Дәл мошундақ $[x_0; b)$ арилиғида $f(x)$ кемийду, һасилат $f'(x) < 0$, шуңлашқа $[x_0; b)$ арилиғида барлық x үчүн $f(x) < f(x_0)$ тәңсизлиги орунлиниду. Демәк, x_0 чекити $f(x)$ функциясиниң максимум чекити. 



x_0 чекити минимум чекити болидиғанлиғини испатлаңлар.

АЛГОРИТМ

Функцияниң экстремум чекитлирини тепиш алгоритми:

- 1) функцияниң һасилатини тепиш;
- 2) функцияниң критикилик чекитлирини тепиш, йәни $f'(x) = 0$ тәңдимисини йешиш;
- 3) критикилик чекитләр өтрапидики $f'(x)$ һасилатиниң бөлгүсини интерваллар усули билән ениқлаш;
- 4) экстремум чекитлириниң бар болушының йетәрлик шәртини қоллинип, максимум вә минимум чекитлирини тепиш.

МИСАЛ

2. $y = 2x^3 - x^2 - 4x + 5$ функциясиниң экстремум чекитлирини тапайли.

Йешилиши. 1) Функцияниң һасилати:

$$1) y' = (2x^3 - x^2 - 4x + 5)' = 6x^2 - 2x - 4 = 2(3x^2 - x - 2);$$

$$2) 2(3x^2 - x - 2) = 0, \quad 3x^2 - x - 2 = 0, \quad x_1 = -\frac{2}{3}, \quad x_2 = 1;$$

3) $x_1 = -\frac{2}{3}$, $x_2 = 1$ чекитлири арқилиқ сан түзини интервалларға бөлүп, һәр интервалдики һасилатниң бөлгүсини ениқлайли. Мәсилән, $[-\frac{2}{3}; 1]$ арилиғидин $x = 0$ чекитини алайли. Шу чағда $f'(0) = 2 \cdot (3 \cdot 0^2 - 0 - 2) = -4 < 0$.

Функция $f(x)$ x -осіндегі белгісін сан түзінде көрсетейік (58-сурет).



58-сурет

4) Шу жағдайда $x_1 = -\frac{2}{3}$ — максимум, әндi $x_2 = 1$ — функцияның минимум чекітi.

$$\text{Жауаби: } x_{\max} = -\frac{2}{3}; x_{\min} = 1.$$


МИСАЛ

3. $y = -\frac{2}{3}x^3 + 8x + 10$ функциясының экстремум чекітлерін тапайы.

Шешімі. 1) $y'(x) = \left(-\frac{2}{3}x^3 + 8x + 10\right)' = -2x^2 + 8 = -2(x^2 - 4);$

2) $y'(x) = 0, -2(x^2 - 4) = 0$. Бундiн $x^2 = 4$, шу жағдайда $x_{1,2} = \pm 2$.

$[-2; 2]$ аралығында $x = 0$ чекітін алсақ, $f'(0) = -2 \cdot 0^2 + 8 = 8$. $f(x)$ функциясының белгісін сан түзінде орналастырамыз (59-сурет).



59-сурет

3) $x_1 = -2$ — минимум, $x_2 = 2$ — максимум чекітi бoлiду. Мошу чекітлердiң функцияның экстремум мәндерін есептейік:

$$f(-2) = -\frac{2}{3} \cdot (-2)^3 + 8 \cdot (-2) + 10 = \frac{16}{3} - 6 = \frac{16 - 18}{3} = -\frac{2}{3} \text{ — функцияның минимумы,}$$

$$\text{әндi } f(2) = -\frac{2}{3} \cdot 2^3 + 8 \cdot 2 + 10 = -\frac{16}{3} + 26 = \frac{-16 + 78}{3} = \frac{62}{3} \text{ — максимумы.}$$

$$\text{Жауаби: } \min f(x) = f(-2) = -\frac{2}{3}; \max f(x) = f(2) = \frac{62}{3}.$$

МИСАЛ

4. $[0; 1]$ кесіндісінде $-12x^4 + 16x^3 - 3 = 0$ теңлімсінің қанша шындық сәтi бар екендігін анықтайы.

Шешімі. $f(x) = -12x^4 + 16x^3 - 3$ функциясын қарастырайы. Функцияның шындық сәтi — барлық шындық сандар жиындысы. Функцияның критикалық чекітлерін анықтайы.

Алды билен $f(x)$ тапайы: $f'(x) = -48x^3 + 48x^2 = -48x^2(x - 1)$. Әндi $f'(x) = 0$ теңлімсіні $-48x^2(x - 1) = 0$. $f(x)$ $x_1 = 0$ және $x_2 = 1$ чекітлерінде нөлге тең бoлiду.

Критикалық чекітлердiң функцияның мәндерін есептейік:

$$f(0) = -12 \cdot 0^4 + 16 \cdot 0^3 - 3 = -3; f(1) = -12 \cdot 1^4 + 16 \cdot 1^3 - 3 = -12 + 16 - 3 = 1.$$

$[0; 1]$ кесіндісінде функция -3 тiн 1 гiчe өсiду. Үзiлiсiз функциялардың қасиеттерi бойынша $[0; 1]$ кесіндісінде берілген функция бір чекітте нөлге тең, яғни оның $[0; 1]$ кесіндісінде бір шындық сәтi бар.

Жауаби: шындық сәтi бір.




1. Әгер $f(x)$ функциясы $[a; b]$ аралығында анықланған болса, у жағдайда $x = a$ оның экстремум чекітi бoламду?

2. Кемигүчи функцияның экстремум чекитлири болуши мүмкинму?
3. Жүп (тағ) функцияның а) бир; ө) икки; б) үч экстремум чекити боламду. Жававини чушөндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

20.1. 60-сүрөттө берилгән $f(x)$ функциясининң графиги бойичө униң өсүш вә кемийиш арилиқлирини вә экстремум чекитлирини тепиңлар.



60-сүрөт

Функцияның критикилик чекитлирини тепип, уларниң қайсиси минимум, қайсиси максимум чекитлири болидиғанлиғини ениқлаңлар **(20.2-20.3)**:

- | | |
|--|--|
| <p>20.2. а) $f(x) = 3x^2 - 2$;
 б) $f(x) = 3x - x^2 + 1$;</p> | <p>ө) $f(x) = 7x^2 + 3$;
 в) $f(x) = 5x^2 - 8x - 3$.</p> |
| <p>20.3. а) $f(x) = 0,5x^2 - 2x - 2,5$;
 б) $f(x) = x^2 - \frac{x}{3}$;</p> | <p>ө) $f(x) = -4x^2 + 1$;
 в) $f(x) = -x^2 + 3x$.</p> |
| <p>20.4. а) $f(x) = \frac{x}{4} - \frac{9}{x}$;</p> | <p>ө) $f(x) = \frac{1}{x} - 5x$</p> |

функциясининң экстремум чекитлири болмайдиғанлиғини испатлаңлар.

В

20.5. Функцияның максимум вә минимум чекитлирини тепиңлар:

- | | |
|---|--|
| <p>а) $f(x) = \frac{1}{5} \cos x + 1$;</p> | <p>ө) $f(x) = x + 2\sin x$.</p> |
|---|--|

20.6. Функцияның критикилик чекитлирини тепиңлар. Максимум, минимум чекитлирини ениқлаңлар:

- | | |
|---|--|
| <p>а) $f(x) = \frac{1}{3}x - x^3$;
 б) $f(x) = x^4 - 32x^2 + 1$;
 г) $y = x^2(x + 1)$;</p> | <p>ө) $f(x) = 2x^4 - 8x$;
 в) $f(x) = 9 + 4x^3 - x^4$;
 ғ) $y = 3x^4 + 4x^3$.</p> |
|---|--|

20.7. Хусусийәтлири бойчә функция графигиниң қийилмисини селиңлар:

а) $D(f) = [-2; 4]$; $x \in (-2; 1)$, $f'(x) < 0$, ал $x \in (1; 4)$ арилиғида $f'(x) > 0$;

ә) $D(f) = [-2; 4]$; $x \in (-2; -1)$ арилиғида $f'(x) > 0$, ал $x \in (-1; 4)$ арилиғида $f'(x) < 0$;

б) $D(f) = [a; b]$; x_1 — минимум чекити, x_2 — максимум чекити вә $f(a) < f(b)$;

в) $D(f) = [a; b]$; x_1 — минимум чекити, x_2 — максимум чекити вә $f(a) = f(b)$.

20.8. $f(x)$ функциясиниң критикилик чекитлири болмайдиганлиғини испатлаңлар:

а) $f(x) = 15 + x$;

ә) $f(x) = \operatorname{tg} x + 1$;

б) $f(x) = x^3 + 2$;

в) $f(x) = x^5 + x$.

20.9. $y = f(x)$ функциясиниң экстремум чекитлирини тепиңлар:

а) $f(x) = \frac{3}{x} - 12x^2$;

ә) $f(x) = \frac{2}{x} - x^2$.

20.10. Берилгән кесиндидә тәңлиминиң нәччә томури болидиғанлиғини тепиңлар.

а) $x^3 - 12x + 10 = 0$, $[-2; 2]$; ә) $x^3 - 3x + \frac{1}{2} = 0$, $[-1; 1]$.

20.11. Функцияниң критикилик чекитлирини тепиңлар:

а) $f(x) = (x - 1)^2 (x + 2)^2$; ә) $f(x) = (x + 1)^2 (x - 2)^2$.

20.12. Чәксиз көп экстремум чекитлири болидиған функцияләргә мисал кәлтүрүңлар.

20.13. $f(x) = 3x^4 - 4x^3$ функциясиниң экстремум чекитлириниң ординатилириниң қошундисини һесаплаңлар:

А. -1 ;

В. 1 ;

С. 0 ;

Д. -2 .

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функцияниң ениқлиниш даириси, мәналар жиғиндиси, функцияниң графиги вә хусусийәтлири, һасилат, һасилатни тепиш қаидилири вә формулилири, функцияниң өсүш вә кемийиш бәлгүлири, экстремум чекитлири.

§ 21. ҺАСИЛАТНИҢ ЯРДИМИ БИЛӘН ФУНКЦИЯНИ ТӘКШҮРҮШ ВӘ УНИҢ ГРАФИГИНИ СЕЛИШ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, функция хусусийәтлири, функцияни тәкшүрүш, функция графиги



Силәр функцияни һасилатниң ярдими билән тәкшүрүш алгоритми билән тонушусиләр; алгоритмни қоллиниш арқилиқ функцияни тәкшүрүшни вә графигини селишни үгинисиләр.

Силер функцияның еніқлиніш даирисини тепиш йоллирини, функцияның хусусийәтлирини, һасилатның ярдими билән өсүш, кемийиш арилиқлирини, экстремумлирини тепиш йоллирини оқуп-үгинисиләр. Әнди мошу алған билимиңларни системап, функцияни һасилатның ярдими билән тәкшүрүшни вә шуниң асасида униң графигини селишни қараштуримиз.

АЛГОРИТМ

Функцияни һасилатның ярдими билән тәкшүрүш вә униң графигини селиш алгоритми:

- 1) функцияның еніқлиніш даирисини тепиш;
- 2) функцияның жүп, тағ вә периодлуқлиғини еніқлаш;
- 3) функция графигиниң координатилар оқлири билән қийилишиш чекитлирини еніқлаш;
- 4) бөлгү турақлиғи арилиқлирини тепиш;
- 5) өсүш вә кемийиш арилиқлирини, экстремумлирини тепиш;
- 6) тәкшүрүш нәтижілирини жәдвәлгә киргүзүш;
- 7) функцияның графигини селиш.

МИСАЛ

$y = x^3 + 3x^2$ функциясини тәкшүрүп, графигини салайли.

Йешилиши. Функцияни тәкшүрүш алгоритмини қоллинимиз.

1) Функция рационал функция болғанлиқтин, еніқлиніш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндисини, йәни $D(y) = R$;


2) Функция жүпму әмәс, тағму әмәс, сәвәви $y(-x) = (-x)^3 + 3 \cdot (-x)^2 = -x^3 + 3x^2$. Функция периодлуқ әмәс;

3) Функция графигиниң координатилар оқлири билән қийилишиш чекитлирини тапайли:

Оу оқи билән: $x = 0$, $y(0) = 0^3 + 3 \cdot 0^2 = 0$; $(0; 0)$;

Ох оқи билән: $y = 0$, $x^3 + 3x^2 = 0$,
 $x^2(x + 3) = 0$, $(0; 0)$, $(-3; 0)$.

4) Функцияның бөлгү турақлиқ арилиғини еніқлаш үчүн сан түзини $x = 0$ вә $x = -3$ чекитлири арқилиқ интервалларға бөлүп, функцияның һәрбир интервалидики бөлгүсини еніқлаймиз: $x = 2$, $y(2) = 2^3 + 3 \cdot 2^2 = 20 > 0$; $x = -2$, $y(-2) = 4 > 0$; $x = -4$, $y(-4) = -16 < 0$. Сан түзидә интерваллардики функцияның бөлгүсини бөлгүләймиз (61-сүрәт).




61-сүрәт

Демәк, $(-3; 0) \cup (0; +\infty)$ арилиғида $f(x) > 0$, ал $(-\infty; -3)$ арилиғида $f(x) < 0$;

5) $y' = (x^3 + 3x^2)' = 3x^2 + 6x$;

$3x^2 + 6x = 0$ яки $3x(x + 2) = 0$, у чағда $x_1 = 0$; $x_2 = -2$ — критикилиқ чекитләр.

$x_1 = 0$ вә $x_2 = -2$ чекитлири арқилиқ функцияның еніқлиніш даирисини арилиқларға бөлүп, һәр арилиқтики һасилатның бөлгүсини интерваллар усули билән еніқлаймиз: $x = 1$; $y'(1) = 3 \cdot 1^2 + 6 \cdot 1 = 9 > 0$. Сан түзидә функция һасилатлириниң бөлгүсини бөлгүләймиз (62-сүрәт).



62-сүрәт

Демәк, $(-\infty; -2] \cup [0; +\infty)$ арилиғида $f'(x) > 0$ — функция бирхил өскүчи, $[-2; 0]$ арилиғида $f'(x) < 0$ — функция бирхил кемигүчи.

$x = -2$ — максимум чекити.

$x = 0$ — минимум чекити.

Экстремум чекитлиридики функцияниң мәналирини ҳесаплайли:

$$y(-2) = (-2)^3 + 3 \cdot (-2)^2 = 4; (-2; 4);$$


$$y(0) = 0^3 + 3 \cdot 0^2 = 0; (0; 0).$$

6) Тәкшүрүш нәтижисини 11-жәдвәлгә киргүзимиз:

11-жәдвәл

x	$(-\infty; -3)$	-3	$(-3; -2)$	-2	$(-2; 0)$	0	$(0; +\infty)$
$f'(x)$	+	9	+	0	—	0	+
$f(x)$	Сәлбий бөлгүдики бирхил өскүчи	0	Ижабий бөлгүдики бирхил өскүчи	4 max	Ижабий бөлгүдики бирхил кемигүчи	0 min	Ижабий бөлгүдики бирхил өскүчи

7) Графигини салимиз (63-сүрәт).



63-сүрәт



1. Алгоритмниң иккинчи қуридики хусусийәтлериниң қайсилири бир мезгилдә орунлиниши мүмкин. Жәвавини чүшәндүрүңлар.
2. Функцияни тәкшүрүш алгоритминиң 5-қури қайси вақитта толук қараштурулмайду? Жәвавини чүшәндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

21.1. Функцияни тәкшүрүңлар вә униң графигини селиңлар:

а) $y = 2x + 1$; ә) $y = 5 - x$; б) $y = x^2 + 3x - 5$; в) $y = (x - 2)^2$.

21.2. Функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини, экстремумлирини тепиңлар:

а) $y = -0,5x^2 + x$;

ә) $y = \frac{1}{2}x^2 + 3$;

б) $y = 2x^2 - x + 3$;

в) $y = 5x - 2x^2 - 2$.

21.3. Функцияни тәкшүрүңлар вә уның графигини селиңлар:

а) $y = 4x - x^2$; ө) $y = 8x - \frac{1}{4}x^2$; б) $f(x) = \frac{1}{2}x^3$; в) $f(x) = \frac{1}{3}x^3$;

г) $y = 3x^2 - 10x + 3$; ғ) $y = 2x^2 + 5x + 2$.

21.4. $f(x)$ функциясиниң кемийиш вә өсүш арилиқлирини тепиңлар:

а) $f(x) = x^3 + 1$; ө) $f(x) = x^3 + 3x - 5$;

б) $f(x) = 2x - \cos x$; в) $f(x) = -3x + \sin x$.

В

Функцияләрни тәкшүрүңлар вә уларниң графиклирини селиңлар (21.5—21.7):

21.5. а) $y = x^2(x + 3)$;

ө) $y = x^3 + 3x - 5$.

21.6. а) $y = 4x - x^4$;

ө) $y = x^4 - 8x^2$.

21.7. а) $y = \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$;

ө) $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, ениқлинши даириси, мәналар жигиндиси, һасилат, критикилик чекитләр, кесиндидики үзүлүшсиз функцияниң хусусийәтлири.

§ 22. ФУНКЦИЯНИҢ КЕСИНДИДИКИ ӘҢ ЧОҢ ВӘ ӘҢ КИЧИК МӘНАЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, функцияниң мәнаси, әң чоң мәна, әң кичик мәна



Силәр берилгән арилиқтики функцияниң әң чоң вә әң кичик мәналирини тепишни, уларни геометриялик һесапларни чиқарғанда қоллинишни үгинисиләр.

Тәжрибидә, әмәлиятта функцияниң берилгән кесиндидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиш һесаплири көп учришиду. Функцияниң мошундақ мәналирини һасилатниң ярдими билән тепиш йолини қараштурайли.

$y = f(x)$ функцияси $[a, b]$ кесиндисидә ениқланған, үзүлүшсиз вә кесиндиниң ички чекилиридә һасилати бар функция болсун. Мундақ функцияниң әң чоң вә әң кичик мәналириниң бар болуши тоғрилиқ теорема V бапниң §12-дә берилгән.

АЛГОРИТМ

Функцияниң берилгән кесиндидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиш алгоритми:

- 1) $f(x)$ функциясиниң һасилатини тепиш;
- 2) $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешип, критикилик чекитлирини ениқлаш;
- 3) Мошу кесиндигә тәәллуқ критикилик чекитлирини ениқлаш;
- 4) Кесиндиниң чәтки чекитлиридики вә мошу арилиққа тәәллуқ критикилик чекитлиридики функцияниң мәнасини һесаплаш;

5) Функцияның тепілған мәналарини селиштуруп, әң чоң вә әң кичик мәналарини ениқлаш.

МИСАЛ

1. $f(x) = x^3 - 3x^2$ функциясиниң $[-2; 4]$ кесиндисидики әң чоң вә әң кичик мәналарини тапайли.

Йешилиши. Функцияның берилгән ариликтики әң кичик вә әң чоң мәналарини тепиш алгоритмини қоллинимиз.

1) Функцияның һасилатини тапимиз: $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

2) $f'(x) = 0$ теңлимисини Йешилишиз: $3x^2 - 6x = 0$, $3x(x - 2) = 0$, $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.

3) Критикилик чекитләрниң берилгән кесиндигә тәәллуқ болидиғанлиғини ениқлаймиз,

$0 \in [-2; 4]$; $2 \in [-2; 4]$.

4) Әнди функцияның мәналарини һесаплаймиз: $f(0) = 0^3 - 3 \cdot 0^2 = 0$,

$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 = -4$,

$f(4) = 4^3 - 3 \cdot 4^2 = 16$,

$f(-2) = (-2)^3 - 3 \cdot (-2)^2 = -20$.

5) Шуниң билән, $f(0) = 0$; $f(2) = -4$, $f(4) = 16$, $f(-2) = -20$. Функцияның әң кичик мәнаси $f(-2) = -20$; функцияның әң чоң мәнаси $f(4) = 16$.

Жаваби: 16; -20.

МИСАЛ

2. $f(x) = x^3 + \frac{3}{x}$ функциясиниң $x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$ кесиндисидики әң чоң вә әң кичик мәналарини тапайли.

Йешилиши. Функцияның берилгән ариликтики әң кичик вә әң чоң мәналарини тепиш алгоритмини қоллинимиз.

1) $f'(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2}$.

2) $f'(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2} = \frac{3x^4 - 3}{x^2} = \frac{3(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{x^2} = 0$, $x \neq 0$.

Буниндин $x^2 + 1 \neq 0$; $x^2 - 1 = 0$, $x_{1,2} = \pm 1$.

3) $x_1 = -1 \notin \left[\frac{1}{2}; 2\right]$, шуңлашқа функцияның $x = 1$; $\frac{1}{2}$; 2 чекитлиридики мәналаринила тапимиз.

4) $f(1) = 1^3 + \frac{3}{1} = 1 + 3 = 4$,

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{3}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8} + 6 = 6\frac{1}{8} = 6,125$, $f(2) = 2^3 + \frac{3}{2} = 8 + 1,5 = 9,5$.

Шуниң билән, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 6,125$, $f(1) = 4$, $f(2) = 9,5$. Демәк, функцияның әң кичик мәнаси $f(1) = 4$, әң чоң мәнаси $f(2) = 9,5$.

Жаваби: 9,5; 4.

Функцияның әң чоң вә әң кичик мәналарини һесаплаш әмәлий һесапларни чиқиришта керәк. Мошу һаләттә үзүлүшсиз функцияләрниң мошу хусусийити қоллинилиду:


әгәр берилгән арилиқта функция үзүлүшсиз вә униң бирла экстремуми болса, у чагда чекитниң минимумида әң кичик, максимумида болса әң чоң мәнаси болиду.

МИСАЛ

3. Төрипи a болидиган квадрат қаңалтирдин асаси квадрат вә чоққиси очуқ болуп кәлгән әң чоң һәжимлик ящик тәйярлаш үчүн қийип елинған квадрат төрипиниң узунлуғи қандақ болуш керәк?

Йешилиши. Қаңалтирдин қута ящик тәйярлаш үчүн булуңлиридин бирдәк квадрат қийип елиш керәк (64-сүрәт). Пүклигән вақитта униң һәжими тәң болуши керәк.

Қийилип елинған квадратниң төрипиниң узунлуғини x дөп бөлгүләйли. Шу чағда қутиниң асасиниң төрипи $a - 2x$ болиду. У чағда қутиниң һәжими:



64-сүрәт

$$V(x) = (a - 2x)^2 \cdot x = (a^2 - 4ax + 4x^2) \cdot x = a^2x - 4ax^2 + 4x^3, \text{ бу йәрдики } x \in \left[0; \frac{a}{2}\right].$$

Сөвәви $a - 2x \geq 0$, $a \geq 2x$ яки $x \leq \frac{a}{2}$.

Өнди $\left[0; \frac{a}{2}\right]$ кесиндисидики $V(x)$ функциясиниң әң чоң мәнәсини тапимиз.

$$V'(x) = (a^2x - 4ax^2 + 4x^3)' = a^2 - 8ax + 12x^2,$$

$$12x^2 - 8ax + a^2 = 0, \text{ бұдан } x_1 = \frac{a}{6}, x_2 = \frac{a}{2}. \text{ Тепилған критикилик чекитләр берилгән}$$

кесиндигә тәәллүк: $\frac{a}{6} \in \left[0; \frac{a}{2}\right]; \frac{a}{2} \in \left[0; \frac{a}{2}\right]$. Өнди $x_1 = \frac{a}{6}, x_2 = \frac{a}{2}$ чекитлиридики $V(x)$ -

ниң мәнәлирини һесаплаймиз: $V(0) = 0, V\left(\frac{a}{6}\right) = \frac{2a^3}{27}, V\left(\frac{a}{2}\right) = 0$.

Шуниң билән, қийип елинған квадратниң төрипиниң узунлуғи $\frac{a}{6}$ -ға тәң болса, ящик әң чоң һәжимгә егә болиду.

Жаваби: $\frac{a}{6}$.



1. Функцияниң әң чоң мәнәси максимум чекитидики функцияниң мәнәсиғә тәң болуши шәртму?
2. $f(x_0)$ функциясиниң $[a; b]$ кесиндисидики әң чоң (әң кичик) мәнәси болсун. Буниндин x_0 чекитини функцияниң максимум (минимум) чекити болиду дөп ейталаймизму?
3. а) Қандақту бир кесиндидә; ө) қандақту бир чөкләнгән арилиқта үзүлүшсиз функцияниң әң чоң яки әң кичик мәнәсиниң болуши мүмкинму? Жавабини чүшәндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

$y = f(x)$ функциялиринин берилгән кесиндиләрдики өң чоң вә өң кичик мәналирини тепиңлар (22.1-22.3):

22.1. а) $f(x) = 2x - 3, [-1; 1];$ ө) $f(x) = 5 - 3x, [-2; 1].$

22.2. а) $f(x) = 2x^2 - 8x, [-2; 1];$ ө) $f(x) = x - \frac{4}{x}, [1; 4].$

22.3. а) $f(x) = \frac{x-1}{3x}, [-2; 0];$ ө) $f(x) = \frac{2x}{x+1}, [-2; 0].$

22.4. а) 7 санини қандақ икки қошулғучқа айриғанда, уларниң көпәйтиндиси өң чоң мәнаға егә болиду?

ө) 10 санини қандақ икки қошулғучқа айриғанда уларниң кублириниң қошундиси өң кичик болиду?

22.5. а) 64 сани икки ижабий көпәйткүчлөргә айрилған. Көпәйткүчлөрниң қошундиси өң кичик сан болуш үчүн көпәйткүчлөр қандақ санлар болуши керәк?

ө) 100 сани икки сәлбий көпәйткүчлөргә айрилған. Қошундилири өң чоң сан болуш үчүн көпәйткүчлөр қандақ санлар болуш керәк?

22.6. а) Материаллиқ чекит $x(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + 2t + 3$ қануни бойичә түз сизиклиқ һәрикәтлиниду. Дәсләпки 2 секундтики $x(t)$ функциясиниң өң чоң вә өң кичик мәналирини тепиңлар.

ө) Жисим $x(t) = \frac{t^3}{3} - t^2 - 3t + 10$ қануни бойичә һәрикәтлиниду. Функцияниң дәсләпки 4 с ичидики өң чоң вә өң кичик мәналирини тепиңлар.

В

Берилгән кесиндиләрдики $y = f(x)$ функциялириниң өң чоң вә өң кичик мәналирини тепиңлар (22.7-22.10):

22.7. а) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 8x - 2, [-4; 2];$

ө) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - 5, [1; 4].$

22.8. а) $f(x) = 2x^2 - \frac{8}{x} + 3, [-5; 1];$ ө) $f(x) = 2x + \frac{1}{x^2} - 5, [\frac{1}{2}; 3].$

22.9. а) $f(x) = \sin x + x, [-\pi; \pi];$ ө) $f(x) = 2\sin x + \cos 2x, [0; 2\pi].$

22.10. а) $f(x) = \frac{1}{x} + x^2, [0,5; 1];$ ө) $f(x) = \sqrt{2-x-x^2}, [-1; 0].$

22.11. а) 75 санини қандақ натурал қошулғучқа айриғанда, уларниң бириниң иккинчи қошулғучниң квадрат томуриға көпәйтиндиси өң чоң болиду?


ө) 32 санини қандақ натурал қошулғучқа айриғанда, уларниң бириниң иккинчи қошулғучниң квадрат томуриға көпәйтиндиси өң кичик болиду?

- 22.12. а) 18 санини қандақ икки қошулғучқа айриғанда, икки һәс-силәнгән биринчи қошулғуч билән иккинчи қошулғучниң квадратиниң қошундиси әң кичик болиду?
ә) 16 санини қандақ икки қошулғучқа айриғанда, уларниң квадратлириниң қошундиси әң кичик болиду?
- 22.13. а) Радиуси 1 см болидиған чәмбәргә ичидин сизилған тик төртбулуңлуқларниң арисидин мәйдани әң чоңини ениқлаңлар;
ә) узунлуғи 12 см кесиндидин ясашқа болидиған тик төртбулуңлуқларниң арисиди мәйдани әң кичикни тепиңлар.
- 22.14. а) Мәйдани әң чоң болидиғандәк қилип тик төртбулуңлуқ мәйдани умумий узунлуғи 80 м қаша билән қоршаш керәк. Мәйданиң өлчәмлирини тепиңлар;
ә) мәйдани әң чоң болидиғандәк қилип тик төртбулуңлуқниң бағни умумий узунлуғи 16 м қаша билән қоршаш керәк. Бағниң өлчәмлирини тепиңлар.
- 22.15. а) Гипотенузиси билән бир катетиниң қошундиси 21 гә тәң барлиқ тик булуңлуқ үчбулуңлуқларниң ичидин мәйдани әң чоң болидиған тик булуңлуқ үчбулуңлуқниң тар булуңини тепиңлар;
ә) гипотенузиси $c = \sqrt{2}$ болидиған барлиқ тик булуңлуқ үчбулуңлуқларниң ичидин периметри әң чоң үчбулуңлуқни тепиңлар.
- 22.16. Шәкли тик төртбулуңлуқ, мәйдани 400 га терилғулук мәйданиниң өтрапиға кәңлиги $l = 10$ м болидиған йолға дәрәк тикиш керәк. Қоршиған дәрәкләр аймиғиниң мәйдани әң кичик болуш үчүн терилғулук аймиғиниң сизиклиқ өлчәмлири қандақ болуш керәк?

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. Төвәндә берилгән график бойичә функцияниң өскүчи вә кемигүчи арилиқлирини ениқлаңлар:

- A. $(-1; 2)$ — өсиду; $(-\infty; -1)$ вә $(2; +\infty)$ — кемийду;
B. $(-2; 1)$ — кемийду; $(1; +\infty)$ — өсиду;
C. $(-\infty; -1]$ вә $[2; +\infty)$ — өсиду;
 $[-1; 2]$ — кемийду;
D. $(-\infty; -1)$ вә $(2; +\infty)$ — кемийду;
 $(-1; 2)$ — өсиду.




2. 1-тапшуруқтики график бойичә функцияниң экстремум чекитлирини тепиңлар:

- A. $x_{\min} = -2, x_{\max} = 1;$ B. $x_{\min} = -1, x_{\max} = 2;$
C. $x_{\min} = 2, x_{\max} = -1;$ D. $x_{\min} = 1, x_{\max} = 1.$

3. $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2$ функциясиниң кемийиш арилиғини тепиңлар:

- A. $[-1; 0);$ B. $[1; +\infty);$ C. $[-1; 0];$ D. $(-\infty; -1].$

4. $f(x) = 0,5x^4 - 2x$ функциясиниң экстремум чекитлирини тепиңлар:
 А. $x_{\max} = 1, \quad x_{\min} = -1;$ В. $x_{\max} = -1, \quad x_{\min} = 1;$
 С. $x_{\min} = 1;$ D. $x_{\max} = -1.$
5. $f(x) = x + 5$ функциясиниң өсүш арилиғини тепиңлар:
 А. $(-\infty; +\infty);$ В. $(-\infty; 5);$ С. $(5; +\infty);$ D. йоқ.
6. $\frac{x^2 - 1}{x}$ функциясиниң критикилік чекитлириниң санини ениқлаңлар :
 А. йоқ; В. 5; С. 2; D. -5.
7. $y = x^3 - 3x$ функциясиниң $[0; 1]$ кесиндисидики өң чоң вә өң кичик мәналирини тепиңлар:
 А. 2; 0; В. 0; -2; С. 3; 0; D. -3; 0.
8. $y = 3x^2 - x^3$ функциясиниң өсүш арилиқлирини тепиңлар:
 А. $(-\infty; -2]$ вә $[0; +\infty);$ В. $(-\infty; -2]$ вә $[0; +\infty);$
 С. $(-\infty; 0]$ вә $[2; +\infty);$ D. $[0; 2].$
9. $y = \sqrt{3}x + \sin 2x$ функциясиниң $[0; \pi]$ кесиндисидики өң кичик вә өң чоң мәналирини тепиңлар:
 А. $\frac{\pi}{6}; \pi;$ В. $\pi\sqrt{3}; \pi;$
 С. $0; \pi\sqrt{3};$ D. $0; \pi.$
10. $f(x) = -x^3 - 2$ функциясиниң максимум чекитини ениқлаңлар:
 А. 2; В. -2; С. 0; D. йоқ.
11. $f(x) = x^2 - 1$ функциясиниң минимум чекитини тепиңлар:
 А. $x_{\min} = -3;$ В. $x_{\min} = -1;$ С. $x_{\min} = 1;$ D. $x_{\min} = 0.$
12. Функцияниң сүрөттө берилгән графиги бойичө экстремум чекитлирини ениқлаңлар:
 А. $a_1; a_3; a_6;$
 В. $a_1; a_4;$
 С. $a_2; a_4; a_5; a_6;$
 D. $a_1; a_4; a_6.$
13. $f(x) = x^2 - 8x$ функциясиниң $[-2; 1]$ арилиғидики өң кичик мәнасини тепиңлар:
 А. 2; В. -7; С. 3; D. 1.
14. $y = 1 - x^2$ функциясиниң кемийиш арилиқлирини ениқлаңлар:
 А. $[-1; 1];$ В. $[-\infty; 0)$ вә $(0; +\infty);$
 С. $(-\infty; 0];$ D. $[0; +\infty).$



15. Насилати $f'(x) = x(4 - x)$ болидиган $f(x)$ функциясининң өсүш арилиқлири узунлуғиниң қошундисини тепиңлар:
 А. 3; В. 4; С. 6; D. 5.
16. $g(x) = \frac{1}{3} \sin 3x$ функциясининң $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидики өң чоң вә өң кичик мәналирини тепиңлар:
 А. 9; 1; В. -1; 0; С. $\frac{1}{3}; 0$; D. $0; -\frac{1}{3}$.
17. $y(x) = \frac{x}{3} - \frac{3}{x}$ функциясининң кемийиш арилиқлирини ениқлаңлар:
 А. йоқ; В. $[-3; 3]$;
 С. $(-\infty; -3]$ вә $[0; 3)$; D. $(-\infty; -3)$ вә $(0; +\infty)$.
18. $y = x^2 - 2$ функциясининң $[2; 3]$ арилиғида өң чоң вә өң кичик мәналирини тепиңлар:
 А. 4; 1; В. -4; 7; С. 2; 7; D. 6; 12.
19. $y = \frac{3}{x} - \frac{x}{3}$ функциясининң нөллирини тепиңлар:
 А. -3; 0; 3; В. 3; -3; С. -3; 0; D. 0; 3.
20. $f(x) = 4 \sin^2 x + 5 \cos^2 x$ функциясининң өң чоң мәнасини тепиңлар:
 А. -2; В. 0; С. 5; D. 2.
21. $f(x) = \sqrt{2}x + \cos 2x$ функциясининң $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ кесиндисидики өң кичик вә өң чоң мәналирини тепиңлар:
 А. $1; \frac{\sqrt{2}}{2}; \left[\frac{\pi}{4} + 1\right]$; В. $0; \pi\sqrt{2}$; С. $\frac{\pi}{4}; \pi$; D. $\pi\sqrt{2}; \pi$.

Математикалық саватлық бойичә тапшуруқлар

22. Цифрлири қайтиланмайдиғандәк 2; 3; 5 цифрлиридин қанчә үч ханилық тағ сан қураштурушқа болиду:
 А. 3; В. 4; С. 6; D. 5; E. 7.
23. Икки бригада барлиғи 40 км йол жөндиди. Биринчи бригада күнигә 9,5 км, әнди иккинчи бригада күнигә 7 км йол жөндигән. Әгәр биринчи бригада иккинчисигә қариғанда бир күн кам иш ишлисә, у чағда келәси йәкүнләрниң қайсиси һәқиқәт болиду:
 А. Биринчи бригада үч күн, әнди иккинчи бригада төрт күн иш ишлигән.
 В. Биринчи бригада төрт күн, әнди иккинчи бригада үч күн иш ишлигән.
 С. Биринчи бригада иккинчи бригадиға қариғанда 3 км йол артуқ жөндигән.

Д. Иккинчи бригада биринчи бригадиға қарығанда 2 км йол артуқ жөндигән.

Е. Иккинчи бригада биринчи бригадиға қарығанда 3 км йол артуқ жөндигән.

24. [209; 245) арилиғиға тегишлик 7 гә һәссилик болидиған қанчә натурал сан бар:

А) 3; В) 4; С) 6; D) 5; Е) 7?

25. Әгәр биринчи санны 25% қа, иккинчи санны 40% қа кемитсә, учағда мошу санларниң көпәйтиндиси қанчә пайизға кемийду:

А) 40% -қа кемийду; В) 45% -қа кемийду;
С) 20% -қа кемийду; D) 50% -қа кемийду; Е) 35% -қа кемийду?

ТАРИХИЙ МӘЛУМАТЛАР

Maximum вә *minimum* сөзлирини латин тилидин тәржимә қилғанда, мувапик “өң чоң” вә “өң кичик” дегән мәнани бериду. Геометриялик миқдарларниң өң чоң вә өң кичик мәналирини тепишниң бәзи бир айрим соаллири билән қедимий грек математиклири шуғуланған.

Қедимий грек математиги Евклид өзиниң “Башланмилири” намлиқ әмгигидә әһмийити төвәндики чүшәнчини билдүридиған жүмлини испатлайду (таза геометриялик көз қарашта): берилгән үчбулуңлуққа ичидин сизилған барлиқ параллелограммниң арисидин асаси үчбулуңлуқниң асасиниң йеримиға тәң параллелограмминиң мәйдани өң чоң болуп һесаплиниду.

Йеңи әсирниң бешида пән вә техника һесаплири миқдарларниң өң чоң вә өң кичик мәналирини тепиш үчүн умумий услубни һажәт әтти. Шу вақитниң өзидә немис математиги И.Кеплер (1615) миқдарниң максимум әтрапидики өзгириши азла дөп, экстремумни тепиш вақтида һасилатни нөлгә тәңләштүрүш тоғрилиқ идеяни ейтти. Француз математиги П.Ферма өзиниң “Максимумлар вә минимумларни тәкшүрүш усули” дөп атилидиған әмгигидә чөк вә һасилат чүшәнчилирини қолланмиди, униң экстремумларни ениқлаш усули биз қоллинип жүргән вә асасән һасилатни нөлгә тәңләштүрүш болуп һесаплинидиған Г. Лейбниц вә И.Ньютонниң усуллири билән мувапик келиду.

П. Ферма берилгән шарға һәжими өң чоң конусни, бети өң чоң болидиған цилиндрни ичидин сизиш һесаплиридин башқа һесаплириғиму өз усулини қолланди. Шунинң билән биллә өз усулини пәқәт пүтүн алгебрилик функцияләргила қоллинип, экстремумларни айриш (максимумни минимумдин) критерийини қолланмиди. 1958-жили голландиялик математик Б. Гудде бөргән максимумлар вә минимумларни тепиш қайдиси тоғрилиқму сөз қилишқа тоғра келиду.

И. Ньютон (1671) миқдарларниң өң чоң вә өң кичик мәналирини ениқлаш, йәни тохташ принципини тәриплиди: “Әгәр миқдар барлиқ мүмкин болидиған мәналарниң өң чоңи вә өң кичиги болса, у чағда мошу пәйттә у өзгөрмәйду”. И. Ньютон өз қайдисини иррационалликқа қоллинишқа болидиғанлиқтин, Гудде қайдисиниң умумий түри болидиғанлиғини икки мисал билән кәлтүргән.

Максимумлар вә минимумлар проблемалирини тәкшүрүшкә Лейбниц муһим һәссә қошти. Өзиниң “Йеңи усул” (1684) намлиқ әмгигидә у физикиниң өсүш

вə кемийиш арилиғини төкшүрүштө дифференциал чүшөнчисини пайдиланди вə асасен биз қоллинип жүргөн, өгөр $y(x)$ функциясиниң *һасилати қандақта бир арилиқта функция аргументиниң өзгириши вақтада ижабий болса, у чагда берилгән функция мошу арилиқта өсидү, һасилат сэлбий болса, функция кемийдү* дегән теоремини йөкүнлөйдү. Функцияниң (экстремум болған һаләттө), өң чоң яки өң кичик ординатиси яндашминиң янту болмайдиған шөрти билән, йөни дифференциал $dy = 0$ шөрти билән ениқлиниду. Бу һаләттө ординатилар “өсмөйдү, кемимөйдү, бир қелипта туриду”.

Л. Эйлер (1755) өзиниң “Дифференциаллиқ һесаплаш” намлиқ өмгигидө функцияниң мөнаси, мәсилән, максимум чекитидө мошу функцияниң өң чоң мөнаси билән мутлақ мувапиқ кәлмөйдиғанлиғини өскө елип, абсолют экстремумларни “асасий төриплимиси” дөп атилидиған нисбий экстремумлардин ажратти. Шундақта у көп өзгөрмө $f(x, y, z, \dots, u)$ функциясиниң максимум вə минимумлирини қараштурди. Функцияләрни максимум вə минимумға төкшүрүш үчүн Л. Эйлер биринчи вə иккинчи һасилатлар биләнла чөкләнмөй, жуқури рәтлик һасилатларниму қолланди.

Максимумлар вə минимумлар тоғрилиқ илим бизниң заманимизда вақитни ихтисатлиқ пайдилиниш, ишлөп чиқириш үчүн һажәтлик хам өшия билән тәминлөш, өмгөк үнүмдарлиғини ашүрүш, умүмән ихтисатни төрөққий өткүзүш мәсилилиридө өһмийәтлик пәнләрниң бири болуп һесаплиниду.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тәсадиқи вақиәләр вə уларниң түрлири, вақиә еһтималлиғиниң классикилиқ формулиси, беқинда вə беқинда әмәс вақиәләр, уларниң еһтималлиғини һесаплайдиган формулилар.

7

ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАР ВӘ УЛАРНИҢ САНЛИҚ ТӘРИПЛИМИЛИРИ

§ 23. ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАР ВӘ УЛАРНИҢ ТҮРЛИРИ. ТӘСАДИПИ МИҚДАРНИҢ ТАРИЛИШ ҚАНУНИЙИТИ

Асасий чүшәнчиләр

Тәсадипи миқдар,
тарилиш қанунийити,
дискретлиқ тәсадипи
миқдар, үзүлүшсиз
тәсадипи миқдар



Силәр тәсадипи миқдар билән униң түрлири тоғрилиқ чүшиник алисиләр; тәсадипи миқдарларниң тарилиш қанунийәтлири билән тонушусиләр вә уларни қоллинип һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

Еһтималлиқлар нәзәрийәсидә бәлгүлүк шәртләр орунлинидиған һаләттә тәжрибә ясилиду. Тәжрибә нәтижиси вақиә дәп қобул қилиниду. Вақиәләр үч топқа бөлүниду: 1) һәқиқий вақиәләр; 2) ялған вақиәләр; 3) тәсадипи вақиәләр.

Мәсилән, “атмосферилик қисимда 20°C температурада су һориниң суюқлуқ һалитини сақлиши”, “күн билән түн жил мәзгилигә бағлиқ бәлгүлүк бир вақит ичидә алмишип туриду”, “күн билән түнниң алмишиши, күндүзи йоруқ, кечиси қараңғу болуши” — һәқиқий вақиәләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

Тәсадипи вақиәләр маслашқан, маслашмиған, мүмкинчиликлири бирдәк, қариму-қарши вақиәләр болуп төрткә бөлүниду. Шуниң билән биллә толук вақиәләр топи, бирла мүмкинчиликтики вақиәләр, беқинда вә мустәқил вақиәләр чүшәнчилири силәргә төвәнки синиплардин мәлум.

Тәсадипи вақиәләрни тәкшүргәндә униң санлиқ хусусийәтлиригә тохтилип, уларни баһалаш керәк. Санларға тәриплимә бериш үчүн еһтималлиқлар нәзәрийәсидә *тәсадипи миқдар* дәп атилидиған чүшәнчә киргүзилиду.

Алдин-ала бәлгүсиз, пәқәт тәжрибә нәтижисидә ениқлинидиған бир мәналик миқдарни еһтималлиқлар нәзәрийәсидә тәсадипи миқдар дәп атайду.

Тәсадипи миқдарларға мисаллар:

- 1) бир төвлик ичидә Алмута шәһириниң пәрзәнтханилирида дунияға кәлгән пәрзәнтләр сани;
- 2) нишанни дәл көзләп етип чүшәргичә етилидиған оқлар сани;
- 3) артиллериялик снарядниң учуш жирақлиғи;
- 4) һәр қандақ санаәт орниниң яки һәр қандақ аилиниң электр энергиясини пайдилиниш мөлчәри (мәлум бир вақит бирлигидә, ейтайлуқ, ай, жил в.б.).

Жуқурида көрситилгән тәсадиби миқдарларни тәжрибә ясимай дәл ениқлаш мүмкин әмәс.

Еһтималлиқлар нәзәрийәсидә тәсадиби миқдарларни латинниң баш һәриплири билән ($X; Y; Z, \dots$), уларниң мәналирини болса, латинниң кичик һәриплири билән ($x_1; y_1; z_1, \dots$) бөлгүләйду.

Еһтималлигиниң мәналири көрситилгән айрим мүмкин мәналири қобул қилидиган тәсадиби миқдарни дискретлиқ тәсадиби миқдар дәп атайду.

Жуқурида ейтилған 1) вә 2) мисаллар дискретлиқ тәсадиби миқдарларға ятиду.

Мәналири үзүлүшсиз $[a; b]$ кесіндісінде (мұндағы $a < b$, a вә b — ихчам һәқиқий санлар) орунлашқан тәсадиби миқдарни үзүлүшсиз тәсадиби миқдар дәп атайду.

Жуқурида кәлтүрүлгән 3- вә 4-мисаллар үзүлүшсиз тәсадиби миқдарларни бериду.

Әскәртиш. Дәрислик йөнилишигә мувапиқ, дискретлиқ тәсадиби миқдарларниң мәналирини айрим-айрим ихчам санлар билән, үзүлүшсиз тәсадиби миқдарларниң мәналирини чөкләнгән кесиндидә қараштуриду.

X тәсадиби миқдарини алайли. Униң қобул қилидиган мүмкин мәналири $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_n$ вә уларға мувапиқ еһтималлиқлири $p_1, p_2, p_3, \dots, p_{n-1}, p_n$ болсун. Шу чағда 12-жәдвәлни қурушқа болиду.

12-жәдвәл

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_{n-2}	x_{n-1}	x_n
P	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_{n-2}	p_{n-1}	p_n

12-жәдвәлдә тәсадиби миқдар $X = x_1$ вақиәсиниң еһтималлиғи p_1 , $X = x_2$ вақиәсиниң еһтималлиғи болса p_2 , $X = x_3$ вақиәсиниң еһтималлиғи p_3 в.ш.о. $X = x_{n-1}$ вақиәсиниң еһтималлиғи p_{n-1} , әнди $X = x_n$ вақиәсиниң еһтималлиғи p_n болуш мувапиқлиғи орунланған.

12-жәдвәлдә берилгән қанунийәтни X тәсадиби миқдариниң тарилиш қанунийити дәп атайду.

Тәсадиби миқдар өзиниң мүмкин мәналирини шәртлик түрдә қобул қилидиган болғанлиқтин,

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_{n-1} + p_n = 1 \quad (1)$$

тәңлиги орунлиниду.

МИСАЛ

1. Лотореяда 10 000 билет бар. Бир утушта 5000 тг, йүз утушта 1000 тг, миң утушта 100 тг-дин утуш бар, қалған билетларда болса утуш йоқ. Бир билет сетип алған адәмниң утуш елиш мүмкинчилиғи X тәсадиби миқдари болса, у чағда тәсадиби тарилиш қанунийәтлериниң жәдвилини қурайли.

Йешилиши. Несапниң шәрти бойичә утуш мөлчәри 5000 тг болидиган бир билет, 1000 тг утидиган йүз билет, 100 тг утидиган миң билет бар. Нәр қайсисиниң еһтималлиғини ениқлайли.

$$x_1 = 5000, \quad p_1 = \frac{1}{10000} = 0,0001;$$

$$x_2 = 100, \quad p_2 = \frac{100}{10000} = 0,01;$$

$$x_3 = 1000, \quad p_3 = \frac{1000}{10000} = 0,1.$$

У чағда утуш йоқ билетларның еһтималлығы (1) формула бойычә һесаплиниду.
 $p_4 = 1 - p_1 - p_2 - p_3 = 1 - 0,0001 - 0,01 - 0,1 = 0,8899$. Демәк, тәсадиһи миқдарның тариһиш қануһийити 13-жәдвәлдә көрситилгән:

13-жәдвәл

X	5000	1000	100	0
P	0,0001	0,001	0,1	0,8899

МИСАЛ

2. Биринчи мәргәннің нишанни дәл көзләш еһтималлығы 0,8.

Иккинчи мәргәннің нишанни дәл көзләш еһтималлығы 0,75. Һәр қайсиси нишанни бир-бирдин атти. X тәсадиһи миқдари — нишанға төккүзүш сани. Нишанни дәл көзләшнің тариһиш қануһийитини еһиқлайли.

Йеһилиши. Тәсадиһи миқдарның қобул қилидигән мүмкин мәнәлири: 1) $x_1 = 0$ — икки мәргәннің иккиһисиниң төккүзәлмәйдиғанлығы. Мошу вақиәгә мувапиқ еһтималлық: $P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 0,2 \cdot 0,25 = 0,05$.

2) $x_2 = 1$ (мәргәнләрнің бириниңлә дәл көзлиши). Мошу вақиәгә мувапиқ келидигән еһтималлық: $P(A\bar{B} + \bar{A}B) = P(A) \cdot P(\bar{B}) + P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,25 + 0,2 \cdot 0,75 = 0,2 + 0,15 = 0,35$.

3) $x_3 = 2$ (мәргәнләрнің иккиһисиниң дәл көзлиши). Мошу вақиәгә мувапиқ келидигән еһтималлық: $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,75 = 0,6$.

X тәсадиһи миқдариниң тариһиш қануһийити 14-жәдвәлдә көлтүрүлгән:

14-жәдвәл

X	0	1	2
P	0,05	0,35	0,6



1. Тәсадиһи вақиәләр түриниң тәсадиһи миқдарларға тәсири қандақ?
2. Тәсадиһи вақиәләр билән тәсадиһи миқдарларның пәрқини қандақ чүшәндүрүшкә болиду?
3. X тәсадиһи миқдариниң тариһиш қануһини йезиш үчүн қандақ элементлар керәк?
4. Немишкә тәсадиһи миқдарни тәжрибә яһимайла еһиқлашқа болмайду?

Көнүкмиләр

A

23.1. 15-жәдвәлдә тәсадиһи миқдарның толук әмәс тариһиш қануһийити берилгән:

15-жәдвәл

X	4	7	10	13	17
P	0,05	?	?	?	0,05

Бөлгүсиз еһтималлиқларниң үлүшлири бирдөк дәп ойлап, тәсадиби миқдарниң толук тарилиш қанунийитини йезиңлар.

23.2. Жәдвәлдә тәсадиби миқдарниң тарилиш қанунийити берилгән:

15-жәдвәл

X	2	?	?	?	?	12
P	0,05	?	?	?	?	0,05

Тәсадиби миқдарниң бөлгүсиз мәналири берилгән әзалири билән биллә өскүчи арифметикилик прогрессияни тәшкил қилиду, уларниң мувапик еһтималлиқлири $1 : 3,5 : 3,5 : 1$ пропорция қанунийитини бериду дәп һесаплап, тәсадиби миқдарниң толук тарилиш қанунийитини йезиңлар.

23.3. Оттура әзалири 8 гә, 12 гә тәң төрт әзасидинла туридиған арифметикилик прогрессия берилгән. Әгәр оттура әзалириниң еһтималлиқлири чәтки икки әзасиниң еһтималлиқлиридин төрт һәсәә чоң болса, ундақ тәсадиби миқдарниң толук тарилиш қанунийитини йезиңлар.

23.4. Мәргән нишанни 3 рәт атти. Нишанни дәл көзләш еһтималлиғи 0,9. Мәргәнниң нишанни дәл көзлишиниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

В

23.5. Төрт патрони бар мәргән нишанни дәл көзләп атиду. Мәргәнниң дәл көзләш еһтималлиғи 0,6 ға тәң. Мәргәнниң нишанни дәл көзлиши үчүн чиқарған патронлириниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

23.6. 100 лотерея билети сетилған. Уларда 500 тг-дин бир утуш, 100 тг-дин он утуш, 50 тг-дин әллик утуш бар, қалған билетларда утуш йоқ. Бир лотерея билетини сетип алған адәм үчүн утушниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

23.7. Бир қетим ташланған тийинниң “герб” тәрипи билән чүшүшиниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

23.8. Икки мәргән нишанни көзләйду. Уларниң нишанни дәл көзлишиниң еһтималлиғи мувапик 0,9 вә 0,8. Мәргәнләр бир-бирдин нишанни атти. X тәсадиби миқдари — нишанға дәл тегиш сани. Мошу тәсадиби миқдарниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тәсадиби вақиә вә тәсадиби миқдар, уларниң түрлири, тәсадиби миқдарниң тарилиш қанунийити.

§ 24. ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАРНИҢ САНЛИҚ ТӘРИПЛИМИЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

тәсадипи миқдар,
математикилик
тәхмин, дисперсия,
оттура квадратлик
чәтнәш



Силәр математикилик тәхмин, дисперсия, оттура квадратлик чәтнәш чүшәнчилири, уларниң хусусийәтлири вә формулилири билән тонушусиләр, тәсадипи миқдарниң санлиқ тәриплимилмирини қоллинишқа һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

Тарилиш қанунийити тәсадипи миқдарниң толук тәриплимисини көрситиду. Бәзи әһвалларда тәсадипи миқдарниң санлиқ тәриплимисини ениқлаш керәк. Шуңлашқа тәсадипи миқдарниң математикилик тәхмини, дисперсияси, оттура квадратлик чәтнәш чүшәнчилирини киргүзүп, тәсадипи миқдарниң бәлгүсиз мәналирини тепишни яки тәсадипи миқдарни тәкшүрүшни қараштуримиз.

I. Математикилик тәхмин

Дискретлик тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити 17-жәдвәлдә берилгән:

17-жәдвәл

X	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-2}	x_{n-1}	x_n
P	p_1	p_2	p_3	...	p_{n-2}	p_{n-1}	p_n

X тәсадипи миқдари мәналириниң мувапик еһтималлиқ мәналирига көпәйтиндилириниң қошундисини X тәсадипи миқдарниң математикилик тәхмини дәп атайду.

Математикилик тәхминниң бәлгүлиниши: $M(X)$.

Математикилик тәхминни һесаплаш формулиси:

$$M(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_{n-1} \cdot p_{n-1} + x_n \cdot p_n. \quad (1)$$

МИСАЛ

1. Тарилиш қанунийити 18- вә 19-жәдвәлләрдә берилгән тәсадипи миқдарниң математикилик тәхминини һесаплаңлар.

18-жәдвәл

X	3	7	11	13	16
P	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

19-жәдвәл

Y	2	5	8	9	12
P	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

Йешилиши. Һәр қайсисиниң математикилик тәхминини һесаплаш үчүн (1)-формулини қоллинимиз:

$$1) M(X) = 3 \cdot 0,1 + 7 \cdot 0,2 + 11 \cdot 0,4 + 13 \cdot 0,2 + 16 \cdot 0,1 = 10,3;$$

$$2) M(Y) = 2 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,2 + 12 \cdot 0,1 = 7,4.$$

Жаваби: 1) 10,3; 2) 7,4.

Мисалдики һәрбір әһвал үчүн арифметикилик оттура мәнасини ениқлайли.

$$\bar{x} = \frac{3 + 7 + 11 + 13 + 16}{5} = 10; \quad \bar{y} = \frac{2 + 5 + 8 + 9 + 12}{5} = 7,2.$$

Мошу қараштурулған мисалдин мундақ хуласә ясашқа болиду:

1) математикилик тәхмин — тәсадиби миқдар мәналириниң арифметикилик оттурисиға йеқин орунлишидиған миқдар:

$$M(X) \approx \bar{x}, M(Y) \approx \bar{y},$$

2) тәсадиби миқдарларниң мәналири өскүчи тизма болған әһвалда математикилик тәхминдин кичик тәсадиби миқдарниң мәналири униң тарилиш қанунийити жәдвелиниң сол тәрәп бөлигидә, чоң мәналири оң тәрәп бөлигидә орунлишиду.

Әнди қануний соал туғулиду: “Немә сәвәптин $M(X)$ арифметикилик оттуриға йеқин орунлишиду?”

n рәт тәжрибә ясалған дәп ойлайли. Мошу тәжрибиниң нәтижисидә x тәсадиби миқдарниң x_1 мәнасини m_1 қетим, x_2 мәнасини m_2 қетим, x_k -мәнасини m_k қетим қобул қилсун.

Шу чағда X тәсадиби миқдариниң n қетим тәжрибә ясалғанда ($m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$) қобул қилған барлиқ мәналириниң қошундиси мону қошундиға тәң:

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_k x_k.$$

Һәр бир тәжрибигә мувапиқ келидиған тәсадиби миқдарниң мәнаси:

$$\frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_k x_k}{n} = x_1 \cdot \frac{m_1}{n} + x_2 \cdot \frac{m_2}{n} + \dots + x_k \cdot \frac{m_k}{n}, \quad (2)$$

бу йәрдики $\frac{m_1}{n}, \frac{m_2}{n}, \dots, \frac{m_k}{n}$ мәналири $x_1, x_2, \dots, x_k$ болған әһвалдики селиштурма чапсанлиқлар.

Тәжрибиниң сани n ашқансири $\frac{m_1}{n} \rightarrow p_1, \frac{m_2}{n} \rightarrow p_2, \dots, \frac{m_k}{n} \rightarrow p_k$ интилиду. Шу чағда математикилик тәхминигә тәң миқдарни алимиз.

МИСАЛ

2. 10 адәм ишләйдиған компаниядә мааши төвәндикичә бөлүнгән: икки адәм 20 миң төңгә; үч адәм 40 миң төңгә; төрт адәм 80 миң төңгә; бир адәм 100 миң төңгә алиду. Һәр айда маашқа 580 миң төңгә бөлүниду. Барлиқ ишчиларға бирдәк мааш төлисә, һәр қайсиси ейиға қанчә мааш алған болар еди?

Йешилши. Мааш мөлчәри тәсадиби миқдар болсун. Маашниң тарилиш қанунийитини язимиз (20-жәдвәл).

20-жәдвәл

20 миң төңгә	40 миң төңгә	80 миң төңгә	100 миң төңгә
$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{1}{10}$

Компаниядики барлық адамларға бирдәк мааш төленсә, уларның һәр қайсиси ейиға 58 миң теңгә алған болар еди. Бу — оттура айлық маашның миқдари. Математикилик тәхмин мошу оттура маашның миқдарини бериш керәк.

$$M(X) = 20000 \cdot \frac{2}{10} + 40\,000 \cdot \frac{3}{10} + 80\,000 \cdot \frac{4}{10} + 100\,000 \cdot \frac{1}{10} = 58\,000.$$

Демәк, оттура маашның миқдари математикилик тәхмингә тең.

Жаваби: 58 миң теңгә.

ӘСТӘ САҚЛАҢЛАР!

Математикилик тәхминнің хусусийәтлири:

1) әгәр C — турақлик, X — тәсадиби миқдар болса, у чағда

$$M(C) = C, \quad (3)$$

$$M(CX) = CM(X); \quad (4)$$

2) X, Y, Z — тәсадиби миқдарлар болса, у чағда

$$M(X + Y + Z) = M(X) + M(Y) + M(Z). \quad (5)$$

МИСАЛ

3. Биринчи мисалда һесапланған X вә Y тәсадиби миқдарлириниң математикилик тәхминини қоллинип, 1) $M(2X)$; 2) $M(4Y)$; 3) $M(5X - 3Y)$ мәналирини тапайли.

Йешилиши. 1-мисалның йешилиши бойичә $(X) = 10,3$; $M(Y) = 7,4$. У чағда 1) (4)-формула бойичә $M(2X) = 2 \cdot M(X) = 2 \cdot 10,3 = 20,6$; 2) $M(4Y) = 4M(Y) = 4 \cdot 7,4 = 29,6$; 3) (5) вә (4)-формулиларни қоллинип $M(5X - 3Y) = 5M(X) - 3M(Y) = 5 \cdot 10,3 - 3 \cdot 7,4 = 51,5 - 22,2 = 29,3$ алимиз.

Жаваби: 1) 20,6; 2) 29,6; 3) 29,3.

Математикилик тәхмин тәсадиби миқдарның арифметикилик оттурисиға йеқин орунлашқан миқдарның санлик тәриплимиси болидиғанлиғини ениқлидуқ. Арифметикилик оттуридин қандақ жирақлиқта орунлишидиғини бәлгүсиз болғанлиқтин, тәсадиби миқдарның башқа мәналирини тешишның тәжрибилик мәнаси зор. Мәсилән, көплигән заводларның жұмһурийәт бойичә оттура әмгәк мәһсулдарлиғи бәлгүлүк болғини билән, һәр заводның өзиниң әмгәк мәһсулдарлиғи бәлгүсиз, нәзәрдин сирт қаливериду. Шәхсий кооператив егиликлириниң мәһсулдарлиғи көп һаләтләрдә нәзәрдин сирт қалиду.

Демәк, тәсадиби миқдарның мүмкин болидиған мәналири униң оттура мәналириға нисбәтән қандақ орунлашқанлиғини тәкшүрүш үчүн тәсадиби миқдарның санлик тәриплимилири, йәни дисперсия, оттура квадратлик чәтнәш чүшәнчилиригә тохтилимиз.

$\{X - M(X)\}$ тәсадиби миқдариниң математикилик тәхминини һесаплайли. $X - M(X)$ айримиси тәсадиби миқдарның мүмкин болидиған мәнаси билән оттура мәнасиниң арисидики айрима, мошу айримини еһтималлиқлар нәзәрийәсидә *чәтнәш* дәп атайду.

Чөтнөшнің тарилиш қанунийитини язайли (21-жәдвәл):

21-жәдвәл

$X - M(X)$	$x_1 - M(X)$	$x_2 - M(X)$	...	$x_n - M(X)$
P	p_1	p_2	...	p_n

Әнди чөтнөшнің оттура мәнасини яки униң математикилик тәхминини һесаплайли. $M(X)$ — турақлик миқдар, шуңлашқа $M[M(X)]$, йөни турақлиқниң математикилик тәхмини өзигә тәң:

$$M[X - M(X)] = M(X) - M[M(X)] = M(X) - M(X) \equiv 0.$$

Шуниң билән тәсадиби миқдарниң чөтнөшниниң оттура мәнаси нөлгә тәң. Демәк, чөтнөшнің оттура мәнаси тәсадиби миқдар мәналириниң бир-биригә йеқин яки жирақ орунлишишиниң қанунийитини тәкшүрәлмәйду. Шуңлашқа еһтималлиқлар нәзәрийәсидә тәсадиби миқдарниң тарилиш қанунийитини тәкшүрүш үчүн чөтнөшнің иккинчи дәрижисиниң математикилик тәхмини қараштурилиду.

II. Дисперсия

Чөтнөшнің иккинчи дәрижисиниң математикилик тәхмини X тәсадиби миқдариниң дисперсияси дәп атилиду.

Дисперсияниң бөлгүлиши: $D(X)$.

Дисперсияни һесаплаш формулиси:

$$D(X) = M[X - M(X)]^2. \quad (6)$$

ӘСТӘ САҚЛАҢЛАР!

Дисперсияниң хусусийәтлири:

1) әгәр C — турақлик X — тәсадиби миқдар болса, у чағда

$$D(C) = 0, \quad (7)$$

$$D(CX) = C^2 D(X), \quad (8)$$

$$2) \quad D(X) = M(X^2) - M^2(X); \quad (9)$$

3) X вә Y тәсадиби миқдарлар болса,

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y). \quad (10)$$

(6) вә (9)-формулиларниң өз ара тәң екәнлигини математикилик тәхминниң хусусийәтлирини қоллинип испатлайли.

Испатлиниши. $M[X - M(X)]^2 = M[X^2 - 2XM(X) + M^2(X)] = M(X^2) - 2M(X) \cdot M(M(X)) + M^2(X) = M(X^2) - 2M(X) \cdot M(X) + M^2(X) = M(X^2) - 2M^2(X) + M^2(X) = M(X^2) - M^2(X)$. Демәк, (9)-формула дисперсияни һесаплаш формулиси болуп атилиду.

МИСАЛ

4. 22-жәдвәлни қоллинип, X тәсадиби миқдариниң дисперсиясини һесаплайли:

22-жәдвәл

X	5	7	10	15
P	0,2	0,5	0,2	0,1

Йешилиши. Алди билән математикилик тәхминни тапимиз.

$$M(X) = 5 \cdot 0,2 + 7 \cdot 0,5 + 10 \cdot 0,2 + 15 \cdot 0,1 = 8.$$

$[X - M(X)]^2$ миқдариниң тарилиш қанунийитини түзәйли. Униң үчүн x_1 -ни ҳесаплап көрситәйли: $[X - M(X)]^2 = (5 - 8)^2 = (-3)^2 = 9$. Дәл мошундақ ҳесаплап, $x_2 = 1$, $x_3 = 4$, $x_4 = 49$ алимиз (23-жәдвәл).

23-жәдвәл

$[X - M(X)]^2$	9	1	4	49
P	0,2	0,5	0,2	0,1

Демәк, (6)-формулини қоллинип дисперсияни тапимиз:

$$D(X) = M [X - M(X)]^2 = 9 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,5 + 4 \cdot 0,2 + 49 \cdot 0,1 = 8.$$

Жаваби: 8.

III. Оттура квадратлик чәтнәш

Дисперсия чүшәнчиси — квадрат өлчәмлик чүшәнчә, униң өлчими тәсадиби миқдарниң квадратиға тәң.

Дисперсиядин елинған квадрат томур оттура квадратлик чәтнәш дәп атилиду.

Оттура квадратлик чәтнәшниң бөлгүлиниши: $\sigma(X)$.

Оттура квадратлик чәтнәшни ҳесаплаш формулиси:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(x)}. \quad (11)$$

Оттура квадратлик чәтнәшниң өлчими- — сизиклик өлчәм.

МИСАЛ

5. Жуқуридики мисалдики тәсадиби миқдарниң оттура квадратлик чәтнәшини ҳесаплайли.

Йешилиши. Һесаплаш бойичә $D(X) = 8$. Әнди (11)-формулини қоллинимиз:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Жаваби: $2\sqrt{2}$.

Әнди тәсадиби миқдарниң санлик тәриплимисини беридиған математикилик тәхмин, дисперсия, оттура квадратлик чәтнәшни ҳесаплашқа мисал қараштурайли.

МИСАЛ

6. X вә Y тәсадиби миқдарларниң тарилиш қанунийәтлири 24, 25-жәдвәлләрдә берилгән:

24-жәдвәл

X	3	5	8	10	12
P	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1

25-жәдвәл

Y	2	5	8	12	14
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

1) $M(X)$, $M(Y)$; 2) $D(X)$, $D(Y)$; 3) $\sigma(X)$, $\sigma(Y)$; 4) $D(3X - 2Y)$ мәндәрін есептейік.

Йешилиши. 1) $M(X) = 3 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,3 + 10 \cdot 0,2 + 12 \cdot 0,1 = 7,4$;
 $M(Y) = 2 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,3 + 12 \cdot 0,3 + 14 \cdot 0,1 = 8,6$.

2) Дисперсияларни ениқлаш үчүн 26, 27-жәдвәлләрни толтуримиз:

26-жәдвәл

X^2	9	25	64	100	144
P	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1

27-жәдвәл

Y^2	4	25	64	144	196
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

$$M(X^2) = 9 \cdot 0,1 + 25 \cdot 0,3 + 64 \cdot 0,3 + 100 \cdot 0,2 + 144 \cdot 0,1 = 62,$$

$$M(Y^2) = 4 \cdot 0,1 + 25 \cdot 0,2 + 64 \cdot 0,3 + 144 \cdot 0,3 + 196 \cdot 0,1 = 87,4.$$

$$D(X) = 62 - 7,4^2 = 62 - 54,76 = 7,24,$$

$$D(Y) = 87,4 - 8,6^2 = 87,4 - 73,96 = 13,44.$$

$$3) \sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{7,24} \approx 2,7, \quad \sigma(Y) = \sqrt{D(Y)} = \sqrt{13,44} \approx 3,7;$$

$$4) D(3X - 2Y) = 9D(X) + 4D(Y) = 9 \cdot 7,24 + 4 \cdot 13,44 = 65,16 + 53,76 = 118,92.$$

Жаваби: 1) 7,4; 8,6; 2) 7,24; 13,44; 3) $\approx 2,7$; $\approx 3,7$; 4) 118,92.



1. Математикилиқ тәхмин арқилиқ тәсадиби миқдарниң қандақ хусусийәтлирини ениқлайду?
2. Арифметикилиқ оттура тәсадиби миқдарниң қандақ санлиқ тәриплимисигә мувапиқ келиду?
3. Оттура квадратлиқ чәтнәш вә дисперсия чүшәнчилириниң геометриялиқ хусусийәтлирини қандақ чүшәндүрүшкә болиду?
4. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ тепиш үчүн тәсадиби миқдарларниң тарилиш қанунийәтлиридин башқа қошумчә мәлуматлар һажәтму? Жавабини чүшәндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

24.1. X тәсадиби миқдариниң тарилиш қануни 28-жәдвәлдә берилгән:

28-жәдвәл

X	2	4	7	9	12
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

Математикилиқ тәхминни һесаплаңлар.

24.2. Тәсадиби миқдарниң берилгән тарилиш қанунийити бойичә униң дисперсиясини тепиңлар (29-жәдвәл):

29-жәдвәл

X	3	8	12	16	18
P	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

24.3. Төсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити бойиче чётнөшниң миқдарини тепиңлар (30-жәдвәл):

30-жәдвәл

X	2	5	7	10
P	0,2	0,4	0,2	0,2

24.4. Жәдвәлдә X төсадипи миқдарниң толук әмәс тарилиш қанунийити берилгән. Тарилиш қанунийити бойиче дисперсия билән оттура квадратлик чётнөшни тепиңлар (31-жәдвәл):

31-жәдвәл

X	3	21	30	50
P	0,25	?	0,25	0,25

24.5. Төсадипи миқдар X -ниң тарилиш қанунийитини пайдилинип, $M(X)$ мәнасини һесаплаңлар (32-, 33-жәдвәлләр):

32-жәдвәл

1)

X	1	2	3
P	0,7	0,1	0,2

33-жәдвәл

2)

Y	-1	1	2
P	0,4	0,1	0,5

24.6. Төсадипи миқдар Y -ниң тарилиш қанунийитини пайдилинип, дисперсияни тепиңлар (34-, 35-жәдвәлләр):

34-жәдвәл

1)

Y	-2	-1	1	2	3
P	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3

35-жәдвәл

2)

Y	-2	-1	1	2
P	0,1	0,2	0,5	0,2

24.7. 24.5- вә 24.6-тапшурмиларда берилгән тарилиш қанунийитини пайдилинип, оттура квадратлик чётнөшни һесаплаңлар.

В

24.8. Бәлгүсиз еһтималлиқларниң үлүшлири бирдәк болған һаләттә X төсадипи миқдариниң толук әмәс тарилиш қанунийити жәдвилини толтуруңлар. 36-жәдвәлни қоллинип, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ һесаплаңлар.

36-жәдвәл

X	3	7	12	15	18	21
P	0,1	0,1	?	?	0,1	0,1

24.9. X вә Y төсадипи миқдарларниң тарилиш қанунийәтлири арқилиқ $M(X + Y)$, $D(X + Y)$ мәналирини тепиңлар (37-, 38-жәдвәлләр):

37-жәдвәл

X	6	10	14	20
P	$\frac{1}{4}$	0,2	0,3	$\frac{1}{4}$

38-жәдвәл

Y	3	8	11	16
P	0,2	0,3	0,3	0,2

- 24.10. 24.9-көнүкмидики 37, 38-жөдвөллөрни қоллинип $\sigma(X + Y)$, $\sigma(X + 2Y)$ мәналирини һесаплаңлар.
- 24.11. Жөдвөлдө берилгән X вә Y тәсадипи миқдарлириниң толук әмәс қанунийәтлири бойичә $M(X)$, $M(Y)$, $M(X - M(X))$, $M(Y - M(Y))$, $D(X)$, $D(Y)$ миқдарлирини тепиңлар (39-, 40-жөдвөлләр):

39-жөдвөл

X	3	21	30
P	0,25	?	0,45

40-жөдвөл

Y	24	26	28
P	0,25	0,25	?

Мувапиқ миқдарларни селиштуруп, қайси миқдарларниң йеқин орунлашқанлиғини көрситиңлар.

- 24.12. Икки мәргәнниң нишанни бир қетим атқанда оқниң нишанға дәл тегишиниң тарилиш қанунийәтлири берилгән (41-, 42-жөдвөлләр):

41-жөдвөл

X	8	8	10
P	0,4	0,1	0,5

42-жөдвөл

Y	8	9	10
P	0,2	0,5	0,3

Икки мәргәнниң қайсиси нишанға дәлирәк төккүзиду?

- 24.13. Тәсадипи миқдар X -ниң тарилиш қанунийити бойичә $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $M(2X + 5)$, $D(2X + 5)$ миқдарлирини һесаплаңлар (43-жөдвөл):

43-жөдвөл

X	2	3	4	5
P	0,3	0,1	0,5	0,1

- 24.14. $X(-1; 0; 1)$ вә $M(X) = 0,1$; $M(X^2) = 0,9$ берилгән. Тәсадипи миқдарниң мәналириға мувапиқ еһтималлиқлирини тепиңлар вә тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийитини йезиңлар.
- 24.15. X вә Y бир-биригә беқинда әмәс тәсадипи миқдарлар вә $D(X) = 2$, $D(Y) = 5$. $D(3X + Y)$ вә $D(3Y - 2X)$ мәналирини тепиңлар.

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

- Төрти ярамлиқ, бири ярамсиз кнопкилар бар. Мошу кнопкиларниң тәсадипи қанунийити билән икки кнопка елинған. Елинған кнопкиларниң иккисиниң ярамлиқ кнопка болуш еһтималлиғини тепиңлар:
А. 0,4; В. 0,6; С. 0,5; D. 0,7.
- 44-жөдвөлдә X тәсадипи миқдариниң толук әмәс тарилиш қануни берилгән:

44-жәдвәл

X	5	8	12	15	18
P	0,2	?	?	?	0,2

Бәлгүсиз еһтималлиқларниң үлүшлири 1 : 2 : 1 пропорцияси билән берилгән дәп елип, тарилиш қануниниң жәдвилини толтуруңлар (45—48-жәдвәлләр);

45-жәдвәл

A.

X	5	8	12	15	18
P	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2

46-жәдвәл

B.

X	5	8	12	15	8
P	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2

47-жәдвәл

C.

X	5	8	12	15	18
P	0,2	0,15	0,3	0,15	0,2

48-жәдвәл

D.

X	5	8	12	15	8
P	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2

3. 49-жәдвәлдә X тәсадиғи миқдариниң толук әмәс қануни берилгән:

49-жәдвәл

X	5	?	?	?	17
P	0,05	?	?	?	0,05

Бәлгүсиз еһтималлиқларниң үлүшлири бирдәк, уларға мувапиқ келидиған мәналири берилгән мәналар билән биллә өскүчи арифметиқилиқ прогрессия түзәйду дәп елип, тәсадиғи миқдарниң тарилиш қануниниң жәдвилини толтуруңлар (50—53-жәдвәлләр):

50-жәдвәл

A.

X	5	8	11	14	17
P	0,05	0,3	0,3	0,3	0,05

51-жәдвәл

B.

X	5	8	12	15	17
P	0,02	0,3	0,3	0,3	0,8

52-жәдвәл

C.

X	5	8	11	14	17
P	0,05	0,2	0,3	0,4	0,05

53-жәдвәл

D.

X	5	8	12	15	18
P	0,05	0,3	0,3	0,3	0,5

4. X тәсадиғи миқдари 54-жәдвәлдики тарилиш қануни билән берилгән:

54-жәдвәл

X	1	3	5	8	12
P	0,125	0,25	0,25	0,25	0,125

$M(X)$; $M[X - M(X)]$; $M(5X)$ мәналирини тепиңлар:

- A. 5,625; 0; 28,25;
 B. 28,125; 5,65; 0;
 C. 5,625; 0; 28,125;
 D. 5,65; 0; 28,25.

5. X тәсәдипи миқдари 55-жәдвәлдики тарилиш қануни билән берилгән:

55-жәдвәл

X	3	7	11	16	18
P	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

Мошу тарилиш қанунийитини қоллинип, дисперсия билән оттура квадратлик чәтнәшни һесаплаңлар:

- A. $D(X) = 20,25$, $\sigma(X) = 4,5$; B. $D(X) = 4,4$, $\sigma(X) = 19,49$;
C. $D(X) = 12,25$, $\sigma(X) = 3,5$; D. $D(X) = 19,49$, $\sigma(X) \approx 4,4$.

6. X тәсәдипи миқдариниң тарилиш қануни мону 56-жәдвәлдә көрситилгән:

56-жәдвәл

X	3	4	7	9	18
P	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ мәналирини тепиңлар:

- A. $M(X) = 6,7$, $D(X) = 6,61$, $\sigma(X) \approx 2,57$;
B. $M(X) = 6$, $D(X) = 5$, $\sigma(X) \approx \sqrt{5}$;
C. $M(X) = 6,61$, $D(X) = 6,7$, $\sigma(X) = 2,57$;
D. $M(X) = 6$, $D(X) = 4$, $\sigma(X) = 2$.

7. X вә Y тәсәдипи миқдарлириниң тарилиш қануни 57-, 58-жәдвәлләрда берилгән:

57-жәдвәл

X	1	3	5	7	9
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

58-жәдвәл

Y	3	5	8	12	15
P	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1

Көрситилгән санлиқ тәриплимиләрни тепиңлар: 1) $M(3X - 4Y)$;
2) $D(2X + 3Y)$.

- A. 7,5; 60,59; C. 7,5; 139,33; B. 2,3; 60,59; D. 2,3; 139,33.

8. Биринчи мәргәнниң нишанни бир қетим атқанда төккүзүш еһтималлиғи 0,9. Иккинчи мәргәнниң дәл мошундақ әһвалдики еһтималлиғи 0,95. X тәсәдипи миқдари — нишанға дәл төккүзүш сани. Мошу тәсәдипи миқдарниң тарилиш қанунини тепиңлар (59—62-жәдвәлләр):

59-жәдвәл

A.

X	0	1	2
P	0,14	0,855	0,005

60-жәдвәл

B.

X	0	1	2
P	0,14	0,005	0,855

61-жәдвәл

C.

X	0	1	2
P	0,855	0,14	0,005

62-жәдвәл

D.

X	0	1	2
P	0,005	0,14	0,855

9. Емтихан билетлири үч соалдин туриду. Оқуғучиниң һәр қандақ соалға жавап бериш еһтималлиғи 0,8. Тәсадиғи миқдар X — оқуғучи жавап берәләйдиған соаллар сани. Тәсадиғи миқдарниң тарилиш қанунини ениқлаңлар (63—66-жәдвәлләр):

63-жәдвәл

A.

X	0	1	2	3
P	0,008	0,096	0,384	0,512

64-жәдвәл

B.

X	0	1	2	3
P	0,512	0,096	0,384	0,008

65-жәдвәл

C.

X	0	1	2	3
P	0,096	0,384	0,008	0,512

66-жәдвәл

D.

X	0	1	2	3
P	0,384	0,008	0,512	0,096

Математикилик саватлиқ бойичә тапшуруқлар

10. Сетип алғучида 20 000 тг бар. Сетилиш акциясигичә мошу ахчиға у бирдәк товар алди. Әнди йеникчилик вақтида төрт бирдәк товар алди. Акция вақтида товарниң баһаси қанчә пайизға төвөнлигән?
A. 20%; B. 30%; C. 25%; D. 50%; E. 75%.
11. $(111; 123]$ арилиғида тегишлик 3 кө һәссилик болидиған қанчә натурал сан бар?
A. 3; B. 4; C. 6; D. 5; E. 7.
12. 9; 1; 0; 8 цифрлиридин қураштурулған әң чоң төрт ханилик сан билән әң кичик төрт ханилик санның айримисидин 1279 ға артуқ санны тепиңлар.
A. 9000; B. 9090; C. 10 000; D. 9990; E. 9900.
13. Жәндәш ишлирини ясаш үчүн рәңлик қәғәз елиш керәк. Үч дуканда рәңлик қәғәзниң баһаси һәртүрлүк, бирақ һәрқайсисида йеникчиликләр бар (67-жәдвәл).

67-жәдвәл

	Товарниң баһаси (бир орам)	Йеникчилик (%)
Биринчи дукан	8600 тг	10%
Иккинчи дукан	7000 тг	5%
Үчинчи дукан	8000 тг	15%

Һәқиқий нәтижини көрситиңлар:

- A. Үчинчи дукандики бир орамниң баһаси башқа дуканлардики бир орамниң баһасидин артуқ;
B. Үчинчи дукандики бир орамниң баһаси башқа дуканлардики бир орамниң баһасидин кам;
C. Йеникчиликни һесапқа елип, рәңлик қәғәзни биринчи дукандин алған пайдилиқ;
D. Иккинчи дукандики икки орамниң нәрқи үчинчи дукандики икки орамниң нәрқидин артуқ;
E. Иккинчи дукандики икки орамниң нәрқи қалған икки дукандики бир орамниң баһалириниң қошундисидин кам.

10-СИНІПТИКИ АЛГЕБРА ВӘ АНАЛИЗ БАШЛАНМИЛИРИ КУРСИНИ ТӘКРАРЛАШҚА БЕҒИШЛАНҒАН КӨНҮКМИЛӘР

I. Һесаплашлар

- Берилгән чекитләрдики $y = f(x)$ функциясиниң мәнасини тепиңлар:
 - $f(x) = 0,5x - 4,9$, $x = 0; 2; 9$;
 - $f(x) = x - x^2$, $x = \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; 7$;
 - $f(x) = x^2 + 2$, $x = 1; -1; -3$;
 - $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 5}$, $x = -4; -6; 0$.
- $f(x) = \sin 3x - x$;
 - $f(x) = 5 \operatorname{tg} x - 5\sqrt{3}$;
 - $f(x) = \cos 2x - \sin x$;
 - $f(x) = \frac{x}{\cos x}$ функциялири берилгән.
 $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$, $f(-\pi)$ мәналирини тепиңлар.
- Ипадиниң мәнасини тепиңлар:
 - $\arccos(-1) - 5 \operatorname{arctg} 1 - \arcsin(-1)$;
 - $\arcsin 1 + 6 \operatorname{arctg} 1 - \arccos(-\frac{1}{2})$;
 - $\operatorname{arctg}(-1) - \operatorname{arctg}(-1) - 6 \arccos 0$;
 - $\operatorname{arctg} 1 \cdot \arccos 1 + \operatorname{arctg} \sqrt{3} \cdot \arcsin 0$;
 - $\frac{6}{\pi} \left(\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \operatorname{arctg}(\sqrt{3}) \right)$;
 - $-\frac{6}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \sqrt{3} - \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right)$.
- $x \rightarrow x_0$ өһвалда $y = f(x)$ функциясиниң чекини тепиңлар:
 - $f(x) = x^2 - 1$, $x \rightarrow 1$;
 - $f(x) = \sin^2 x$, $x \rightarrow \frac{3\pi}{2}$;
 - $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 6}{x - 6}$, $x \rightarrow 6$;
 - $f(x) = \frac{x^2 - 9x + 14}{x^2 - 49}$, $x \rightarrow 7$.
- Функция өсүмчисиниң йеқинлашқан мәнасини тепиңлар:
 - $f(x) = x^3 - 5x^2 + 80$, $x_0 = 4$, $\Delta x = 0,001$;
 - $f(x) = \sqrt{2x^2 + 7}$, $x_0 = 3$ вә $\Delta x = 0,1$.
- Квадрат тәрипиниң узунлуғи 5 см. Тәрипиниң узунлуғини 0,01 см-ға узартқан пәйттики мәйдан өсүмчисиниң йеқинлашқан мәнасини тепиңлар.
- Функцияниң һасилатини тепиңлар:
 - $f(x) = x^2 + 0,5x$;
 - $f(x) = -3x^3 + 10x^2$;
 - $f(x) = x + 10\sqrt{x}$;
 - $f(x) = \sin x - \cos x + 5$;
 - $f(x) = \frac{x^3}{x^3 + 1}$;
 - $f(x) = \frac{x^4 - 1}{x^4 + 1}$.

8. Берилгән чекиттики $y = f(x)$ функцияси ҳасилатиниң мәнасини тепиңлар:

а) $f(x) = x^2 - 6x$; $x = 0$;

ә) $f(x) = x \cdot \operatorname{tg} x$; $x = \pi$;

б) $f(x) = \frac{x}{x+1}$; $x = 2$;

в) $f(x) = \frac{x-1}{x}$; $x = -2$.

9. Функцияниң ҳасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{7}x^7 + \cos x$;

ә) $f(x) = \frac{1}{12}x^6 - \sin x$;

б) $f(x) = x^6 \cdot (x^4 - 1)$;

в) $f(x) = x^{11} \cdot (x^7 + 2)$;

г) $f(x) = \frac{2}{x^8} - x^8$;

ғ) $f(x) = \frac{3}{x^3} + \frac{3}{x^5}$.

10. Жисим $s(t) = 3t^2 + 5$ қануни бойичә берилгән. $t = 2$ с вақит мәзгилидики жисимниң илдамлиғини тепиңлар.

11. Һәрикәт $s(t) = 4t^2 - 3$ қануни билән берилгән. $t = 5$ с мәзгилидики жисимниң илдамлиғини тепиңлар.

12. $s(t) = t^2 - 4t + 5$ қануни бойичә һәрикәтлинидиған чекитниң илдамлиғи қайси вақитта нөлгә тәң болиду?

13. а) $s(t) = t^3 - 6t + 8$, $t = 3$; ә) $s(t) = t^3 - 2t^2 + 1$ қануни бойичә һәрикәтлинидиған жисимниң $t = 2$ с мәзгилидики илдамлиғи билән иштиклишини тепиңлар.

14. Мүрәккәп функцияниң ҳасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = (x^3 - 6)^{110}$;

ә) $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 2}$;

б) $f(x) = \sin^5(6x - 1)$;

в) $f(x) = 2 \cos^4\left(\frac{\pi}{3} - x^4\right)$.

15. Әгәр:

а) $f(x) = (x^6 + x)^3 - 15$, $x_0 = 1$; ә) $f(x) = \operatorname{tg}^4\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, $x_0 = 0$;

б) $f(x) = \sin^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos x$, $x_0 = \frac{\pi}{4}$; в) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x^3$, $x_0 = 0$

болса, у чағда $f'(x_0)$ мәнасини ҳесаплаңлар.

16. Дәрижиниң йеқинлашқан мәнасини ҳесаплаңлар:

а) $(1,012)^3$; ә) $(1,005)^{10}$; б) $(0,975)^4$; в) $(3,027)^4$.

17. Томурниң йеқинлашқан мәнасини ҳесаплаңлар:

а) $\sqrt{1,006}$; ә) $\sqrt{24,84}$; б) $\sqrt{99,5}$; в) $\sqrt{1,3}$.

18. Берилгән арилиқтики функцияниң әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар:

а) $f(x) = x - x^2$, $[1; 2]$; ә) $f(x) = x^2 + x + 1$, $[0; 1]$;

б) $f(x) = x^3 - 3x + 7$, $[-3; 1]$; в) $f(x) = 3x^3 - x + 1$, $[-2; 3]$.

19. Қашасиниң узунлуғи 50 м-ға тәң тик төртбулуңлуқ йәр тилиминиң әң чоң мәйданини тепиңлар.

35. а) $\cos^2 x + \frac{1}{2} > \sin^2 x$;

ә) $4 \sin 2x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \leq 0$.

36. а) $\frac{1}{\operatorname{ctg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)} \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$;

ә) $\frac{1}{\operatorname{tg} x - \frac{\pi}{3}} \leq -1$.

Тәңсизликлер системисини йешиңлар (37-38):

37. а) $\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \cos x \leq 0; \end{cases}$

ә) $\begin{cases} 2 \sin x \leq 0, \\ 3 \cos x > 0. \end{cases}$

38. а) $\begin{cases} \operatorname{tg} x < 0, \\ \operatorname{ctg} x < 0; \end{cases}$

ә) $\begin{cases} \operatorname{tg} x > 0, \\ \sin x \geq 0. \end{cases}$

39. $f'(x) < g'(x)$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = -x^2 + x$, $g(x) = x - 10$;

ә) $f(x) = x^3 - x^2$, $g(x) = 3x - x^2$;

б) $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -x$;

в) $f(x) = \frac{x^3 + 2}{x}$, $g(x) = 6x + \frac{2}{x}$.

40. $f'(x) \geq 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = x^2 - 1$;

ә) $f(x) = x + 2x^2$;

б) $f(x) = 3x + x^3$;

в) $f(x) = 6 + x^3$.

41. $f'(x) \leq 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x$;

ә) $f(x) = x^3 - 5,5x^2 - 20x$;

б) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 15$;

в) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 20$.

42. $f'(x) > 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = -\cos(2x - 1) - x$;

ә) $f(x) = -\sin(x + 1) + 0,5x$;

б) $f(x) = 2\sin x - \sqrt{3}x$;

в) $f(x) = \frac{1}{4}\cos 8x + \sqrt{2}x$.

IV. Функция

43. Функцияниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

а) $y = \sqrt{4-x}$;

ә) $y = \sin x + \sqrt{x}$;

б) $y = \frac{x+1}{x^2-4}$;

в) $y = \frac{x+2}{x^2-5x+6}$.

44. Функцияниң мәналар жиғиндисини тепиңлар:

а) $y = x^2 + 2x - 10$;

ә) $y = \frac{1}{x-40}$;

б) $y = 8\cos x$;

в) $y = 3 + 2\sin x$.

45. $y = x^2$ функциясиниң $[0; 3]$ кесиндисидики графиги берилгән. Әгәр функция: а) жүп; ә) тағ; б) тағму әмәс, жүпму әмәс болса, у чағда графикни давамлаштуруп селиңлар.

46. Функцияниң жүп яки тағ екәнлигини ениқлаңлар:

а) $f(x) = x^5 - x^{21}$;

ә) $f(x) = \sin x - \sin 3x$;

$$\text{б)} f(x) = x^2 + \cos^3 x;$$

$$\text{в)} f(x) = \sin^4 x - x;$$

$$\text{г)} f(x) = \frac{x}{\cos x} + \operatorname{tg} x;$$

$$\text{ғ)} f(x) = \operatorname{tg}^2 x + \frac{x^3}{\sin x}.$$

47. Периоди 3 кө тәң болидыған $y = f(x)$ периодлық функциясының $[0; 3]$ арилиғидики графигиниң бөлигини селип, уни $[-3; 9]$ арилиғида давамлаштуруңлар.

48. Функцияның периодини тепиңлар:

$$\text{а)} y = 3\cos 3x;$$

$$\text{ә)} y = 2 \sin \frac{1}{x};$$

$$\text{б)} y = -4\operatorname{tg}(x + 2);$$

$$\text{в)} y = \operatorname{ctg}(3 - 2x).$$

49. Сан түзидә үзүлүшсиз вә:

а) $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$ арилиқлирида өскүчи, $[-1; 3]$ арилиғида кемигүчи вә $f(-1) = 4$, $f(3) = -2$;

ә) $(-\infty; 2] \cup [4; +\infty)$ арилиқлирида кемигүчи, $[2; 4]$ арилиғида өскүчи вә $f(2) = -1$, $f(4) = 3$;

б) $(-\infty; -5] \cup [3; 6]$ арилиқлирида өскүчи, $[-5; 3] \cup [6; +\infty)$ арилиғида кемигүчи вә $f(-5) = 0$, $f(3) = -3$, $f(6) = 2$;

в) $(-\infty; -4] \cup [0; 2]$ арилиқлирида кемигүчи, $[-4; 0] \cup [2; +\infty)$ арилиғида өскүчи вә $f(-4) = -2$, $f(0) = 2$, $f(2) = -5$ болидыған $y = f(x)$ функциясының графигини селиңлар.

50. Аддий түрлөндүрүшни қоллинип, функцияның графигини селиңлар:

$$\text{а)} y = x^2 - 2x + 5;$$

$$\text{ә)} y = x^2 + 4;$$

$$\text{б)} y = 2 - \frac{1}{x};$$

$$\text{в)} y = 1 + \frac{2}{x-3};$$

$$\text{г)} y = 2\sin x;$$

$$\text{ғ)} y = 2 + \cos x;$$

$$\text{д)} y = 1 + 3\sin 2x;$$

$$\text{е)} y = 3\cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right);$$

$$\text{ж)} y = \operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 2;$$

$$\text{з)} y = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{6} + x\right) - 1.$$

51. Көрситилгән арилиқта берилгән функция үчүн әкси функцияни йезип, униң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

$$\text{а)} f(x) = 2x + 3, x \in R;$$

$$\text{ә)} f(x) = (x - 1)^2, x \in [0; +\infty);$$

$$\text{б)} f(x) = x^2 - 1, x \in [0; +\infty).$$

52. Функцияның үзүлүш чекитлирини тепиңлар:

$$\text{а)} f(x) = \frac{1}{x+1};$$

$$\text{ә)} f(x) = \frac{x-1}{x^2-4};$$

$$\text{б)} f(x) = \frac{x+1}{x^2-9};$$

$$\text{в)} f(x) = \frac{x-3}{x(x+1)(x^2-25)};$$

$$\text{г)} f(x) = \frac{x-1}{\cos x};$$

$$\text{ғ)} f(x) = \frac{3}{\sin x}.$$

53. $g(x) = x^3 + 1$; $\phi(x) = \sqrt{x}$; $u(x) = \frac{2}{x}$. Мурәккәп функцияләрни қураштуруңлар.

54. Абсциссиси x_0 болидиган чекиттө $y = f(x)$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгөн яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:
- а) $y = x^2 - 3x + 4, x_0 = 1$; ө) $y = 4 - x^2, x_0 = -1$;
 б) $y = x^3 + 2x - 1, x_0 = 0$; в) $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1, x_0 = 3$.
55. $y = x^2 - 3x + 5$ функцияси графигиниң $M(2; 3)$ чекитидин өтидиган яндашма абсцисса оқи билән қандақ булуң ясайду? Мошу яндашминиң тәңлимисини йезиңлар.
56. $y(x) = x^2 - 2x + 3$ параболисиниң абсциссиси $x_0 = 2$ болидиган чекиттө жүргүзүлгөн яндашма абсцисса оқи билән қандақ булуң ясайду?
57. Абсциссиси x_0 болидиган чекиттө $y = f(x)$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгөн яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:
- а) $y = \operatorname{ctg} x, x_0 = \frac{\pi}{6}$; ө) $y = \operatorname{tg} x, x_0 = \frac{\pi}{3}$.
58. Функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тепиңлар:
- а) $y = 2x - x^2$; ө) $y = x^2 + 7$;
 б) $y = x^3 - 3x + 10$; в) $y = \frac{1}{3}x^3 - 9x - 11$;
 г) $y = \frac{x}{x+1}$; ғ) $y = \frac{x+1}{x}$;
 д) $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x + 1$; е) $y = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 6x + 2$.
59. Функцияни экстремумға тәкшүрүңлар:
- а) $y = 8 - x^2$; ө) $y = x^3 + 6x$;
 б) $y = x^4 - 2x^2 + 1$; в) $y = 4x - x^4$;
 г) $y = x^3 + x^2 - 8x + 1$; ғ) $y = \frac{4}{3}x^3 + 24x - 3$;
 д) $y = \frac{3x}{x^2 + 1}$; е) $y = 3x - \frac{27}{2 - x^2}$.
60. Функцияни һасилатниң ярдими билән тәкшүрүп, графигини селиңлар:
- а) $y = x^2 - 10x + 9$; ө) $y = x^3 + 9x$;
 б) $y = -x^2 + 4x$; в) $y = 6x^2 - x^3$;
 г) $y = \frac{x}{x+1}$; ғ) $y = \frac{x}{1+x^2}$.

Математикалық саватлық бойичә тапшуруқлар


61. x билән y һәр түрлүк икки сан вә һәрқайсиси z саниға бөлүниду. Һәқиқий нәтижисини көрситиңлар:
- А. $\frac{x-y}{5x}$ ипадиси z саниға бөлүниду;
 В. $\frac{6y}{x+y}$ ипадиси z саниға бөлүниду;

С. $-4x + 3$ ипадиси z саниға бөлүниду;

Д. $-4x + 3x$ ипадиси z саниға бөлүниду;

Е. $\frac{x^3}{y^3}$ ипадиси z саниға бөлүниду;

62. Диаграммида қоллинип, карханиниң бөш күндө тәйярлиған товар-лириниң арифметикилик оттуриси билән еғишишини тепиңлар (65-сүрөт):



65-сүрөт

- А. Арифметикилик оттура – 1208, еғиши – 64;
 В. Арифметикилик оттура – 1206, еғиши – 66;
 С. Арифметикилик оттура – 1206, еғиши – 64;
 Д. Арифметикилик оттура – 1208, еғиши – 70;
 Е. Арифметикилик оттура – 1208, еғиши – 66.

63. Ящиктики шарларниң сани диаграммида берилгән (66-сүрөт).



66-сүрөт

Ящиктики тәсадиби елинған шарниң йешил болмаслиғиниң еһтималлиғини тепиңлар?

- А. $\frac{6}{25}$; В. $\frac{7}{25}$; С. 0,8; Д. $\frac{3}{25}$; Е. 0,5.

64. Мәйрәмгә төрт түрлүк гүлдин 300 данә сетип елинди. Диаграммида гүлләрниң намлири вә бәзи бирлириниң сани пайиз билән берилгән (67-сүрәт). Қанчә роза гүли сетип елинған?



67-сүрәт

65. Диаграммида алтә айда тәйярланған механизмларниң сани көрситилгән (68-сүрәт):



68-сүрәт

А – I чарәктә тәйярланған механизмлар сани, В – II чарәктә тәйярланған механизмлар сани. Нәқиқий нәтижисини көрситиңлар:

- A. $A > B$; B. $A < B$; C. $A - B > 200$;
 D. $A + B < -200$; E. $A - B = 0$.

ГЛОССАРИЙ

<i>a</i> саниниң арккосинуси	<i>a</i> ($ a \leq 1$) саниниң арккосинуси дөп косинуси <i>a</i> -ға тәң $[0; \pi]$ арилиғидики санны ейтиду
<i>a</i> саниниң арккотангенсi	<i>a</i> саниниң арккотангенсi дөп котангенсi <i>a</i> -ға тәң $(0; \pi)$ арилиғидики санны ейтиду
<i>a</i> саниниң арксинуси	<i>a</i> ($ a \leq 1$) саниниң арксинуси дөп синуси <i>a</i> -ға тәң $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ арилиғидики санны ейтиду
<i>a</i> саниниң арктангенсi	<i>a</i> саниниң арктангенсi дөп тангенсi <i>a</i> -ға тәң $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ интервалидики санны ейтиду
Аргументиниң өсүмчиси	$x_2 - x_1$ айримини аргументниң x_1 чекитидики өсүмчиси дөп атайду
Арккосинус	$y = \cos x$ функциясигә өкси функция арккосинус дөп атилиду вә $y = \arccos x$ дөп бөлгүлиниду
Арксинус	$y = \sin x$ функциясигә өкси функция арксинус дөп атилиду вә $y = \arcsin x$ дөп бөлгүлиниду
Арккотангенс	$y = \operatorname{ctg} x$ функциясигә өкси функция арккотангенс дөп атилиду вә $y = \operatorname{arccot} x$ дөп бөлгүлиниду
Арктангенс	$y = \operatorname{tg} x$ функциясигә өкси функция арктангенс дөп атилиду вә $y = \operatorname{arctg} x$ дөп бөлгүлиниду
Һәқиқий вақиә	Тәҗрибә нәтижисидә шөртлик түрдә орунлинидиған вақиә һәқиқий вақиә дөп атилиду
Аркфункцияләр	Тригонометриялик функцияләргә өкси функцияләр өкси тригонометриялик функцияләр яки аркфункцияләр дөп атилиду
Бир хил тригонометриялик тәңлимә	Бир хил тригонометриялик тәңлимиләр дөп һәр бир қошулеучниң дәрижә көрсәткичлири өзара тәң болидиған тәңлимиләрни ейтиду.
Дискретлик (үзүлүшлик) тәсадипи миқдар	Бир биригә охшимаидиған, бөлөк мәнә қобул қилидиған тәсадипи миқдар дискретлик (үзүлүшлик) тәсадипи миқдар дөп атилиду
Дисперсия	X чөтнөшниң иккинчи дәрижисиниң математикилик тәхмини X тәсадипи миқдариниң дисперсияси дөп атилиду вә $D(X) = ((X - M(X))^2)$ формулиси билән һесаплиниду
Дифференциаллаш	Функцияниң һасилатини тепиш әмәлини дифференциаллаш дөп атайду.
Дифференциялинидиған функция	x чекитидә функцияниң һасилати бар болса, y чағда $f(x)$ функциясини мошу чекиттә дифференциаллинидиған функция дөп атайду. Әгәр функция арилиқниң барлиқ чекитлиридә дифференциаллинидиған болса, y чағда мошу арилиқта дифференциаллинидиған функция дөп атайду
Аддий тригонометриялик тәңлимиләр	$\sin x = a$, $\cos x = a$, $\operatorname{tg} x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$ (бу йәрдә a сани һәр қандақ һәқиқий сан) түридә берилгән тригонометриялик тәңлимиләрни аддий тригонометриялик тәңлимиләр дөп атайду

Давами

Төсадипи вақиә	Тәжрибә нәтижисидә орунлинидиған яки орунланмайдиған вақиә <i>тәсадипи вақиә</i> дөп атилиду.
Төсадипи миқдарниң четниши	Төсадипи миқдар билән униң математикилик күтиминиң айримиси, йәни $X - M(X)$ миқдари төсадипи миқдарниң четниши дөп атилиду.
Төсадипи миқдарниң маслишиши	Төсадипи миқдарниң мүмкин мәнәлири билән уларниң еһтималлиқлирини тизип йезиш төсадипи миқдарниң маслишиши дөп атилиду.
Өкси функция	Өгәр $y = f(x)$ функцияси X ениқлиниш даирисидә бир қелипта өскүчи (яки кемигүчи) функция болса, уу чағда мошу функцияниң Y мәнәлар жиғиндисидә ениқланған бир қелипта өскүчи (бир қелипта кемигүчи) функция униң өкси функцияси болиду
Мурөккөп функция	$y = f(u)$ функцияси берилсун. Ениқлиниш даириси U , функция мәнәлириниң жиғиндисидә Y болсун. Өзгәрмә u өз нөвтитдә өзгәрмә x -қа беқинда функция болса, йәни $u = g(x)$, $x \in X$ у чағда $y = f(g(x))$ функцияси X жиғиндисидә ениқланған мурөккөп функция дөп атилиду.
Максимум чекити	a чекитиниң қандақту бир өтрапидики һәрбир $x(x \neq a)$ үчүн $f(x) < f(a)$ тәңсизлиги орунланған әһвалдила a чекити $y = f(x)$ функциясиниң <i>максимум чекити</i> дөп атилиду
Математикилик күтүм	X төсадипи миқдари мәнәлириниң мувапиқ еһтималлиқ мәнәлириға көпәйтиндилириниң қошундисини X төсадипи миқдариниң математикилик тәхмини дөп атайду, йәни $M(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_n \cdot p_n$ сани дискретлиқ төсадипи миқдариниң математикилик тәхмини дөп атилиду
Минимум чекити	a чекитиниң қандақту бир өтрапидики һәрбир $x(x \neq a)$ үчүн $f(x) > f(a)$ тәңсизлиги орунланған әһвалдила a чекити $y = f(x)$ функциясиниң минимум чекити дөп атилиду
Мүмкин әмәс вақиә	Тәжрибә нәтижисидә орунланмайдиған вақиә мүмкин әмәс (ялған) вақиә дөп атилиду
Вақиәләрниң көпәйтиндисидә	A вә B вақиәлириниң көпәйтиндисидә дөп мошу икки вақиәниң қатар орунлинишидин туридиған AB <i>вақиәсини</i> атайду
Вақиәләрниң қошундисидә	A вә B <i>вақиәлириниң</i> $A + B$ <i>қошундисидә</i> дөп A вақиәсиниң яки B вақиәсиниң яки иккиләсиниң орунлинишидин туридиған вақиәни атайду
Оттура квадратлиқ четнәш	Дисперсиядин елиған квадрат томур оттура квадратлиқ четнәш дөп атилиду
Чекиттә үзүлүшсиз функция	Өгәр $f(x)$ функцияси x_0 чекитидә ениқланған вә функцияниң чөклик мәнәси x_0 чекитидики мәнәсиға тәң болса, у чағда функция x_0 <i>чекитидә үзүлүшсиз функция</i> дөп атилиду
Чекитниң өтрапи	Чекит тәәллүқ болидиған һәр қандақ интервал чекитниң өтрапи дөп атилиду

Синусоида	$y = \sin x$ вә $y = \cos x$ функциялириниң графиги синусоида деп атилиду.
Критикилик чекит	Функцияниң һасилати нөлгә тәң яки һасилати болмайдиган ениқлиниш даирисиниң ички чекитлири критикилик чекитләр деп атилиду.
Тангенсоида	$y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң графиги тангенсоида деп атилиду
Тригонометрияликтәңлимә	Бөлгүсизи (өзгәрмиси) тригонометриялик функцияниң аргументи (яки аргументиниң төркивидә) түридә берилгән тәңлимини тригонометриялик тәңлимә деп атайду
Тригонометриялик тәңлимини йешиш	Берилгән тәңлимини дурус тәңмү-тәңликкә айлан-дуридиған аргументиниң мәналирини тепиш тригонометриялик тәңлимини йешиш деп атилиду
Тригонометриялик тәңсизлик	Бөлгүсизи (өзгәрмиси) тригонометриялик функцияниң аргументи түридә берилгән тәңсизликни тригонометриялик тәңсизлик деп атайду
Һасилатниң геометриялик маһийити	Һасилатниң геометриялик маһийити-функцияниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң булуңлуқ коэффициенти
Һасилатниң физикилик маһийити	$y = f(x)$ функциясиниң x чекитидики $f'(x)$ һасилати униң x чекитидики өзгириш илдамлиғини ениқлайду. Бу һасилатниң физикилик маһийити
Үзүлүш чекити	Өгәр мошу шөртләрниң бири орунланмиса, у чағда $f(x)$ функцияси x_0 чекитидә үзүлүшлик болиду. Бу өһвалда x_0 чекити функцияниң үзүлүш чекити деп атилиду
Үзүлүшсиз тәсадиби миқдар	Мәналири үзүлүшсиз бөлгүлүк бир $[a; b]$ кесиндисидә (бу йөрдә $a < b$, a вә b — ихчам һәқиқий санлар) орунлашқан тәсадиби миқдарни үзүлүшсиз тәсадиби миқдар деп атайду
Үзүлүшсиз функция	Өгәр $f(x)$ функциясы X жиғиндисиниң һәр қандақ чекитидә үзүлүшсиз болса, у чағда уни мошу X жиғиндисидә (кесиндисидә) үзүлүшсиз функция деп атайду
Шөртлик өһтималлиқ	A вақиәси орунланғандин кейин ениқланған B вақиәсиниң өһтималлиғини $P_A(B)$ шөртлик өһтималлиқ деп атайду
Функция максимуми	Функцияниң максимум чекитидики мәнаси функцияниң максимуми деп атилиду
Функция минимуми	Функцияниң минимум чекитидики мәнаси функцияниң минимуми деп атилиду
Функцияниң өсүмчиси	Аргумент x -ке Δx өсүмчисини бөргөндә $y = f(x)$ функциясиму өсүмчә қобул қилиду. Бу функцияниң өсүмчиси Δy деп бөлгүлинип, $\Delta y = (y + \Delta y) - y$ яки $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ тәңлиги билән ениқлиниду

Давами

Функцияның hasилати	$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ ипадисиниң аргумент өсүмчиси $\Delta x \rightarrow 0$ интилғандики чеки бар болса, учағда бу чөкни $y = f(x)$ функциясиниң x чекитидики hasилати дөп атайду
Функцияның чеки	Алдин ала берилгөн $\varepsilon > 0$ сани үчүн $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ сани тепилип, өзгөрмө x -ниң $ x - a < \delta$ төңсизлигини қанаөтлөндүридиған барлық мөналири үчүн $ f(x) - b < \varepsilon$ төңсизлиги орунланса, у чағда b сани $f(x)$ функциясиниң x аргументи a саниға интилғандики (a чекитидики) чеки дөп атилиду
Функцияның экстремум чекитлири	Максимум вө минимум чекитлири функцияның экстремум чекитлири дөп атилиду
Экстремум	Максимум вө минимум чекитлири функцияның экстремум чекитлири, экстремум чекитидики функцияның мөнаси болса функцияның экстремуми дөп атилиду

ЖАВАПЛИРИ

7—9-СИНІПЛАРДИКИ АЛГЕБРА КУРСИНИ ТӘКРАРЛАШҚА БЕҒИШЛАНҒАН КӨНҮКМИЛӘР

1. а) -3 ; ә) 9 ; б) $\frac{2b}{3b+9}$; в) $\frac{a}{2-a}$; г) 2 ; ґ) 9 . 2. а) $0,5$; ә) $8,25$; б) ± 1 ; в) $\pm \sqrt{5}$; г) 7 ; -2 ; ґ) 2 ; 3; д) 2 ; $\frac{2}{3}$; е) 1 ; $-\frac{3}{8}$. 3. а) $2,6$; ә) 0 ; -8 ; б) $-2,5$; в) 4 ; г) 1 ; -6 ; ґ) $0,5$; д) 0 . 4. а) $(5; 2), (-14; 21)$; ә) $(1; 3), (-0,75; -0,5)$; б) $(4; 3), (-9; -\frac{4}{3})$; в) $(5; 0,5), (-7,5; -\frac{1}{3})$. 6. а) $(-\infty; 3] \cup [4; +\infty)$; ә) $(-8; 2)$; б) $[2; 5]$; в) $(-\infty; -\frac{5}{7}) \cup (1; +\infty)$. 7. а) $(-9; 0] \cup [4; +\infty)$; ә) $[0; 2] \cup (6; +\infty)$; б) $(-\infty; -7) \cup (0; 3)$; в) 4 ; $(-4; 0) \cup (5; +\infty)$. 8. а) 0 ; ә) -3 ; б) -6 ; в) 2 . 9. а) 5 ; ә) -3 ; б) 8 ; в) -2 . 10. а) $[5; 8)$; ә) $(-\infty; -6]$; б) $[1; 2] \cup [3; 4]$; в) $[-3; 3]$. 14. а) $d = 0,8$; $a_9 = 9,6$; $S_{10} = 68$; ә) $a_7 = 37,6$; $S_{10} = 724$; б) $a_1 = 10$; $d = 5$; в) $a_1 = -60$. 15. а) $q = 2$; $b_7 = 96$; $S_8 = 382,5$; ә) $b_5 = 54$; $S_6 = -121\frac{1}{3}$; б) $a_1 = 64$; $q = 0,5$; в) $b_1 = 27$. 18. а) $2\sin 4\alpha$; г) $-2\cos \alpha$.

1-бап. ФУНКЦИЯ, УНИҢ ХУСУСИЙӘТЛИРИ ВӘ ГРАФИГИ

- 1.1. а) 5 ; $15,5$; 21 ; ә) $2\frac{5}{6}$; 0 ; $\frac{1}{3}$; б) 7 ; $4,5$; 0 ; в) 2 ; 1 ; $\frac{10}{9}$. 1.2. ә) -2 ; -2 ; 1 ; в) $\frac{1}{4}$; 4 ; 1. 1.3. а) $D(g) = R$; ә) $D(g) = R$; б) $(-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; +\infty)$; в) $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$. 1.8. ә) 3 ; $\sqrt{3}$; 3 ; в) $g(x_1) = \frac{2}{t^2} + 3t$; $g(x_2) = \frac{t^3 + 12}{2t}$. 1.9. а) $[3; +\infty)$; ә) $(-\infty; 1] \cup [2,5; +\infty)$; в) $(-\infty; -1,5) \cup (-1,5; 0) \cup (0; 1,5) \cup (1,5; +\infty)$. 1.10. а) $D(f) = R$; $E(f) = [0; +\infty)$; ә) $D(f) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$; $E(f) = (-\infty; -5) \cup (-5; +\infty)$; б) $D(f) = R$; $E(f) = [-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}]$; в) $D(f) = R$; $E(f) = [-5; 5]$. 1.11. а) -18 ; ә) $-12,5$; б) $\frac{10}{17}$; в) $\frac{25 + 8a - 6a^3}{a}$. 2.3. а) Парабола; ә) гиперболола; б) кубтық парабола; в) түзу. 2.9. а) Бир; ә) бир. 3.6. а) Жүп; ә) жүп; б) жүп; в) жүп му, тағ му өмөс. 3.7. а) $\frac{4\pi}{5}$; ә) $\frac{\pi}{3}$; б) $\frac{\pi}{5}$; в) 2π . 3.9. а) $(-\infty; 1]$ — өсиду; $[1; +\infty)$ — кемийду, $x = 1$ — максимум чекити, $(0; 2) — f(x) > 0$, $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty) — f(x) < 0$; ә) $(-\infty; -2) \cup (-2; +\infty) —$ кемийду, экстремум чекити йок, $(-\infty; -2) \cup (-\frac{5}{3}; +\infty) — f(x) < 0$, $(-2; -\frac{5}{3}) — f(x) > 0$. 4.1. а) $y = \frac{x-2}{7}$; ә) $y = \frac{3x}{2}$; б) $y = 5 - x$.

2-бап. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛӘР

- 5.1. а) Тағ; ә) тағ; б) жүп; в) жүп. 5.6. а) $\frac{2\pi}{7}$; ә) $1,5\pi$; б) 12π ; в) $0,125\pi$. 6.2. а) $-\frac{\pi}{2}$; ә) $-\frac{5\pi}{4}$; б) $-\frac{\pi}{3}$; в) $\frac{5\pi}{6}$. 6.4. а) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; ә) $\sqrt{3}$; б) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; в) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 6.6. а) $0,5$; б) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; в) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 6.7. а) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; ә) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; б) 0 ; в) 1 . 6.10. а) $\frac{\sqrt{3}}{6}$; ә) $-\frac{1}{3}$; б) $\frac{2-\sqrt{2}}{10}$; в) $-\frac{6+\sqrt{3}}{4}$.

3-бап. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘР БИЛӘН ТӘҢСИЗЛИКЛӘР

- 7.3. а) $3\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; ә) $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. 7.4. б) $(-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{18} + \frac{\pi k}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$; в) $\pm \frac{2\pi}{3} + 4k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 7.5. а) $\frac{3\pi}{2}$. 7.7. а) $\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2}k$, $k \in \mathbb{Z}$; б) $(-1)^k \cdot \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2}k$, $k \in \mathbb{Z}$.

7.8. а) $-\frac{3\pi}{4} + 6\pi k, k \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{4}, k \in \mathbb{Z}$. 7.9. а) $-3 - \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{4}{3} + \frac{3\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{4}{3} + \frac{2\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z}$. 7.11. а) $\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{\pi}{10} + \frac{\pi k}{5}, k \in \mathbb{Z}$; 7.12. а) $\frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{\pi}{22} + \frac{\pi n}{11}, n \in \mathbb{Z}$. 8.2. а) $\pm(\pi - \arccos \frac{1}{3}) + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; б) $(-1)^{n+1} \frac{\pi}{6} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$; в) $\frac{\pi}{2} + 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$; г) $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; д) $\pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$. 8.3. а) $\frac{\pi}{4} + n\pi, \operatorname{arctg} 3 + k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{\pi}{4} + n\pi; \operatorname{arctg} 4 + k\pi; k, n \in \mathbb{Z}$; в) $\frac{\pi}{4} + n\pi; -\frac{\pi}{4} + k\pi; k, n \in \mathbb{Z}$; г) $\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$; д) $\frac{5\pi}{6} + n\pi; n \in \mathbb{Z}$. 8.4. а) $\frac{\pi}{8} + \frac{n\pi}{4}, \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}, k, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{k\pi}{3}; \frac{\pi}{8} + \frac{n\pi}{4}, k, n \in \mathbb{Z}$; в) $\frac{n\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$; г) $\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$; д) $k\pi, k \in \mathbb{Z}$; е) $-\operatorname{arctg} 2 + n\pi, n \in \mathbb{Z}$. 8.5. а) $\operatorname{arctg} \frac{2}{3} + n\pi, -\frac{\pi}{4} + k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$. 8.7. а) $2k\pi, \pm \left(\pi - \arccos \frac{1}{5} \right) + 2n\pi, k, n \in \mathbb{Z}$; б) $(-1)^n \frac{\pi}{6} + n\pi; (-1)^k \arcsin \frac{1}{3} + k\pi; k, n \in \mathbb{Z}$. 8.8. а) $\operatorname{arctg} 3 + n\pi, -\frac{k}{4} + k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$. 8.9. а) $n\pi; -\frac{\pi}{4} + k\pi; k, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{\pi}{2} + n\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$. 8.10. а) $\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}; n\pi, n \in \mathbb{Z}$; б) $\operatorname{arctg}(3 \pm 2\sqrt{2}) + n\pi, n \in \mathbb{Z}$. 8.11. а) $-\frac{n}{4} + n\pi, \operatorname{arctg} 2 + k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{k}{4} + n\pi, -\operatorname{arctg} \frac{1}{7} + k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$. 8.13. а) $\frac{n}{8} + \frac{n\pi}{2}, \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \frac{k\pi}{2}; k, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{n}{8} + \frac{n\pi}{2}, \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{4}{3} + \frac{k\pi}{2}, k, n \in \mathbb{Z}$. 8.14. а) $3 \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + 3n\pi, 3 \operatorname{arctg} 2 + 3k\pi, k, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{n}{12} + \frac{n\pi}{3}, \frac{1}{3} \operatorname{arctg} 2 + \frac{k\pi}{3}, k, n \in \mathbb{Z}$. 9.2. б) $\left[-\frac{\pi}{6} + n\pi; \frac{\pi}{2} + n\pi \right), n \in \mathbb{Z}$.

4-бап. ЕНТИМАЛЛИК

11.1. 0,9. 11.2. 0,25. 11.3. 0,3. 11.4. $\approx 0,72$. 11.5. а) 0,72; б) 0,98. 11.6. $\approx 0,0278$. 11.7. $\approx 0,6$. 11.9. $\approx 0,2545$.

5-бап. НАСИЛАТ

12.1. б) -6; в) $\frac{1}{4}$. 12.3. а) Функция үзүлүшсиз болмайду; б) функция үзүлүшсиз болмайду. 12.6. а) -2; б) -4; в) 27; г) $\frac{1}{8}$; д) $-\frac{4}{3}$; е) $\frac{8}{11}$; ж) $\frac{1}{4}$; з) $\frac{8}{5}$. 13.2. а) 1,14. 13.4. а) -2; б) 2. 13.6. а) $\frac{\pi}{12}$; б) $\sqrt{3} - 1$. 13.7. а) 0,1; б) 0,1. 14.1. а) $x^2 + 4x$; б) $32x^7 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$; в) $x^2 + 8x^3$; г) $24x^5 + 35x^4$; д) $-\frac{2}{3}x + 3$; е) $x^3 + 1$; ж) $\frac{1}{\sqrt{x}}$; з) $-10x + 1$. 14.2. а) $-\frac{1}{4}$; б) $\frac{2}{3}$. 14.3. а) 5; б) -1; в) -1. 14.4. а) $\left(\frac{7}{36}; +\infty \right)$; б) $(5; +\infty)$. в) $\left(-\infty; \frac{3}{2} \right)$. 14.5. а) $\frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}$; б) $\frac{6 - 4x - x^2}{(x + 2)^2}$. 14.6. а) -2x; б) $\frac{3}{x^4}$; в) $\frac{2x(1 - x^4)}{(x^4 + 1)^2}$. 14.9. а) -1; б) 2. 14.10. а) $(-\infty; -1) \cup (0; +\infty)$; б) $(-1; 3)$. 15.1. а) $v = 36$ м/с; $a = 30$ м/с²; б) 6 м/с; 15.2. а) 0. 15.3. а) $y = -8x - 6$; б) $y = 6x - 2$; в) $y = 10x - 5$. 15.6. а) $\operatorname{arctg} 1,5$; б) $\operatorname{arctg} 2$. 15.7. а) $y = -2x + 4$; б) $y = 17x - 17$. 15.8. а) $y = 2$; б) $y = 0$; в) $y = -1$. 15.9. (0,5; -1). 16.1. а) $f(x) = x^2$; $g(x) = 2x - 1$; б) $g(x) = 3x + 2$; $f(x) = \sqrt{x}$; в) $g(x) = x - \frac{\pi}{6}$; $f(x) = \sin x$; г) $g(x) = 4x$; $f(x) = \operatorname{tg} x$. 16.2. а) $y = f(g(x)) = \cos 2x$; $y = g(f(x)) = 2 \cos x$; б) $y = f(g(x)) = (3x + 1)^3$; $y = g(f(x)) = 3x^3 + 1$; в) $y = f(g(x)) = \sin(4x - 1)$; $y = g(f(x)) = 4 \sin x - 1$; г) $y = f(g(x)) = \sqrt{\frac{2}{x+1}}$; $y = g(f(x)) = \frac{2}{\sqrt{x+1}}$. 16.5. а) $y = f(g(x)) = \sin\left(\frac{2}{x^3 - 1}\right)$; $y = f(g(x)) = \frac{2}{\sin^3 x - 1}$; б) $y = f(g(x)) = 3 \operatorname{tg}^3 x + 2 \operatorname{tg}^2 x$; $y = g(f(x)) = \operatorname{tg}(3x^3 + 2x^2)$. 16.7. а) $-\frac{6}{x^3} \left(4 + \frac{1}{x^2} \right)^2$; б) $\frac{8}{x^2} \left(5 - \frac{4}{x} \right)$. 17.1. а) $3 \cos x - 2 \sin x$; б) $-\frac{1}{\sin^2 x}$; в) $\frac{2}{\cos^2 x} + \cos x$; г) $-2 \sin x - \frac{2}{\cos^2 x}$. 17.2. а) $2 + \frac{2}{\cos^2 x}$; б) $4 \operatorname{ctg} x - \frac{4x}{\sin^2 x}$. 17.3. а) $-2 \sin 2x + 2 \cos 2x$; б) $3 - 4 \sin 4x$; в) $3x^2 - 4 \cos 2x$.

- 17.4. а) $\frac{3}{\sin^2 x} - 12x^2$; ә) $2\cos 2x + \frac{1}{\cos^2 x}$; б) $\frac{1}{4\cos^2 x}$. 17.5. а) $-\frac{1}{2}$; ә) 4; б) $\frac{1}{3}$; в) 0.
 17.6. а) $\frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$; ә) $\frac{\pi n}{4}, n \in \mathbb{Z}$. 17.7. ә) $y = 2x + 1 - \frac{\pi}{2}$. 17.8. а) $\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$; ә) $\frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$. 17.9. а) $-\sin 2x + \sin x$; ә) $\cos x + \frac{2}{\cos^2 x}$; б) $-\sin x - \cos x$; в) $4\sin x + (4x - 1)\cos x$. 17.10. а) $-\sin 2x$; ә) $6\sin 4x + 2$; б) $4\cos 2x(\sin 2x + 1)$; в) $6(\cos 2x + \sin 2x)^2 \cdot (-\sin 2x + \cos 2x)$. 17.12. а) $(-1)^{n+1} \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. 17.15. ә) $\frac{4}{3}$. 18.2. ә) $\approx 0,936$; ж) $\approx 2,002$. 18.4. ә) $\approx 1,33$. 18.5. б) $\approx 4,04$.

6-бап. НАСИЛАТНИҢ ҚОЛЛИНИЛИШИ

- 19.3. а) $(-\infty; +\infty)$ — өсиду; ә) $(-\infty; -\frac{3}{2}]$ — кемийду, $[-\frac{3}{2}; +\infty)$ — өсиду; б) $(-\infty; \frac{1}{4}]$ — кемийду, $[\frac{1}{4}; +\infty)$ — өсиду; в) $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$ — кемийиш арилиғи. 19.6. а) $(-\infty; +\infty)$ — өсиду; ә) $(-\infty; \frac{3}{10}]$ — кемийду, $[\frac{3}{10}; +\infty)$ — өсиду; б) $(-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$ — өсиду, $[-2; 1]$ — кемийду; в) $(-\infty; \frac{1}{3}] \cup [\frac{1}{3}; +\infty)$ — өсиду, $[-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}]$ — кемийду. 19.8. а) $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$ — өсу аралығы, $[-1; 1]$ — кему аралығы; ә) $(-\infty; -\frac{2\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{2\sqrt{3}}{3}; +\infty)$ — өсиду, $[-\frac{2\sqrt{3}}{3}; \frac{2\sqrt{3}}{3}]$ — кемийду; б) $(-\infty; +\infty)$ — өсиду. 19.10. $a = 0$ болғанда. 20.2. а) $x = 0$ — минимум чекити; ә) $x = 0$ — минимум чекити. б) $x = \frac{3}{2}$ — максимум чекити; в) $x = \frac{4}{5}$ — минимум чекити. 20.3. а) $x = 2$ — минимум чекити; ә) $x = -1$ — минимум чекити. 20.6. а) $x = -\frac{1}{3}$ — минимум чекити, $x = \frac{1}{3}$ — максимум чекити; ә) $x = 1$ — минимум чекити; г) $x = -\frac{2}{3}$ — максимум чекити, $x = 0$ — минимум чекити; ғ) $x = -1$ — минимум чекити. 20.10. а) Бир; ә) бир. 20.11. а) $-2; -\frac{1}{2}; 1$; ә) $-1; \frac{1}{2}; 2$. 21.2. а) $(-\infty; 1]$ — өсу аралығы, $[1; +\infty)$ — кемийиш арилиғи, $\max y = y(1) = 0,5$; ә) $(-\infty; \frac{1}{4}]$ — кемийиш арилиғи, $[\frac{1}{4}; +\infty)$ — өсуш арилиғи, $\min y = y(\frac{1}{4}) = 2\frac{7}{8}$; в) $(-\infty; \frac{5}{4}]$ — кемийиш арилиғи, $[\frac{5}{4}; +\infty)$ — кемийиш арилиғи, $\max y = y(\frac{5}{4}) = 1\frac{1}{8}$. 22.1. а) $-1; -5$; ә) 11; 2. 22.2. а) 24; -6 ; ә) 3; -3 . 22.3. ә) 4; 0. 22.5. а) 8; 8, ә) 1; 100. 22.6. а) $\frac{23}{3}$; 3; ә) 10; 1. 22.11. а) 50; 25; ә) 2; 16; 22.14. а) 20 м; 20 м; ә) 4 м; 8 м.

7-бап. ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАР ВӘ УЛАРНИҢ САНЛИҚ ТӘРИПЛИМИЛИРИ

68-жәдвәл

23.6.	X	500	100	50	0
	P	0,01	0,1	0,5	0,39

69-жәдвәл

23.8	X	0	1	2
	P	0,02	0,26	0,72

- 24.1. $M(X) = 7$. 24.2. $D(X) = 18,01$. 24.3. $\sigma(X) = 2,64$. 24.9. $M(X+Y) = 22,2$; $D(X+Y) = 44,76$.

**10-СИНІПТИКИ АЛГЕБРА ВӘ АНАЛИЗ БАШЛАНМИЛИРИ
КУРСИНИ ТӘКРАРЛАШҚА БЕҒИШЛАНҒАН КӨНҮКМИЛӘР**

1. а) $-4,9$; $-3,9$; $-0,4$; ә) $\frac{1}{4}$; $-\frac{3}{4}$; -42 ; б) 3 ; 3 ; 11 ; в) 15 ; -35 ; $-\frac{1}{5}$. 2. а) 0 ; $-\frac{\pi}{3}$; π ; ә) $-5\sqrt{3}$; 0 ; $-5\sqrt{3}$; б) 1 ; $-\frac{1+\sqrt{3}}{2}$; 1 ; в) 0 ; $\frac{2\pi}{3}$; π . 3. а) $\frac{\pi}{4}$; ә) $\frac{5\pi}{3}$; б) -4π ; в) 0 ; г) 5 . 4. а) 0 ; ә) 1 ; б) 5 ; в) $\frac{5}{14}$. 6. $\approx 0,1 \text{ см}^2$. 7. а) $2x + 0,5$; ә) $-9x^2 + 20x$; б) $1 + \frac{6}{\sqrt{x}}$; в) $\cos x + \sin x$; г) $\frac{3x^2}{(x^3+1)^3}$; д) $\frac{8x^3}{(x^4+1)^2}$. 8. а) -6 ; ә) π ; б) $\frac{1}{9}$; в) $\frac{1}{4}$. 9. а) $x^6 - \sin x$; ә) $\frac{1}{2}x^5 - \cos x$; б) $10x^9 - 6x^5$; в) $18x^{17} + 22x^{10}$; г) $-\frac{16}{x^9} - 8x^7$; д) $-\frac{9}{x^4} - \frac{15}{x^6}$. 10. 12. 11. 40. 12. $t = 2$. 13. а) 21 ; 18 ; ә) 4 ; 8 . 14. а) $330x^2(x^3-6)^{109}$; ә) $\frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+2}}$; б) $30\cos(6x-1) \cdot \sin^4(6x-1)$; в) $32x^3\cos^3\left(\frac{\pi}{3}-x^4\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}-x^4\right)$. 15. а) 84 ; ә) $-48\sqrt{3}$; б) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; в) 0 . 16. а) $\approx 1,036$; ә) $\approx 1,05$; б) $\approx 0,9$; в) $\approx 83,9$; 17. а) $\approx 1,003$; ә) $\approx 4,984$; б) $\approx 9,975$; в) $\approx 1,15$. 18. а) -2 ; 0 ; ә) 1 ; 3 ; б) -11 ; 9. 19. $156,25 \text{ м}^2$. 20. 80 м . 21. $2,5$ вә $2,5$. 22. 6 см . 23. а) $\frac{\pi}{10} + \frac{\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}$; $\pi n, n \in \mathbb{Z}$; ә) $\frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$; $\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; в) $-\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. 24. а) $\frac{\pi n}{4}, n \in \mathbb{Z}$; ә) $\pi k; k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{\pi k}{4}, k \in \mathbb{Z}; \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. 25. а) $\frac{\pi}{4} + \pi n, \arctg 2 + \pi k, k, n \in \mathbb{Z}$; ә) $\frac{\pi}{2} + \pi k, (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, k, n \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi n; \pm \arccos \frac{2}{3} + 2\pi k, k, n \in \mathbb{Z}$; в) $\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \arctg \frac{1}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. 26. а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; ә) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{6} + \pi k, k, n \in \mathbb{Z}$; в) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. 27. а) $\frac{\pi}{4} + \pi n, \arctg \frac{1}{3} + \pi k, k, n \in \mathbb{Z}$; ә) $\frac{\pi}{3} + \pi n, -\frac{\pi}{6} + \pi k, k, n \in \mathbb{Z}$; б) $\arctg 1,5 + \pi n; \frac{\pi}{4} + \pi k, k, n \in \mathbb{Z}$; в) $\frac{\pi}{4} + \pi n, -\arctg \frac{7}{4} + \pi k, k, n \in \mathbb{Z}$. 28. а) -1 ; ә) $\frac{1}{2}$; б) 2 ; 3 ; в) $\frac{5}{3}$. 29. а) $\pm 2; \pm \sqrt{5}$; ә) $\pm 1; \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$; б) ± 1 ; в) -1 . 30. а) $(1+2n)\pi, n \in \mathbb{Z}$. ә) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; 31. а) $2\pi n, \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; ә) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. 32. а) $\left[-\frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{2\pi}{3} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$; ә) $\left[\frac{7\pi}{12} + 2\pi n; \frac{25\pi}{12} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$; б) $\left(\pi n; \frac{\pi}{4} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}$; в) $\left(\pi n; \frac{3\pi}{4} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}$. 33. а) $\left(\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi n}{3}; \frac{5\pi}{18} + \frac{2\pi n}{3}\right), n \in \mathbb{Z}$; ә) $\left(-\frac{\pi}{42} + \frac{2\pi n}{7}; \frac{\pi}{42} + \frac{2\pi n}{7}\right), n \in \mathbb{Z}$. 34. а) $\left(-\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}; \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{4}\right), n \in \mathbb{Z}$. 35. а) $\left(-\frac{\pi}{3} + \pi n; \frac{\pi}{3} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}$; ә) $\left[-\frac{5\pi}{16} + \frac{\pi n}{2}; \frac{\pi}{16} + \frac{\pi n}{2}\right], n \in \mathbb{Z}$. 39. а) $(0; +\infty)$; ә) $(-1; 1)$; б) $(-1; 0) \cup (0; 1)$; в) $(-\infty; 0) \cup (0; 3)$. 40. а) $[0; +\infty)$; ә) $\left[-\frac{1}{4}; +\infty\right)$; б) $(-\infty; +\infty)$; в) $(-\infty; +\infty)$. 41. а) $[-3; 2]$; ә) $\left[-\frac{4}{3}; 5\right]$; б) $[-2; 0]$; в) $(-\infty; -2] \cup [0; 2]$. 42. а) $\left(\frac{\pi}{12} + \frac{1}{2} + \pi n; \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{2} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}$. 43. а) $(-\infty; 4]$; ә) $[0; +\infty)$; б) $(-\infty; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; +\infty)$; в) $(-\infty; 2) \cup (2; 3) \cup (3; +\infty)$. 44. а) $[-11; +\infty)$; ә) $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$; б) $[-8; 8]$; в) $[1; 5]$. 46. а) Тағ; ә) тағ; ә) жүп; б) жүпму өмәс, тағму өмәс; в) тағ; г) жүп. 48. а) $\frac{2\pi}{3}$; ә) 10π ; ә) π ; б) $\frac{\pi}{2}$. 51. а) $y = 0,5x - 1,5, x \in \mathbb{R}$; ә) $y = 1 + \sqrt{x}, x \in [0; +\infty)$; ә) $y = \sqrt{x+1}, x \in [-1; +\infty)$. 52. а) $x = -1$; ә) $x = \pm 2$; ә) $x = \pm 3$; б) $x = 0; -1; \pm 5$. 54. а) $y = 3 - x$; ә) $y = 2x + 5$; ә) $y = 2x - 1$; б) $y = 1$. 55. $45^\circ; y = x + 1$. 56. $\arctg 2$. 57. а) $y = -4x + \sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}$; ә) $y = 4x + \sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$. 58. а) $(-\infty; 1]$ — өсиду, $[1; +\infty)$ — кемийду; ә) $(-\infty; 0]$ — кемийду, $[0; +\infty)$ — өсиду; ә) $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$ — өсиду, $[-1; 1]$ — кемийду; б) $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$ — өсиду, $[-3; 3]$ — кемийду; в) $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$ — өсиду; г) $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ — кемийду. д) $(-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$ — өсиду, $[-3; 2]$ — кемийду; е) $(-\infty; 1] \cup [6; +\infty)$ — кемийду, $[1; 6]$ — өсиду. 59. а) $x = 0$ — максимум чекити; ә) экстремум чекитлири йок.

МҮНДӘРИЖӘ

Киришмә	3
7—9-синипларға алгебра курсини тәкрарлашқа бегишланған көнүкмиләр	4

1-бап. ФУНКЦИЯ, УНИҢ ХУСУСИЙӘТЛИРИ ВӘ ГРАФИГИ

§ 1. Функция вә униң берилиш усуллири	9
§ 2. Функцияләрниң графиклирини түрлөндүрүш	14
§ 3. Функцияниң хусусийәтлири	19
§ 4. Өкси функция чүшәнчиси. Мурәккәп функция	25
Өзәңни тәкшүр!	27
§ 5. Тригонометриялик функцияләр, уларниң хусусийәтлири билән графиклири	32

2-бап. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛӘР

§ 6. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс	37
Өзәңни тәкшүр!	43

3-бап. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘР БИЛӘН ТӘҢСИЗЛИКЛӘР

§ 7. Аддий тригонометриялик тәңлимиләр	45
§ 8. Тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш усуллири	52
§ 9. Тригонометриялик тәңсизликләрни йешиш	55
Өзәңни тәкшүр!	60

4-бап. ЕҢТИМАЛЛИК

§ 10. Вақиәниң еһтималлиғи вә униң хусусийәтлири	64
§ 11. Еһтималлиқларни қошуш вә көпәйтиш қайдилири	66
Өзәңни тәкшүр!	70

5-бап. ҺАСИЛАТ

§ 12. Функцияниң чекиттики чеки. Функцияниң үзүлүшсизлиги	72
§ 13. Һасилатниң ениқлимиси	76
§ 14. Һасилатни тепиш қайдилири	80
§ 15. Һасилатниң физикилик вә геометриялик маһийити. Функция графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимиси	84
§ 16. Мурәккәп функцияниң Һасилати	89
§ 17. Тригонометриялик функцияләрниң Һасилатлири	91
§ 18. Йеқинлаштуруп Һесаплаш	94
Өзәңни тәкшүр!	96

6-бап. ҺАСИЛАТНИҢ ҚОЛЛИНИЛИШИ

§ 19. Функцияниң өсүш вә кемийиш бөлгүлири	100
§ 20. Функцияниң критикилик чекитлири билән экстремум чекитлири	104
§ 21. Һасилатниң ярдими билән функцияни тәкшүрүш вә униң графигини селиш	108
§ 22. Функцияниң кесиндидики әң чоң вә әң кичик мәнәлири	111
Өзәңни тәкшүр!	115

7-бап. ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАР ВӘ УЛАРНИҢ САНЛИҚ ТӘРИПЛИМИЛИРИ

§ 23. Тәсадипи миқдарлар вә уларниң түрлири. Тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити	120
§ 24. Тәсадипи миқдарларниң санлиқ тәриплимилири	124
Өзәңни тәкшүр!	131
10-синиптики алгебра вә анализ башланмилири курсини тәкрарлашқа бегишланған көнүкмиләр	135
Глоссарий	143
Жаваплири	147