5

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА

Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Футболшы допты қандай бұрышпен тепсе, ол ең алысқа ұшады? Ауа кедергісі болмаса ше?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$x = v_0 \cos\alpha \cdot t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x	координата	м
v_0	_____	_____
α	түсу бұрышы	°
t	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.


1. **Еркін түсу үдеуі (Жерде):**
   - (A) ≈ 0,98 м/с²
   - (B) ≈ 98 м/с²
   - (C) ≈ 9,8 м/с²
   - (D) ≈ 1,6 м/с²

2. **Вакуумда қауырсын мен тиын:**
   - (A) Бірдей уақытта түседі
   - (B) Қауырсын ертерек түседі
   - (C) Тиын ертерек түседі
   - (D) Қауырсын түспейді

3. **Дене 20 м биіктіктен еркін түседі (g = 10). Түсу уақыты:**
   - (A) 20 с
   - (B) 1 с
   - (C) 4 с
   - (D) 2 с

4. **Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене ең алысқа ұшады, егер бұрыш:**
   - (A) 60°
   - (B) 90°
   - (C) 30°
   - (D) 45°

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$υ_0$ = 10 м/с, α = 45°. Ұшу уақыты мен қашықтығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Доп 25 м/с жылдамдықпен 30° бұрышпен тебілді. Ең жоғарғы көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қандай бұрышта ұшу қашықтығы көтерілу биіктігіне тең болады? Шешімін қорытып шығар.

Рефлексия · Смайликтер

- ☺ Бәрі түсінікті ☐
- 😐 Сұрағым бар ☐
- ☹ Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

- A §6; 3 есеп.
- B Су шлангымен бұрыш–қашықтық тәжірибесі.
- C Ауа кедергісі есепке алынғанда траекторияның өзгерісі туралы (PhET).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы.

Формула $x = \upsilon_0 \cos\alpha \cdot t$: x — координата, м; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; α — түсу бұрышы, °; t — температура, °C

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: t ≈ 1,41 с; L = 10 м.

B деңгейі: H ≈ 7,8 м; L ≈ 54,1 м.

C деңгейі: $\upsilon_0^2 \sin 2\alpha / g = \upsilon_0^2 \sin^2\alpha / 2g \rightarrow \operatorname{tg}\alpha = 4 \rightarrow \alpha \approx 76°$.