ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ · 07-САБАҚ

7 Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы. Пр. №1 денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Бірдей массалы суды және майды бірдей уақыт қыздырсақ, қайсысы тез қызады? Неліктен?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Жылу мөлшері **Меншікті жылу сыйымдылық (c)**

1. _____ – жылу беру кезінде дененің алған немесе берген энергиясы: $Q = cm(t_2 - t_1)$.
2. _____ – 1 кг затты 1 °C-қа қыздыруға қажетті жылу мөлшері; бірлігі Дж/(кг·°C).

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. c_су = ? (4200 Дж/(кг·°C))

2. Q = cmΔt: c = 1000, m = 2, Δt = 5

3. Бірлігі Дж/(кг·°C) шама?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: есеп

Қолдану

Массасы 0,5 кг темір кесегін 10 °C-қа қыздыруға қажетті жылу мөлшері?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Массасы 3 кг су 80 °C-тан 30 °C-қа дейін суығанда қандай жылу мөлшері бөлінеді?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Жылу мөлшері** – жылу беру кезінде дененің алған немесе берген энергиясы: $Q = cm(t_2 - t_1)$.
- **Меншікті жылу сыйымдылық (c)** – 1 кг затты 1 °C-қа қыздыруға қажетті жылу мөлшері; бірлігі Дж/(кг·°C).
- c_су = 4200, c_мұз = 2100, c_алюм = 920, c_темір = 460 Дж/(кг·°C).
- Q > 0 – дене жылу алады, Q < 0 – береді.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы. Пр. №1 денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу

2) Жылу мөлшері; Меншікті жылу сыйымдылық (c)

3) 2) 10 кДж; 3) меншікті жылу сыйымдылық

A) Q = 460·0,5·10 = 2300 Дж.

B) Q = 4200·3·50 = 630 000 Дж = 630 кДж.