КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 04-САБАҚ

4 Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Көлік 72 км/сағ жылдамдықпен жүріп келе жатып, 5 м/с² үдеумен тежелді. Тоқтағанға дейін неше метр жүреді?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
υ =	
s =	
s =	


3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. $\upsilon = \upsilon_0 + at$: 0 + 3·4

2. $s = at^2/2$: a = 2, t = 3

3. Тежелуде a таңбасы?

4 Графикті оқы Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Дене тыныштықтан 2 м/с² үдеумен 5 с қозғалды. Соңғы жылдамдығы мен орын ауыстыруы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Ұшақ ұшу үшін 80 м/с жылдамдық алуы керек, жолақ 1600 м. Ең аз үдеуі?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- $\upsilon = \upsilon_0 + at$.
- $s = \upsilon_0 t + at^2/2$.
- $s = (\upsilon^2 - \upsilon_0^2)/(2a)$ – уақытсыз формула.
- Орташа жылдамдық: $\upsilon_орт = (\upsilon_0 + \upsilon)/2$.

Мұғалімге: жауаптар

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру

2) $\upsilon = \upsilon_0 + at$; $s = \upsilon_0 t + at^2/2$; $s = (\upsilon^2 - \upsilon_0^2)/(2a)$
3) 1) 12 м/с; 2) 9 м; 3) теріс
А) $\upsilon = 10$ м/с; $s = 25$ м.
В) $a = 6400/3200 = 2$ м/с².