КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 05-САБАҚ

5 Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру Пр. №1

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

x = 5 + 2t − t² теңдеуімен қозғалған дене не істеп жатыр? Бастапқы координатасы, жылдамдығы, үдеуі қандай?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
x =	
υ_x =	
t) =	


3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. x = 3 + 2t: υ?

2. x = t²: a?

3. Кездесу шарты?

4 Графикті оқы Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

$x = 10 + 4t + 3t^2$ теңдеуі бойынша x_0, υ_0, a-ны ата; 2 с-тағы координатасын тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

$x_1 = 2t^2$ және $x_2 = 30 - 5t$ денелері қашан, қай нүктеде кездеседі?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Есте сақта!

- Координата теңдеуі: $x = x_0 + \upsilon_{0x}t + a_x t^2/2$.
- Жылдамдық теңдеуі: $\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t$.
- Кездесу шарты: $x_1(t) = x_2(t)$.

Мұғалімге: жауаптар

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру Пр. №1

2) $x = x_0 + \upsilon_{0x}t + a_x t^2/2$; $\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t$; t) = $x_2(t)$

3) 1) 2 м/с; 2) 2 м/с²; 3) $x_1 = x_2$

А) x_0 = 10 м, υ_0 = 4 м/с, a = 6 м/с²; x(2) = 30 м.

В) $2t^2 + 5t - 30 = 0 \rightarrow t \approx 2{,}8$ с; $x \approx 16$ м.