55

АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР · 57-САБАҚ

Радиоактивтілік. Радиоактивті сәулеленудің табиғаты

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Беккерель уран тұзын фотопластинкамен бірге тартпаға салды, ал пластинка жарықсыз қараңғыда «жарық» болып шықты. Неліктен?

_____

2 Сәйкестендір

Білу

Ұғым мен анықтаманы сызықпен қос.

1. α	**А)** жоғары энергиялы ЭМ толқын, заряды жоқ, қорғасын (бірнеше см) әлсіретеді.
2. β	**Ә)** электрондар, заряды −e, алюминий (бірнеше мм) тоқтатады.
3. γ	**Б)** гелий ядролары ($^4_2$He), заряды +2e, өтімділігі аз (қағаз), иондауы күшті.

1 – ___ 2 – ___ 3 – ___

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. α бөлшек деген?

_____

2. Ең өтімді?


_____

3. β бөлшектің заряды?

_____

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

_____

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

_____

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

α, β, γ сәулелерінің табиғатын ата.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Сәулелерді өтімділігі бойынша ретте және қорғаныш материалын көрсет.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Радиоактивтілік** (1896, Беккерель; Кюрилер) – ядролардың өздігінен сәуле шығарып, басқа ядроларға айналуы.
- **α** – гелий ядролары ($^{2}_{4}\mathrm{He}$), заряды +2e, өтімділігі аз (қағаз), иондауы күшті.
- **β** – электрондар, заряды −e, алюминий (бірнеше мм) тоқтатады.
- **γ** – жоғары энергиялы ЭМ толқын, заряды жоқ, қорғасын (бірнеше см) әлсіретеді.

Мұғалімге: жауаптар

Радиоактивтілік. Радиоактивті сәулеленудің табиғаты

2) 1 – Б; 2 – Ә; 3 – А

3) 1) гелий ядросы; 2) γ; 3) теріс

А) α – гелий ядросы, β – электрон, γ – ЭМ толқын.

В) α < β < γ; қағаз, алюминий, қорғасын.