

Worksheet #2

Adrian T. Sayson

2025-09-29

```
#1.
```

```
y <- -5:5
```

```
y
```

```
## [1] -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
```

```
#2.
```

```
x <- 1:7
```

```
x
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7
```

```
#3.
```

```
age <- c(34, 28, 22, 36, 27, 18, 52, 39, 42, 29, 35, 31, 27,  
22, 37, 34, 19, 20, 57, 49, 50, 37, 46, 25, 17, 37, 43, 53, 41, 51, 35,  
24, 33, 41, 53, 40, 18, 44, 38, 41, 48, 27, 39, 19, 30, 61, 54, 58, 26,  
18)
```

```
age [3]
```

```
## [1] 22
```

```
age [c(2,4)]
```

```
## [1] 28 36
```

```
age [-1]
```

```
## [1] 28 22 36 27 18 52 39 42 29 35 31 27 22 37 34 19 20 57 49 50 37 46 25 17 37
```

```
## [26] 43 53 41 51 35 24 33 41 53 40 18 44 38 41 48 27 39 19 30 61 54 58 26 18
```

```
#4.
```

```
z <- c("first"=3, "second"=0, "third"=9)
```

```
names(z)
```

```
## [1] "first" "second" "third"
```

```
z[c("first", "third")]
```

```
## first third  
##      3      9
```

names() in R is a function where only the labels are extracted and not the values of those labels

#5.

```
a <- -3:2  
a[2] <- 0  
a
```

```
## [1] -3  0 -1  0  1  2
```

#6.

```
Month <- c("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun")  
Price_per_liter <- c(52.50, 57.25, 60.00, 65.00, 74.25, 54.00)  
Purchase_quantity <- c(25, 30, 40, 50, 10, 45)  
dataframe <- data.frame (Month, Price_per_liter, Purchase_quantity)  
dataframe
```

```
##   Month Price_per_liter Purchase_quantity  
## 1   Jan           52.50                25  
## 2   Feb           57.25                30  
## 3   Mar           60.00                40  
## 4   Apr           65.00                50  
## 5   May           74.25                10  
## 6   Jun           54.00                45
```

```
Fuel <- weighted.mean(x = Price_per_liter, w = Purchase_quantity)  
Fuel
```

```
## [1] 59.2625
```

#7.

```
rivers
```

```
##   [1] 735 320 325 392 524 450 1459 135 465 600 330 336 280 315 870  
##  [16] 906 202 329 290 1000 600 505 1450 840 1243 890 350 407 286 280  
##  [31] 525 720 390 250 327 230 265 850 210 630 260 230 360 730 600  
##  [46] 306 390 420 291 710 340 217 281 352 259 250 470 680 570 350  
##  [61] 300 560 900 625 332 2348 1171 3710 2315 2533 780 280 410 460 260  
##  [76] 255 431 350 760 618 338 981 1306 500 696 605 250 411 1054 735  
##  [91] 233 435 490 310 460 383 375 1270 545 445 1885 380 300 380 377  
## [106] 425 276 210 800 420 350 360 538 1100 1205 314 237 610 360 540  
## [121] 1038 424 310 300 444 301 268 620 215 652 900 525 246 360 529  
## [136] 500 720 270 430 671 1770
```

```
elements <- c(length(rivers), sum(rivers), mean(rivers), median(rivers), var(rivers),
sd(rivers), min(rivers), max(rivers))
elements
```

```
## [1] 141.0000 83357.0000 591.1844 425.0000 243908.4086 493.8708
## [7] 135.0000 3710.0000
```

```
#8.
```

```
Power <- 1:25
```

```
Celebrity <- c("Tom Cruise", "Rolling Stones", "Oprah Winfrey", "U2", "Tiger Woods", "Steven Spielberg"
```

```
Pay <- c(67, 90, 225, 110, 90, 332, 302, 41, 52, 88, 55, 44, 55, 40, 233, 34, 40, 47, 75, 25, 39, 45, 3
```

```
jk <- which(Celebrity == "J.K Rowling")
```

```
Power[jk] <- 15
```

```
Pay[jk] <- 90
```

```
celebrity_df <- data.frame(Power, Celebrity, Pay)
```

```
celebrity_df[jk, ]
```

```
## Power Celebrity Pay
```

```
## 19 15 J.K Rowling 90
```

```
# The data present is about the influence and rankings of celebrities
```