PROTOCOLES THÉRAPEUTIQUES : GLIOBLASTOME

I- Stade localisé

Temozolomide RCC [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	75.0 mg/M2	pendant toute la durée de RTH en 1 prise par jour

[1] Stupp R, Mason WP, Van den Bent MJ, Weller M, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer Brain Tumor and Radiotherapy Groups ; National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352:987-96

Temozolomide adjuvant J1 = J28 [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	200.0 mg/M2	J1 J2 J3 J4 J5

[1] Stupp R, Mason WP, Van den Bent MJ, Weller M, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer Brain Tumor and Radiotherapy Groups ; National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352:987-96

II- STADE METASTATIQUE :

Temozolomide rechute J1 = J28 [2]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	200.0 mg/M2	J1 J2 J3 J4 J5

[2] Jia JL, Alshamsan B, Ng TL. Temozolomide Chronotherapy in Glioma: A Systematic Review. Curr Oncol 2023;30:1893–902. https://doi.org/10.3390/curroncol30020147.

Bevacizumab J1 = J15 [3]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	10.0 mg/ KG	Dans 500 cc SS en 90 min c1 TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab

[3] Wong ET, Gautam S, Malchow C, Lun M, et al. Bevacizumab for recurrent glioblastoma multiforme : a meta-analysis. J Natl Compr Canc Netw. 2011;9:403-7

Bevacizumab + Irinotecan J1 = J15 [4-5]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	125.0 mg/ M2	Dans 500 cc SS en 90 min puis rinçage
4	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	IVL durant la perfusion d'IRINOTECAN

5	Thérapie ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	10.0 mg/KG	Dans 500 cc SS en 90 min c1 TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab

[4] Vredenburgh JJ, Desjardins A, Herndon JE 2nd, Marcello J, et al. Bevacizumab plus irinotecan in recurrent glioblastoma multiforme. J Clin Oncol. 2007(b) ;25(30):4722-9

[5] Zhang G, Huang S, Wang Z. A meta-analysis of bevacizumab alone and in combination with irinotecan in the treatment of patients with recurrent glioblastoma multiforme. J Clin Neurosci 2012;19:1636-1640